

**ETIQUETADO:**

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**

**Tubos de polipropileno/ caja de cartón**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MAQS Ácido Fórmico 68,2g Tiras para Colmenas para Abejas

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

**Sustancia activa:**

Cada Tira para Colmena contiene: Ácido Fórmico 68,2g

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Tira de Colmenas

**4. TAMAÑO DEL ENVASE**

Tamaño del envase:

Tubos de polipropileno con 2 bolsitas de 2 tiras. (4 tiras)

Tubos de polipropileno con 10 bolsitas de 2 tiras (20 tiras)

La caja contiene 2 bolsitas en un forro de plástico, envasadas en caja de cartón (4 tiras).

La caja contiene 10 bolsitas en un forro de plástico, envasadas en caja de cartón (20 tiras).

La caja contiene 30 bolsitas en un forro de plástico, envasadas en caja de cartón (60 tiras).

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

**5. ESPECIES DE DESTINO**

Abeja

**6. INDICACIÓN(ES) DE USO**

Tratamiento de la Varroasis causada por *Varroa destructor* en las abejas (*Apis mellifera*).

**7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-12

Uso en las colmenas

## 8. TIEMPO(S) DE ESPERA

**Miel:** Cero días.

No recolecte la miel durante los 7 días del periodo de tratamiento.

## 9. ADVERTENCIA(S) ESPECIALES, SI PROCEDEN

Tenga cuidado de perturbar la colonia lo menos posible durante el proceso de aplicación. Trate todas las colonias en el apiario al mismo tiempo. Use el medicamento veterinario según las recomendaciones locales de tratamiento, si estuvieran disponibles.

La tasa de nacimientos y muertes naturales es de 1.000 a 2.000 abejas por día durante la primavera y verano. Bajo el estrés del tratamiento, las abejas que son frágiles debido a la edad o enfermedades, es decir, las que normalmente morirían lejos de la colmena, podrían sucumbir dentro de la colmena y se podrán ver alrededor de la entrada.

El medicamento veterinario sólo debe usarse como parte de un programa integrado de control de varroa. Se recomienda encarecidamente que monitoree mensualmente los niveles de ácaros foréticos durante los periodos de cría y realice el tratamiento cuando se alcancen los umbrales locales.

Para garantizar la eficacia necesaria, no lo use cuando las temperaturas máxima y/o mínima estén fuera del rango de 10 – 29.5 °C en el día de la aplicación.

- Este medicamento veterinario es irritante para la piel y los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas. Al manipular y aplicar este medicamento veterinario use la ropa de protección apícola habitual. Tenga agua a su disposición.
- En caso de contacto accidental con los ojos, lávelos de inmediato con agua limpia del grifo durante 10 minutos, consulte con un médico y muéstrelle el prospecto.
- Evite el contacto con la piel usando guantes resistentes a los productos químicos (EN 374). En caso de contacto accidental con la piel, lave de inmediato con agua la piel expuesta y consulte con un médico si persiste la irritación.
- Evite la inhalación de vapor. Sólo abra el envase del medicamento veterinario y desenvuelva las tiras al aire libre, manteniendo el medicamento veterinario a favor del viento. En caso de inhalación accidental, salga al aire libre y consulte con un médico si persiste la irritación.
- Mantenga a los niños suficientemente lejos durante la aplicación del medicamento veterinario.
- No coma, beba o fume mientras manipula y aplica el medicamento veterinario.
- Siempre lave sus manos con agua y jabón inmediatamente después de usar el medicamento veterinario.
- Las personas con sensibilidad conocida al ácido fórmico o al ácido oxálico deben administrar el medicamento veterinario con precaución.

### Otras precauciones

Este medicamento veterinario es corrosivo. No permita que el medicamento veterinario entre en contacto con superficies de metal.

## 10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD: MM/AAAA

## 11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C;  
Conservar en lugar seco;  
Proteger de la luz directa del sol;

Mantenga el tubo de polipropileno o la bolsa de polietileno en la caja de cartón herméticamente cerrada para evitar los casos de contaminación o vertido del producto.  
Conservar en su envase original herméticamente cerrado en un área bien ventilada, lejos de ácido sulfúrico, agentes oxidantes fuertes (ej., ácido nítrico, peróxidos, percloratos, cloritos) y fuentes de ignición.

**12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

No contamine los estanques, vías fluviales y zanjas con las tiras o el envase usado. Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

**13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO” Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE**

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario

**14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

NOD Apiary Ireland Ltd.  
5 George's Dock  
IFSC Dublin 1  
D01 X8N7  
Ireland

**16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3031 ESP

**17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lote: XX-XXX-X

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO  
SOBRE**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

MAQS Ácido Fórmico 68.2g Tiras para Colmenas para Abejas

**2. CANTIDAD DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)**

Cada Tira para Colmena contiene: Ácido Fórmico 68,2g

**3. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O NÚMERO DE DOSIS**

Contiene 1 Dosis (2 tiras)

**4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN**

Uso en las colmenas **Instrucciones de apertura de la bolsa**

Retire con cuidado las dos tiras de medicamento veterinario de la bolsa cortándola por un extremo, luego levante el precinto para que el plástico se desprenda de la tira, y proceda a cortar la bolsa a lo largo de la línea de sellado. Separe cuidadosamente las tiras. **NO RETIRE LAS ENVOLTURAS DE PAPEL** (Esto actúa como una mecha, es decir. controla la velocidad de liberación de la sustancia activa).

**5. TIEMPO(S) DE ESPERA**

**Miel:** Cero días.

No recolecte la miel durante los 7 días del periodo de tratamiento.

**6. NÚMERO DE LOTE**

Lote: XX-XXX-X

**7. FECHA DE CADUCIDAD**

CAD: MM/AAAA

## **8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

## **9. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

NOD Apiary Ireland Ltd.  
5 George's Dock  
IFSC Dublin 1  
D01 X8N7  
Ireland

## **10. DECLARACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DEL PROSPECTO**

Lea el prospecto adjunto antes de usar el medicamento veterinario para conocer las instrucciones completas y todas las advertencias, incluyendo las advertencias a los usuarios.