

ETIQUETADO

1. ETIQUETA DEL VIAL DE 100 ml y 250 ml

GENTAVALL 5 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE

100 ml
250 ml

COMPOSICIÓN POR 1 ml

Sustancia activa:

Gentamicina (sulfato) 5 mg
(equivalente a 5.000 UI)

Excipientes:

Metabisulfito de sodio (E-223) 3,2 mg
Parahidroxibenzoato de metilo (E-218)..... 1,8 mg
Parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg
Otros excipientes, c.s.

INDICACIONES DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

TIEMPOS DE ESPERA

Lechones: Carne: 44 días.

ADVERTENCIAS ESPECIALES.

Lea el prospecto antes de usar.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Una vez abierto el envase utilizar antes de 28 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

USO VETERINARIO-MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Administración bajo control o supervisión del veterinario.

LOTE:

CAD.:

Reg. nº 304 ESP

Titular y fabricante

MEVET S.A.U.

Pol. Ind. El Segre, P. 410 - 25191 LLEIDA

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-01-05



2. CAJA CON 1 VIAL DE 100 ml/ 10 VIALES DE 100 ml

GENTAVALL 5 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE

O
(código nacional)
100 ml
10 x 100 ml

COMPOSICIÓN POR 1 ml

Sustancia activa:

Gentamicina (sulfato)..... 5 mg
(equivalente a 5.000 UI)

Excipientes:

Metabisulfito de sodio (E-223) 3,2 mg
Parahidroxibenzoato de metilo (E-218)..... 1,8 mg
Parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg
Otros excipientes, c.s.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la gentamicina:

Lechones: colibacilosis neonatal.

Perros: infecciones genitourinarias, infecciones del tracto respiratorio, infecciones de piel y tejidos blandos, gastroenteritis bacterianas, bacteriemias y septicemias.

Gatos: infecciones genitourinarias, infecciones del tracto respiratorio, infecciones de piel y tejidos blandos y gastroenteritis bacterianas.

ESPECIES DE DESTINO, POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: intramuscular.

Lechones: 5 mg de gentamicina/animal en dosis única (equivalente a 1 ml de medicamento).

Perros y gatos: 5 mg de gentamicina/kg p.v. (equivalente a 1 ml de medicamento/kg p.v.) cada 12 h, durante 3-4 días.

TIEMPOS DE ESPERA

Lechones: Carne: 44 días.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Ninguna.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Una vez abierto el envase utilizar antes de 28 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

USO VETERINARIO-MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Administración bajo control o supervisión del veterinario

LOTE:



CAD.:

Reg. nº 304 ESP

Titular y fabricante

MEVET S.A.U.

Pol. Ind. El Segre, P. 410 - 25191 LLEIDA



3. CAJA CON 1 VIAL DE 250 ml/ 15 VIALES DE 250 ml

GENTAVALL 5 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE

O
(código nacional)
250 ml
15 x 250 ml

COMPOSICIÓN POR 1 ml

Sustancia activa:

Gentamicina (sulfato)..... 5 mg
(equivalente a 5.000 UI)

Excipientes:

Metabisulfito de sodio (E-223) 3,2 mg
Parahidroxibenzoato de metilo (E-218)..... 1,8 mg
Parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg
Otros excipientes, c.s.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la gentamicina:

Lechones: colibacilosis neonatal.

Perros: infecciones genitourinarias, infecciones del tracto respiratorio, infecciones de piel y tejidos blandos, gastroenteritis bacterianas, bacteriemias y septicemias.

Gatos: infecciones genitourinarias, infecciones del tracto respiratorio, infecciones de piel y tejidos blandos y gastroenteritis bacterianas.

ESPECIES DE DESTINO, POSOLOGÍA, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: intramuscular.

Lechones: 5 mg de gentamicina/animal en dosis única (equivalente a 1 ml de medicamento).

Perros y gatos: 5 mg de gentamicina/kg p.v. (equivalente a 1 ml de medicamento/kg p.v.) cada 12 h, durante 3-4 días.

TIEMPOS DE ESPERA

Lechones: Carne: 44 días.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

Ninguna.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

Una vez abierto el envase utilizar antes de 28 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

USO VETERINARIO-MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Administración bajo control o supervisión del veterinario

LOTE:



CAD.:

Reg. nº 304 ESP

Titular y fabricante

MEVET S.A.U.

Pol. Ind. El Segre, P. 410 - 25191 LLEIDA