

## **BIPACKSEDEL**

**Nobilis IB Multi vet.** injektionsvätska, emulsion

### **För djur**

#### **Vad innehåller läkemedlet?**

Vaccinet innehåller avdödade Infektiösa Bronkitvirus, Massachusettsstammarna M41 och D274. 1 dos (0,5 ml) innehåller minst 5,5 log<sub>2</sub> VN enheter av M41 och minst 4,0 log<sub>2</sub> VN enheter av D274, paraffin, flytande 215,0 mg, polysorbat 80 8,8 mg, sorbitanmonooleat 27,7 mg, glycin 2,5 mg, formaldehyd ≤ 0,05%, vatten för injektionsvätskor till 0,5 ml. Antigenerna är inkorporerade i en vatten-oljaemulsion för att förlänga immuniteten.

#### **Innehavare av försäljningstillstånd**

Intervet International B.V., Boxmeer, Holland

#### **Djurslag**

Kycklingar.

#### **Vad används läkemedlet för?**

Vaccination av kycklingar mot infektiös bronkit av typerna IBV M41 och IBV D274.

#### **Att tänka på innan läkemedlet används**

Blanda inte vaccinet med andra injektionsvätskor.

Bara friska djur bör vaccineras.

#### *Till användaren:*

Denna produkt innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret, om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart. Vid oavsiktlig injektion med denna produkt, uppsök snabbt läkare - även om endast en väldigt liten mängd injicerats - och ta med bipacksedeln.

Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

#### *Till läkaren:*

Denna produkt innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med denna produkt orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och det kan bli nödvändigt med incision och irrigation av det injicerade området, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller sensor i ett finger.

#### **Doseringsanvisning**

Låt vaccinet uppnå rumstemperatur (+15°-+25°C) innan användning. Omskakas väl. Använd bara sterila nålar och sprutor.

Injicera 0,5 ml i lår- eller bröstmuskeln eller under huden nederst i nacken.

Vaccinering bör ske vid ca 16-20 veckors ålder, men ej senare än 4 veckor före äggläggning.

#### **Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?**

En lätt svullnad på injektionsstället kan förekomma ett par veckor efter vaccination.

#### **Karenstider:**

Slakt: 0 dygn

**Hur skall läkemedlet förvaras?**

Förvaras oåtkomligt för barn.

Vaccinet skall förvaras vid 2°-8°C (i kylskåp). Får inte frysas.

När flaskan är öppnad skall vaccinet användas inom 3 timmar.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

**Bipacksedeln reviderad 2022-01-21**