

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltkarton für 4 oder 20 Euterinjektoren****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Galactobene Max 750 mg - Gel zur intramammären Anwendung für Rinder

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 Euterinjektor zu 5 g enthält:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Lincomycin                         | 750,0 mg |
| entspricht Lincomycin-Hydrochlorid | 850,0 mg |

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

4 Euterinjektoren mit „TWINSERT“-System + 4 Desinfektionstüchern.  
20 Euterinjektoren mit „TWINSERT“-System + 20 Desinfektionstüchern.

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder (laktierende Kühe)

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

-

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramammäre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**Wartezeit:

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 84 Stunden (7 Gemelke)

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

FATRO S.p.A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

838514

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Injektor-Etikett**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Galactobene Max 750 mg - Gel zur intramammären Anwendung für Rinder

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

1 Injektor zu 5 g enthält:

Lincomycin 750,0 mg  
entspricht Lincomycin-Hydrochlorid 850,0 mg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}