

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN DHPPi+LR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

Gyva vakcina nuo šunų maro (CDV), infekcinio hepatito (CAV-1), infekcinio laringotracheito (CAV-2), parvovirozės (CPV-2), paragripo (CPIV-2) ir inaktyvinta vakcina nuo šunų leptospirozės ir pasiutligės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

a) liofilizate (BIOCAN DHPPi) yra:

veikliųjų medžiagų:

gyvų nusilpnintų šunų maro virusų

ne mažiau kaip $10^{3,0}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,5}$ TCID₅₀,

gyvų nusilpnintų šunų adenovirusų

ne mažiau kaip $10^{3,5}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,5}$ TCID₅₀,

gyvų nusilpnintų šunų parvovirusų

ne mažiau kaip $10^{4,5}$ ir ne daugiau kaip $10^{5,5}$ TCID₅₀,

gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų

ne mažiau kaip $10^{3,0}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,2}$ TCID₅₀;

pagalbinių medžiagų:

liofilizavimo terpės

iki 1 ml,

b) skiediklyje (BIOCAN LR) yra:

veikliųjų medžiagų:

inaktyvintų pasiutligės virusų

ne mažiau kaip 2 TV,

inaktyvintų *Leptospira icterohaemorrhagiae*

titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT*,

inaktyvintų *Leptospira canicola*

titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,

inaktyvintų *Leptospira grippotyphosa*

titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,

* vidutinis geometrinis specifinių antikūnų titras, nustatomas mikroaglutinacijos tyrimu;

adjuvanto:

aliuminio hidroksido suspensijos;

pagalbinių medžiagų:

mitybinės terpės.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

12 sav. amžiaus ir vyresniems šunims aktyviai imunizuoti nuo šunų maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirozės, paragripo, pasiutligės ir dažniausiai pasitaikančių leptospirų padermių (*Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira canicola*, *Leptospira grippotyphosa*).

4.3. Kontraindikacijos

Negalima vakcinuoti karščiujančių gyvūnų.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vakcinuoti galima tik sveikus ir gerai įmitusius šunis.
Rekomenduojama likus 10 d. iki numatomos vakcinacijos šunims skirti antiparazitinių vaistų.
Savaitę po vakcinacijos šunys neturi būti treniruojami ar patirti didelių krūvių.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Netaikytinos.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Injekcijos vietoje gali pasireikšti vietinė reakcija – žirnio dydžio sukietėjimas, kuris išnyksta per 3 sav.
Labai retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Nerekomenduojama vakcinuoti kalių paskutiniąsias dvi šuningumo savaites dėl bendrinių nuostatų (pvz., galimi pažeidimai fiksuojant vaikingą patelę ir pan.).

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Vakciną BIOCAN DHPPi+LR galima naudoti atskirai ar kartu su vakcinomis BIOCAN C, BIOCAN M Plus, BIOCAN B.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtus produktus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vakciną reikia švirkšti po oda.

Vieną dozę liofilizato reikia aseptiškai atskiesti viena doze skiediklio, gerai suplakti ir nedelsiant sušvirkšti.

Nepriklausomai nuo gyvūno amžiaus, svorio ar veislės, po oda reikia švirkšti 1 ml vakcinės.

Pirmą kartą vakcinuoti galima 12 sav. amžiaus šuniukus.

Vakcinacijos schemą turi nustatyti veterinarijos gydytojas, atsižvelgęs į epizootinę situaciją ir su krekenomis įgytą pasyvų vakcinuojamų gyvūnų imunitetą. Norint išlaikyti nuolatinį vakcinuotų gyvūnų imunitetą gyvūnus reikia revakcinuoti kasmet.

Gyvūno amžius	Pavojus užsikrėsti infekcine liga		
	Nėra	Esant parvovirozės pavojui	Esant maro pavojui
5–6 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7–8 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C

8–10 sav.	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12–16 sav.	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Kasmet revakcinuoti	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Pastaba

Vakcinų pavadinimai skliausteliuose (P, R, DP, DHPPi) reiškia alternatyvų BIOCAN vakcinų pasirinkimą.

Vakcinų pavadinimai +C, +L, +LR reiškia galimybę tuo pat metu vakcinuoti kitomis BIOCAN vakcinomis.

Vėliau galima vakcinuoti ir kitomis vakcinomis:

BIOCAN M plus – šunims nuo *Microsporum canis* nuo 8 sav. amžiaus,

BIOCAN B – šunims nuo Laimo ligos nuo 12 sav. amžiaus,

BIOCAN T – šunims nuo stabligės, vyresniems nei 12 sav. amžiaus.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Perdozavus du kartus, paskirties gyvūnams šalutinio poveikio nenustatyta.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: gyvos ir inaktyvintos virusinės bei bakterinės šunų vakcinos.

ATCvet kodas: QI07AJ06.

Sušvirkštus vakciną, gyvūnų organizmas vakcinos antigenus priima kaip išorinius veiksnius ir aktyvuoja apsauginius organizmo mechanizmus (makrofagus, opsoninus, interleukinus, B limfocitus ir t.t.), dėl to ima formuotis specifiniai vakcinos antigeninių komponentų antikūnai. Vėliau tai saugo organizmą nuo infekcijos patekus užkratui.

Imunitetas pradeda formuotis praėjus 14 d. po pirmosios vakcinacijos ir visiškai susiformuoja per kitas 14 d. po revakcinacijos. Revakcinuoti reikia po 14–21 d. Pastoviam vakcinuotų gyvūnų imunitetui palaikyti jie turi būti revakcinuojami kasmet.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Liofilizavimo terpė,
aliuminio hidroksido suspensija,
mitybinė terpė.

6.2. Nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinariniu vaistu, išskyrus 4.8 p. nurodytas vakcinas.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 24 mėn.
Atskiestą vakciną reikia sunaudoti nedelsiant.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti sausoje vėsioje vietoje, 2–8 °C temperatūroje.
Negalima sušaldyti.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Stikliniai buteliukai po 1 dozę vakcinos (1 vnt. BIOCAN DHPPi ir 1 vnt. BIOCAN LR), plastikinėse dėžutėse po 5, 10 ar 50 dozių.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
68323 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1887/001-003

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2009-10-21.
Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2014-11-03.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2014-11-03

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

PLASTIKINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN DHPPi+LR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

Gyva vakcina nuo šunų maro (CDV), infekcinio hepatito (CAV-1), infekcinio laringotracheito (CAV-2), parvovirozės (CPV-2), paragripo (CPIV-2) ir inaktyvinta vakcina nuo šunų leptospirozės ir pasiutligės

2. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinės dozėje (1 ml) yra:

a) liofilizate (BIOCAN DHPPi) yra:

gyvų nusilpnintų šunų maro virusų

ne mažiau kaip $10^{3,0}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,5}$ TCID₅₀,

gyvų nusilpnintų šunų adenovirusų

ne mažiau kaip $10^{3,5}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,5}$ TCID₅₀,

gyvų nusilpnintų šunų parvovirusų

ne mažiau kaip $10^{4,5}$ ir ne daugiau kaip $10^{5,5}$ TCID₅₀,

gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų

ne mažiau kaip $10^{3,0}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,2}$ TCID₅₀;

lioofilizavimo terpės

iki 1 ml,

b) skiediklyje (BIOCAN LR) yra:

inaktyvintų pasiutligės virusų

ne mažiau kaip 2 TV,

inaktyvintų *Leptospira icterohaemorrhagiae*

titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT*,

inaktyvintų *Leptospira canicola*

titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,

inaktyvintų *Leptospira grippotyphosa*

titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,

* vidutinis geometrinis specifinių antikūnų titras, nustatomas mikroaglutinacijos tyrimu;

aluminio hidroksido suspensijos, mitybinės terpės.

3. VAISTO FORMA

Liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti.

4. PAKUOTĖS DYDIS

5 dozės

10 dozių

50 dozių

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

6. INDIKACIJA (-OS)

12 sav. amžiaus ir vyresniems šunims aktyviai imunizuoti nuo šunų maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirozės, paragripo, pasiutligės ir dažniausiai pasitaikančių leptospirų padermių (*Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira canicola*, *Leptospira grippotyphosa*).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA**9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA**

Atskiestą vakciną reikia sunaudoti nedelsiant.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti sausoje vėsioje vietoje, 2–8 °C temperatūroje. Negalima sušaldyti.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bioveta, a.s., Komenského 212, 68323 Ivanovice na Hané, Čekijos Respublika

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1887/001

LT/2/09/1887/002

LT/2/09/1887/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
LIOFILIZATO BUTELIUKAS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN DHPPi

Vakcina nuo šunų maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirozės ir paragripo

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Šunų maro virusų

ne mažiau kaip $10^{3,0}-10^{4,5}$ TCID₅₀,

šunų adenovirusų

ne mažiau kaip $10^{3,5}-10^{4,5}$ TCID₅₀,

šunų parvovirusų

ne mažiau kaip $10^{4,5}-10^{5,5}$ TCID₅₀,

šunų paragripo virusų

ne mažiau kaip $10^{3,0}-10^{4,2}$ TCID₅₀.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė.

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti po oda.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serijs

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
SKIEDIKLIO BUTELIUKAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN LR

Vakcina nuo ūnų leptospirozės ir pasiutligės

2. VEIKLIŲJŲ MEDŖIAGŲ KIEKIS

Inaktyvintų pasiutligės virusų,
inaktyvintų *L. icterohaemorrhagiae*
inaktyvintų *L. canicola*
inaktyvintų *L. grippotyphosa*

ne mažiau kaip 2 TV,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT*,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,

* vidutinis geometrinis specifinių antikūnų titras, nustatomas mikroagliutinacijos tyrimu.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1 dozė.

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti po oda.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Serija

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS

BIOCAN DHPPi+LR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

Gyva vakcina nuo šunų maro (CDV), infekcinio hepatito (CAV-1), infekcinio laringotracheito (CAV-2), parvovirozės (CPV-2), paragripo (CPIV-2) ir inaktyvinta vakcina nuo šunų leptospirozės ir pasiutligės

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Bioveta, a. s.,
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN DHPPi+LR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

Gyva vakcina nuo šunų maro (CDV), infekcinio hepatito (CAV-1), infekcinio laringotracheito (CAV-2), parvovirozės (CPV-2), paragripo (CPIV-2) ir inaktyvinta vakcina nuo šunų leptospirozės ir pasiutligės

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinos dozėje (1 ml) yra:

a) liofilizate (BIOCAN DHPPi) yra:

veikliųjų medžiagų:

gyvų nusilpnintų šunų maro virusų
gyvų nusilpnintų šunų adenovirusų
gyvų nusilpnintų šunų parvovirusų
gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų

ne mažiau kaip $10^{3,0}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,5}$ TCID₅₀,
ne mažiau kaip $10^{3,5}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,5}$ TCID₅₀,
ne mažiau kaip $10^{4,5}$ ir ne daugiau kaip $10^{5,5}$ TCID₅₀,
ne mažiau kaip $10^{3,0}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,2}$ TCID₅₀,

pagalbinių medžiagų:

liofilizavimo terpės

iki 1 ml,

b) skiediklyje (BIOCAN LR) yra:

veikliųjų medžiagų:

inaktyvintų pasiutligės virusų
inaktyvintų *Leptospira icterohaemorrhagiae*
inaktyvintų *Leptospira canicola*
inaktyvintų *Leptospira grippotyphosa*

ne mažiau kaip 2 TV,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT*,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,

* vidutinis geometrinis specifinių antikūnų titras, nustatomas mikroagliutinacijos tyrimu;

adjuvanto:

aliuminio hidroksido suspensijos;

pagalbinių medžiagų:

mitybinės terpės.

4. INDIKACIJA (-OS)

12 sav. amžiaus ir vyresniems šunims aktyviai imunizuoti nuo šunų maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirozės, paragripo, pasiutligės ir dažniausiai pasitaikančių leptospirų padermių (*Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira canicola*, *Leptospira grippotyphosa*).

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima vakcinuoti karščiujančių gyvūnų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Injekcijos vietoje gali pasireikšti vietinė reakcija – žirnio dydžio sukietėjimas, kuris išnyksta per 3 sav. Labai retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vakciną reikia švirkšti po oda.

Nepriklausomai nuo gyvūno amžiaus, svorio ar veislės, po oda reikia švirkšti 1 ml vakcinės.

Pirmą kartą vakcinuoti galima 12 sav. amžiaus šuniukus.

Vakcinacijos schemą turi nustatyti veterinarijos gydytojas, atsižvelgęs į epizootinę situaciją ir su krekenomis įgytą pasyvų vakcinuojamų gyvūnų imunitetą. Norint išlaikyti nuolatinį vakcinuotų gyvūnų imunitetą gyvūnus reikia revakcinuoti kasmet.

Gyvūno amžius	Pavojus užsikrėsti infekcine liga		
	Nėra	Esant parvovirozės pavoju	Esant maro pavoju
5–6 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7–8 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8–10 sav.	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12–16 sav.	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Kasmet revakcinuoti	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Pastaba

Vakcinų pavadinimai skliausteliuose (P, R, DP, DHPPi) reiškia alternatyvų BIOCAN vakcinų pasirinkimą.

Vakcinų pavadinimai +C, +L, +LR reiškia galimybę tuo pat metu vakcinuoti kitomis BIOCAN vakcinomis.

Vėliau galima vakcinuoti ir kitomis vakcinomis:

BIOCAN M plus – šunims nuo *Microsporum canis* nuo 8 sav. amžiaus,

BIOCAN B – šunims nuo Laimo ligos nuo 12 sav. amžiaus,

BIOCAN T – šunims nuo stabligės, vyresniems nei 12 sav. amžiaus.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vieną dozę liofilizato reikia aseptiškai atskiesti viena doze skiediklio, gerai suplakti ir nedelsiant sušvirkšti.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti sausoje vėsioje vietoje, 2–8 °C temperatūroje.

Negalima sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.

Atskiestą vakciną reikia sunaudoti nedelsiant.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vakcinuoti galima tik sveikus ir gerai įmitusius šunis.

Rekomenduojama likus 10 d. iki numatomos vakcinacijos šunims skirti antiparazitinių vaistų.

Savaitę po vakcinacijos šunys neturi būti treniruojami ar patirti didelių krūvių.

Nerekomenduojama vakcinuoti kalių paskutiniąsias dvi šuningumo savaites dėl bendrinių nuostatų (pvz., galimi pažeidimai fiksuojant vaikingą patelę ir pan.).

Vakciną BIOCAN DHPPi+LR galima naudoti atskirai ar kartu su vakcinomis BIOCAN C, BIOCAN M Plus, BIOCAN B.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtus produktus. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Negalima maišyti su jokių kitų veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau nurodytas vakcinas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBavimo DATA

2014-11-03

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Farmakoterapinė grupė: gyvos ir inaktyvintos virusinės bei bakterinės vakcinos šunims.

ATCvet kodas: QI07AJ06.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu