

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Škatla}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Livipen 300 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje

Učinkovina:

prokainijev benzilpenicilinat monohidrat 300,00 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

12 × 100 ml

250 ml

12 x 250 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči (odrasli prašiči) in konji

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

7. KARENCAKarenca:Govedo:Meso in organi: 14 dni za trajanje zdravljenja 3 dni
16 dni za trajanje zdravljenja 4–7 dni

Mleko: 6 dni

Prašiči (odrasli prašiči):Meso in organi: 15 dni za trajanje zdravljenja 3 dni
17 dni za trajanje zdravljenja 4–7 dniKonji:Meso in organi: 14 dni za trajanje zdravljenja 3 dni
16 dni za trajanje zdravljenja 4–7 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Pred uporabo dobro pretresite.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

aniMedica GmbH

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0411/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{Viala}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Livipen 300 mg/ml suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje

Učinkovina:

prokainijev benzilpenicilinat monohidrat 300,00 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči (odrasli prašiči) in konji

4. POTI UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCAKarenca:Govedo:Meso in organi: 14 dni za trajanje zdravljenja 3 dni
16 dni za trajanje zdravljenja 4–7 dni

Mleko: 6 dni

Prašiči (odrasli prašiči):Meso in organi: 15 dni za trajanje zdravljenja 3 dni
17 dni za trajanje zdravljenja 4–7 dniKonji:Meso in organi: 14 dni za trajanje zdravljenja 3 dni
16 dni za trajanje zdravljenja 4–7 dni

Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Načeto zdravilo uporabite do.....

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Vsebnik shranjujte v zunanji ovojnini da se zaščiti pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

aniMedica GmbH

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}