

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

DRONTAL δισκία εμβονικής πυραντέλης και πραζικουαντέλης για γάτα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε δισκίο περιέχει:

Δραστικά συστατικά:

Pyrantel embonate 230 mg

Praziquantel 20 mg

Έκδοχα:

Βλ. πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Δισκίο

4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1 Είδη ζώων

Γάτα

4.2 Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Ενδείκνυται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γάτας από νηματώδη και κεστώδη παράσιτα.

Ασκαρίδες: *Toxocara cati* (συν. *mystax*), *Toxascaris leonina*

Αγκυλοστόματα: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*

Ταινίες (ενήλικες και άωρες μορφές): *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocystoides* spp. και *Joyeuxiella* spp.

Δε συνιστάται η χορήγηση δισκίων DRONTAL πριν από το τέλος των 6 εβδομάδων, καθώς η γάτα από τότε μόνο μπορεί να προσβληθεί από ταινίες και ασκαρίδες..

4.3 Αντενδείξεις

Επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για το συνδυασμό των δραστικών ουσιών του προϊόντος, να μη χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης.

Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με παράγωγα της πιπεραζίνης.

Να μη χορηγείται σε γάτες μικρότερες των 6 εβδομάδων.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Καμία

4.5 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Χρησιμοποιώντας το DRONTAL υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης ανοχής στο φάρμακο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Καμία

4.6 Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Δεν έχουν αναφερθεί.

4.7 Χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία

Να μη χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης.

4.8 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν είναι γνωστή καμία.

4.9 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1 δισκίο ανά 4 kg σωματικού βάρους εφάπαξ (δηλαδή 5 mg πραζικουαντέλης και 57,5 mg εμβονικής πυραντέλης/ kg σ.β.). Το δισκίο χορηγείται από το στόμα είτε απευθείας είτε αναμιγμένο με την τροφή ολόκληρο ή θρυμματισμένο. Δεν απαιτείται η λήψη διαιτητικών μέτρων.

4.10 Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα

Σε περίπτωση υπερδοσίας μπορεί μέσα σε 2-4 συνήθως ώρες μετά τη χορήγηση να προκληθεί ελαφρός έμετος, χωρίς καμία άλλη επίπτωση για την υγεία του ζώου.

4.11 Χρόνος(οι) αναμονής

Δεν απαιτείται.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: ανθελμινθικό
κωδικός ATCvet: QP52AA51

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Τα δισκία DRONTAL είναι ανθελμινθικά κατά των νηματωδών και των κεστωδών, που περιέχουν ως δραστικές ουσίες ένα παράγωγο της πυραζινοϊσοκινολίνης, την πραζικουαντέλη, και ένα παράγωγο της τετραϋδροπυριμιδίνης, την πυραντέλη (ως εμβονικό άλας).

Στο συνδυασμό αυτό, η πραζικουαντέλη δρα ως ανθελμινθικό κατά των κεστωδών με φάσμα που περιλαμβάνει όλα τα είδη που απαντώνται στη γάτα και συγκεκριμένα των *Taenia* spp., *Joyeuxiella* spp., *Dipylidium caninum*, *Mesocystoides* spp. και *Echinococcus multilocularis*. Η πραζικουαντέλη είναι δραστική για όλα τα στάδια εξέλιξης (άωρες και ώριμες μορφές) των προαναφερόμενων παρασίτων που απαντώνται στο έντερο της γάτας. Η πυραντέλη είναι το συστατικό του φάρμακου που δρα ειδικά κατά των νηματωδών που συναντώνται στη γάτα και ιδιαίτερα των *Toxocara cati* (συν. *mystax*), *Toxascaris leonina* και *Angylostoma* spp.

5.2 Φαρμακοκινητικά στοιχεία

Η πραζικουαντέλη απορροφάται πολύ γρήγορα από το δερματικό περίβλημα του παρασίτου και κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα σ' αυτό. Πολύ γρήγορα, τόσο in vitro όσο και in vivo, καταστρέφεται το δερματικό περίβλημα του παρασίτου, προκαλώντας τη σύσπαση και την παράλυσή του. Η ταχεία δράση του προϊόντος οφείλεται στη μεταβολή της διαπερατότητας της μεμβράνης του παρασίτου σε Ca^{++} που προκαλεί η πραζικουαντέλη. Αυτό οδηγεί στην απορρύθμιση του μεταβολισμού του παρασίτου.

Η πραζικουαντέλη, σε όλα τα είδη ζώων στα οποία μελετήθηκε, χορηγούμενη από το στόμα, απορροφάται ταχύτατα και σχεδόν εξολοκλήρου από το στομάχι και το λεπτό έντερο. Η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα του αίματος καταγράφεται εντός 0,3 έως 2 ωρών. Η πραζικουαντέλη διανέμεται τάχιστα σε όλα τα όργανα, μεταβολίζεται στο ήπαρ και απεκκρίνεται μέσα σε 48 ώρες με τα ούρα (40-71% απέκκριση) και με τα κόπρανα (13-30% απέκκριση).

Η πυραντέλη δρα ως χολινεργικός αγωνιστής, όπως η νικοτίνη, και προκαλεί σπαστική παράλυση των νηματωδών μέσω νευρομυϊκού αποκλεισμού. Το εμβονικό άλας της πυραντέλης απορροφάται ελάχιστα από το γαστρεντερικό σωλήνα όλων των ζώων που μελετήθηκαν.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Cellulose microcrystalline
Polyvinylpyrrolidone 25
Magnesium stearate
Silicon dioxide colloidal
Starch maize

Σύνθεση επικάλυψης

Opadry White TF 276U280002

6.2 Ασυμβατότητες

Δεν είναι γνωστή καμία.

6.3 Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 60 μήνες

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

6.5 Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Κουτί με 2, 6, 8, 20, 24 και 96 εγχάρακτα δισκία σε foil

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois 70200 Lure France

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

17911

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 19/08/1998
Ημερομηνία ανανέωσης: 04/12/2012

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

15/11/2024

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει.

A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Κουτί των 2, 8, 20, 24 και 96 δισκίων

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

DRONTAL tablets

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κάθε δισκίο περιέχει:

Δραστικά συστατικά:

Pyrantel embonate 230 mg

Praziquantel 20 mg

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Δισκίο

4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί των 2, 8, 20, 24 και 96 δισκίων

5. ΕΙΔΟΣ(Η) ΖΩΟΥ(ΩΝ)

Γάτα

6. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ενδείκνυται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γάτας από νηματώδη και κεστώδη παράσιτα.

Ασκαρίδες: *Toxocara cati* (συν. *mystax*), *Toxascaris leonina*

Αγκυλοστόματα: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*

Ταινίες (ενήλικες και άωρες μορφές): *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp. και *Lyoexiella* spp.

Δε συνιστάται η χορήγηση δισκίων DRONTAL πριν από το τέλος της ηλικίας των 6 εβδομάδων, καθώς η γάτα από τότε μόνο μπορεί να προσβληθεί από ταινίες και ασκαρίδες.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1 δισκίο ανά 4 kg σωματικού βάρους εφάπαξ (δηλαδή 5 mg πραζικουαντέλης και 57,5 mg εμβονικής πυραντέλης/ kg σ.β.). Το δισκίο χορηγείται από το στόμα είτε απευθείας είτε αναμιγμένο με την τροφή ολόκληρο ή θρυμματισμένο. Δεν απαιτείται η λήψη διαιτητικών μέτρων.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

9. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ)

Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσεως, πριν από τη χρήση.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΛΗΞΗ {μήνας/έτος}

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

12. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματα του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

13. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, αν υπάρχουν

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση - να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή.

14. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

15. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
France

16. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

17911

17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Παρτίδα {αριθμός}

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ BLISTER

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

DRONTAL tablets

2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Vetoquinol S.A.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΛΗΞΗ {μήνας/έτος}

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Παρτίδα {αριθμός}

5. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

DRONTAL δισκία εμβονικής πυραντέλης και πραζικουντέλης για γάτα

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois 70200 Lure France

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

KVP PHARMA & VETERINÄR PRODUKTE GmbH

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel, Germany

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois 70200 Lure France

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

DRONTAL tablets

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει:

Δραστικά συστατικά:

Pyrantel embonate 230 mg

Praziquantel 20 mg

Έκδοχα:

Cellulose microcrystalline

Polyvinylpyrrolidone 25

Magnesium stearate

Silicon dioxide colloidal

Starch maize

Σύνθεση επικάλυψης

Opadry White TF 276U280002

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ενδείκνυται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γάτας από νηματώδη και κεστώδη παράσιτα.

Ασκαρίδες: *Toxocara cati* (συν. *mystax*), *Toxascaris leonina*

Αγκυλοστόματα: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*

Ταινίες (ενήλικες και άωρες μορφές): *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp. και *Joyeuxiella* spp.

Δε συνιστάται η χορήγηση δισκίων DRONTAL πριν από το τέλος της ηλικίας των 6 εβδομάδων, καθώς η γάτα από τότε μόνο μπορεί να προσβληθεί από ταινίες και ασκαρίδες.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για το συνδυασμό των δραστικών ουσιών του προϊόντος, να μη χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης.

Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με παράγωγα της πιπεραζίνης.

Να μη χορηγείται σε γάτες μικρότερες των 6 εβδομάδων.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Γάτα

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1 δισκίο ανά 4 kg σωματικού βάρους εφάπαξ (δηλαδή 5 mg πραζικουαντέλης και 57,5 mg εμβονικής πυραντέλης/ kg σ.β.).

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το δισκίο χορηγείται από το στόμα είτε απευθείας είτε αναμιγμένο με την τροφή ολόκληρο ή θρυμματισμένο. Δεν απαιτείται η λήψη διαιτητικών μέτρων.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Σε περίπτωση υπερδοσίας μπορεί μέσα σε 2-4 συνήθως ώρες μετά τη χορήγηση να προκληθεί ελαφρός έμετος, χωρίς καμία άλλη επίπτωση για την υγεία του ζώου.

Χρησιμοποιώντας το DRONTAL υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής στο φάρμακο.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 15/11/2024

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με 2, 6, 8, 20, 24 και 96 εγχάρακτα δισκία σε foil

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 17911

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777