

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

RAPIDO DOG

Emulsione antiparassitaria per uso esterno per cani

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni litro di emulsione di RAPIDO DOG contiene:

Principio attivo:

Permetrina (cis/trans 25/75) 2,2 g

Cipermetrina (cis/trans 40/60) 1,0 g

Piperonilbutossido 3,0 g

Eccipienti:

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Emulsione per uso esterno.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

RAPIDO DOG è indicato nel trattamento delle infestazioni di pulci (*Ctenocephalides f.felis*) e zecche (*Ripicephalus sanguineus* e *Demacentor reticulatus*) dei cani .

4.3 Controindicazioni

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare in animali al di sotto di 1 anno di età.

Non usare in caso di ipersensibilità accertata ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario per istituire un'adeguata terapia. Non usare per trattamenti prolungati; dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il veterinario.

Consultare il veterinario prima di trattare i cuccioli.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Agitare bene il flacone prima dell'uso per ricostituire l'emulsione. Spruzzare il prodotto direttamente sul mantello dell'animale, con il flacone ad una distanza di cm 20-30, avendo cura che il prodotto penetri sotto il pelo. Si consiglia di frizionare il mantello dell'animale per qualche secondo con guanti di gomma o PVC in modo che il prodotto penetri fino alla cute. Il prodotto si fissa al pelo allungando così la sua efficacia. Si raccomanda di evitare di spruzzare il prodotto sul muso, occhi e interno delle orecchie. Evitare in ogni modo applicazioni eccessive o improprie del prodotto. Evitare di far ingerire o inalare il prodotto all'animale. Si consiglia di controllare l'animale: nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerli. Non operare controvento. Dopo l'applicazione ed in caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Le persone con nota ipersensibilità ai componenti del prodotto devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Informazioni per il medico: trattasi dell'associazione di due piretroidi (Cipermetrina e Permetrina) sinergizzati dall'azione del Piperonilbutossido.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Dopo l'uso possono verificarsi reazioni transitorie al sito di applicazione (prurito, eritema) ed eccezionalmente ipersalivazione, depressione.

4.7 Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

In mancanza di studi sulla specie di destinazione usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Via di somministrazione

Solo per uso esterno. Spruzzare con una pompa sulla cute dell'animale.

Agitare bene il flacone prima dell'uso per ricostituire l'emulsione. Spruzzare il prodotto direttamente sul mantello dell'animale, con il flacone ad una distanza di cm 20-30, avendo cura che il prodotto penetri sotto il pelo. Si consiglia di frizionare il mantello dell'animale per qualche secondo con guanti di gomma o PVC in modo che il prodotto penetri fino alla cute. Il prodotto si fissa al pelo allungando così la sua efficacia.

Posologia

In relazione alla lunghezza del pelo dell'animale (pelo raso, medio, lungo) applicare **RAPIDO DOG** ad una dose compresa tra 3 e 5 ml/kg di peso corporeo (pari a 6,6-11 mg di Permetrina, 3-5 mg di Cipermetrina, 9-15 mg di Piperonilbutossido per kg di peso corporeo). Le dosi indicate per kg di peso corporeo corrispondono a 4-6 spruzzate/kg con spruzzatore a pistola ed a 15 a 30 spruzzate/kg con pompetta nebulizzatrice.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non sono noti sintomi da sovradosaggio

Non superare le dosi consigliate evitando un uso eccessivo ed improprio.

4.11 Tempo di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

ATC vet CODE : QP53AC54

Gruppo farmacoterapeutico: ectoparassitici, insetticidi e repellenti.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

La Cipermetrina e la Permetrina sono due principi attivi piretroidi ad azione insetticida, particolarmente efficaci nei confronti dei parassiti esterni degli animali; essi sono coadiuvati nella loro azione dal potere sinergizzante del Piperonilbutossido.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

La Permetrina è un piretroide non sistemico la cui azione si esplica prevalentemente per contatto ed in minor misura per ingestione nei confronti di un vasto numero di ectoparassiti; ha un rapido potere abbattente ed un residuo effetto repellente; consente una protezione degli animali per oltre 60 giorni.

La Cipermetrina agisce per contatto ed ingestione nei confronti di adulti, uova e larve dei parassiti che infestano l'animale; le sue proprietà residuali conferiscono al prodotto una lunga durata d'azione.

Il Piperonilbutossido esplica la sua azione sinergica alla combinazione dei due principi attivi parassitici.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Membrana poliammidica (tipo Nylon), Filtri solari U.V.; Nonilfenolo (9 moli O.E.); Deodoranti; Acqua demineralizzata.

6.2 Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario, tanica da 5 L: 60 giorni

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C e proteggere dalla luce solare diretta. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Flaconi da ml 100, 200, 250, 300, 400, 500, 750 e 1000 in PE con erogatore.

Tanica da 5 litri in polietilene coestruso ad alta densità.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

RAPIDO DOG non deve essere disperso nei corsi d'acqua perché potrebbe essere pericoloso per i pesci ed altri organismi acquatici.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

CICIEFFE SRL

Via Provinciale, n.13

24040,Fornovo San Giovanni (BG)

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 100 ml con erogatore AIC n° 103290019

Flacone da 200 ml con erogatore AIC n° 103290021

Flacone da 250 ml con erogatore AIC n° 103290033

Flacone da 300 ml con erogatore AIC n° 103290045

Flacone da 400 ml con erogatore AIC n° 103290058

Flacone da 500 ml con erogatore AIC n° 103290060

Flacone da 750 ml con erogatore AIC n° 103290072

Flacone da 1000 ml con erogatore AIC n° 103290084

Tanica da 5 litri AIC n° 103290096

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

30/06/2001 / 01/07/2010

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

1/2017

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O UTILIZZAZIONE

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

RAPIDO DOG

Emulsione antiparassitaria per uso esterno a base di Permetrina, Cipermetrina, Piperonilbutossido per cani

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

CICIEFFE SRL-via G. Marconi 13-24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

CICIEFFE SRL-via G. Marconi 13-24040 Fornovo San Giovanni (BG)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO RAPIDO DOG

Emulsione antiparassitaria per uso esterno per cani

(Permetrina, Cipermetrina, Piperonilbutossido)

3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPI(O) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI Ogni L di emulsione di RAPIDO DOG contiene:

Principio attivo:

Permetrina (cis/trans 25/75)	2,2 g
Cipermetrina (cis/trans 40/60)	1,0 g
Piperonilbutossido	3,0 g

4. INDICAZIONE(I)

RAPIDO DOG è indicato nel trattamento delle infestazioni di pulci (*Ctenocephalides f.felis*) e zecche dei cani (*Rhipicephalus sanguineus* e *Demacentor reticulatus*).

5. CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con estese lesioni della pelle. Non utilizzare in animali al di sotto di 1 anno di età.

Non usare in caso di ipersensibilità accertata ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

Dopo l'uso possono verificarsi reazioni transitorie al sito di applicazione (prurito, eritema) ed eccezionalmente ipersalivazione, depressione.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione

Solo per uso esterno. Spruzzare con una pompa sulla cute dell'animale.

Agitare bene il flacone prima dell'uso per ricostituire l'emulsione. Spruzzare il prodotto direttamente sul mantello dell'animale, con il flacone ad una distanza di cm 20-30, avendo cura che il prodotto penetri sotto il pelo. Si consiglia di

frizionare il mantello dell'animale per qualche secondo con guanti di gomma o PVC in modo che il prodotto penetri fino alla cute. Il prodotto si fissa al pelo allungando così la sua efficacia.

Posologia

In relazione alla lunghezza del pelo dell'animale (pelo raso, medio, lungo) applicare **RAPIDO DOG** ad una dose compresa tra 3 e 5 ml/kg di peso corporeo (pari a 6,6-11 mg di Permetrina, 3-5 mg di Cipermetrina, 9-15 mg di Piperonilbutossido per kg di peso corporeo). Le dosi indicate per kg di peso corporeo corrispondono a 4-6 spruzzate/kg con spruzzatore a pistola ed a 15 a 30 spruzzate/kg con pompetta nebulizzatrice.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario per istituire un'ideale terapia. Non usare per trattamenti prolungati; dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il veterinario.

Consultare il veterinario prima di trattare i cuccioli

10. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C e proteggere dalla luce diretta. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenere il prodotto.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

Periodo di validità dopo prima apertura, tanica da 5 litri: 60 gg.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Si raccomanda di evitare di spruzzare il prodotto sul muso, occhi e interno delle orecchie. Evitare in ogni modo applicazioni eccessive o improprie del prodotto. Non superare le dosi consigliate. Evitare di far ingerire o inalare il prodotto all'animale. Si consiglia di controllare l'animale: nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerli. Non operare controvento. Dopo l'applicazione ed in caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Le persone con nota ipersensibilità ai componenti del prodotto devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non contaminare i corsi d'acqua. Non utilizzare contemporaneamente ad altre preparazioni antiparassitarie. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare la confezione ben chiusa.

Informazioni per il medico: trattasi dell'associazione di due piretroidi (cipermetrina e permetrina) sinergizzati dall'azione del piperonilbutossido.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

In mancanza di studi sulla specie di destinazione usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non superare le dosi consigliate, evitando un uso eccessivo ed improprio.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli abituali punti di raccolta per i medicinali scaduti o non utilizzati.

RAPIDO DOG non deve essere disperso nei corsi d'acqua perché potrebbe essere pericoloso per i pesci ed altri organismi acquatici.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
10/2017

15. ALTRE INFORMAZIONI

Flacone da 100 ml con erogatore	AIC n° 103290019
Flacone da 200 ml con erogatore	AIC n° 103290021
Flacone da 250 ml con erogatore	AIC n° 103290033
Flacone da 300 ml con erogatore	AIC n° 103290045
Flacone da 400 ml con erogatore	AIC n° 103290058
Flacone da 500 ml con erogatore	AIC n° 103290060
Flacone da 750 ml con erogatore	AIC n° 103290072
Flacone da 1000 ml con erogatore	AIC n° 103290084
Tanica da 5 litri	AIC n° 103290096

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**<INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONDIZIONAMENTO
PRIMARIO >**

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

VETERINARIO RAPIDO DOG

Emulsione antiparassitaria per uso esterno per cani
(Permetrina, Cipermetrina, Piperonilbutossido)

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

Ogni litro di emulsione di RAPIDO DOG contiene:

Principio attivo:

Permetrina (cis/trans 25/75)	2,2 g
Cipermetrina (cis/trans 40/60)	1,0 g
Piperonilbutossido	3,0 g

3. FORMA FARMACEUTICA

Emulsione per uso esterno

4. CONFEZIONI

Flacone da 250 ml
Flacone da 300 ml
Flacone da 400 ml
Flacone da 500 ml
Flacone da 750 ml
Flacone da 1000 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

6. INDICAZIONI

RAPIDO DOG è indicato nel trattamento delle infestazioni di pulci (*Ctenocephalides f. felis*) e zecche dei cani (*Rhipicephalus sanguineus* e *Demacantor reticulatus*).

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione

Solo per uso esterno. Spruzzare con la pompa sulla cute dell'animale.

Agitare bene il flacone prima dell'uso per ricostituire l'emulsione. Spruzzare il prodotto direttamente sul mantello dell'animale, con il flacone ad una distanza di cm 20-30, avendo cura che il prodotto penetri sotto il pelo. Si consiglia di frizionare il mantello dell'animale per qualche secondo con guanti di gomma o PVC in modo che il prodotto penetri fino alla cute. Il prodotto si fissa al pelo allungando così la sua efficacia.

Posologia

In relazione alla lunghezza del pelo dell'animale (pelo raso, medio, lungo) applicare **RAPIDO DOG** ad una dose compresa tra 3 e 5 ml/kg di peso corporeo (pari a 6,6-11 mg di Permetrina, 3-5 mg di Cipermetrina, 9-15 mg di Piperonilbutossido per kg di peso corporeo). Le dosi indicate per kg di peso corporeo corrispondono a 4-6 spruzzate/kg con spruzzatore a pistola ed a 15 a 30 spruzzate/kg con pompetta nebulizzatrice.

8. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario per istituire un'ideale terapia.

Non usare per trattamenti prolungati; dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il veterinario. Consultare il veterinario prima di trattare i cuccioli.

Controindicazioni

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con lesioni della pelle.

Non utilizzare in animali al di sotto di 1 anno di età.

Non usare in caso di ipersensibilità accertata ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Reazioni avverse

Dopo l'uso possono verificarsi reazioni transitorie al sito di applicazione (prurito, eritema) ed eccezionalmente ipersalivazione, depressione.

Segnalare al medico veterinario eventuali reazioni avverse e/o reazioni non menzionate nell'etichetta/foglietto illustrativo.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Si raccomanda di evitare di spruzzare il prodotto sul muso, occhi e interno delle orecchie. Evitare in ogni modo applicazioni eccessive o improprie del prodotto. Evitare di far ingerire o inalare il prodotto all'animale. Si consiglia di controllare l'animale: nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerli. Non operare controvento. Dopo l'applicazione ed in caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Le persone con nota ipersensibilità ai componenti del prodotto devono evitare contatti con il medicinale veterinario. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Non contaminare i corsi d'acqua. Non utilizzare contemporaneamente ad altre preparazioni antiparassitarie. Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare la confezione ben chiusa.

Informazioni per il medico: trattasi dell'associazione di due piretroidi (cipermetrina e permetrina) sinergizzati dall'azione del piperonilbutossido.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

In mancanza di studi sulla specie di destinazione usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non superare le dosi consigliate evitando un uso eccessivo ed improprio.

Incompatibilità: In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD {mese/anno}

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C e proteggere dalla luce diretta. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande.

12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI, OVE NECESSARIO

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

RAPIDO DOG non deve essere disperso nei corsi d'acqua perché potrebbe essere pericoloso per i pesci ed altri organismi acquatici.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN

CICIEFFE SRL
Via G. Marconi, 13
24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

CICIEFFE S.r.l. - Via G. Marconi, 13 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

16. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AIC n° 103290033 Flacone da 250 ml con erogatore
AIC n° 103290045 Flacone da 300 ml con erogatore
AIC n° 103290058 Flacone da 400 ml con erogatore
AIC n° 103290060 Flacone da 500 ml con erogatore
AIC n° 103290072 Flacone da 750 ml con erogatore
AIC n° 103290084 Flacone da 1000 ml con erogatore

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

<Lotto> {numero}

**<INFORMAZIONI DA APPORRE
SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO>**

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

VETERINARIO RAPIDO DOG

Emulsione antiparassitaria per uso esterno per cani
(Permetrina, Cipermetrina, Piperonilbutossido)

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

Ogni litro di emulsione di RAPIDO DOG contiene:

Principio attivo:

Permetrina (cis/trans 25/75) 2,2 g

Cipermetrina (cis/trans 40/60) 1,0 g

Piperonilbutossido 3,0 g

3. FORMA FARMACEUTICA

Emulsione per uso esterno

4. CONFEZIONI

Flacone da 100 ml

Flacone da 200 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani

6. INDICAZIONI

RAPIDO DOG è indicato nel trattamento delle infestazioni di pulci (*Ctenocephalides f.felis*) e zecche dei cani (*Rhipicephalus sanguineus* e *Demacantor reticulatus*).

7. MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

8. TEMPO DI ATTESA

Non pertinente

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD {mese/anno}

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C e proteggere dalla luce diretta. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande o recipienti destinati a contenere il prodotto.

12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI, OVE NECESSARIO

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

RAPIDO DOG non deve essere disperso nei corsi d'acqua perché potrebbe essere pericoloso per i pesci ed altri organismi acquatici.

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN

CICIEFFE SRL
Via G. Marconi 13
24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione
CICIEFFE S.r.l. Via G. Marconi, 13 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

16. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

AIC n° 103290019 Flacone da 100 ml con erogatore
AIC n° 103290021 Flacone da 200 ml con erogatore

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

<Lotto> {numero}

Spazio per la posologia prescritta, ai sensi del D.Lvo 193/06, art. 58, comma 1,

lettera f Spazio per codice a barre a lettura ottica (D.M. 17/12/2007)

13. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO” E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario. La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico-veterinaria.

14. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN

CICIEFFE SRL

Via G. Marconi, 13

24040 Fornovo San Giovanni (BG)

Responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

CICIEFFE S.r.l. - Via G. Marconi, 13 – 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

16. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

AIC n° 103290033 Flacone da 250 ml con erogatore

AIC n° 103290045 Flacone da 300 ml con erogatore

AIC n° 103290058 Flacone da 400 ml con erogatore

AIC n° 103290060 Flacone da 500 ml con erogatore

AIC n° 103290072 Flacone da 750 ml con erogatore

AIC n° 103290084 Flacone da 1000 ml con erogatore

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

<Lotto> {numero}