

## PROSPECTO:

### ILOVET-DHIPEN Suspensión intramamaria

### USO VETERINARIO

#### Composición por jeringa

Bencilpenicilina procaina .....	200.000	UI
Dihidroestreptomicina (sulfato) .....	100	mg
Excipiente c.s.		

#### Especies de destino

Bovinos: vacas en periodo de lactación

#### Indicaciones

Mamitis producidas por los siguientes gérmenes:

*Streptococcus uberis*, *S. agalactiae*, *S. dysgalactiae*, *S. zooepidermicus*, *S. pyogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Bacillus anthracis*, *Nocardia spp.*, *Listeria spp.*, *Actinomyces spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Pasteurella spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.* (algunas especies), *Pasteurella spp.*, *Mycobacterium spp.*, *Brucella spp.*

#### Posología y modo de administración

200.000 UI de Bencilpenicilina procaina + 100 mg de Dihidroestreptomicina (sulfato)/cuarterón (equivalente a una jeringa de 3 g de Ilovet-dhipen), cada 12 horas, durante 2-3 días.

#### Precauciones especiales para su utilización

Los animales deberán ser tratados al detectarse los primeros signos de mamitis, siempre durante el período de lactación.

Después del ordeño a fondo, antes de aplicar el producto, el cuarterón debe ser lavado con una solución antiséptica.

Tras aplicar el producto, masajear la ubre a fin de mejorar la distribución de la suspensión.

### **Contraindicaciones**

No administrar a:

- Animales con historial de hipersensibilidad a las penicilinas y/o aminoglucósidos.

### **Interacciones e incompatibilidades**

No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos u otros aminoglucósidos, debido a su antagonismo.

### **Efectos secundarios**

No se han descrito.

### **Sobredosificación y su tratamiento**

El modo de empleo del producto hace muy improbable una intoxicación por sobredosificación.

### **Tiempo de espera**

Leche: 4 días

Carne: 10 días

### **Advertencias especiales para cada especie de destino**

No se han descrito.

### **Utilización durante la gestación y la lactancia**

No se han descrito contraindicaciones durante estos períodos.

### **Presentaciones**

4 Jeringas de 3 g

**Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz**

**Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo, deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.**

## Prescripción veterinaria

### Registro Nº 1251 ESP

Titular:

CZ Vaccines S.A.U.  
A Relva s/n – Torneiros  
36410 O Porriño  
Pontevedra  
España

Representante del titular:

Vetia Animal Health, S.A.U.  
A Relva s/n – Torneiros  
36410 O Porriño  
Pontevedra  
España