

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**  
**Faltschachtel 20 ml Flasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

SEDIVET 10 mg/ml Injektionslösung für Pferde

**2. WIRKSTOFF(E)**

Pro ml:  
Romifidinhydrochlorid 10 mg (entsprechend 8,76 mg Romifidin)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

20 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferde

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.v.

**7. WARTEZEIT(EN)****Wartezeit:**

Essbare Gewebe: 6 Tage.  
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalverpackung aufbewahren.  
Vor Frost schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. ZULASSUNGSNR(N)**

BE-V156676

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****Flaschen 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

SEDIVET 10 mg/ml Injektionslösung für Pferde

**2. WIRKSTOFF**

Romifidinhydrochlorid: 10 mg/ml

**3. ZIELTIERARTEN**

Pferde

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.v.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

**5. WARTEZEITEN****Wartezeiten:**

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

In der Originalverpackung aufbewahren.

Vor Frost schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}