

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel für 1 x 50 ml bzw. 1 x 100 ml Flasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bravoxin Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (1 ml) enthält:

<i>C. perfringens</i> Typ A – (α)-Toxoid	≥ 0,5 IE
<i>C. perfringens</i> Typ B & C – (β)-Toxoid	≥ 18,2 IE
<i>C. perfringens</i> Typ D – (ϵ)-Toxoid	≥ 5,3 IE
<i>C. chauvoei</i> Vollkultur, inaktiviert	≥ 90% Schutz
<i>C. novyi</i> - Toxoid	≥ 3,8 IE
<i>C. septicum</i> - Toxoid	≥ 4,6 IE
<i>C. tetani</i> - Toxoid	≥ 4,9 IE
<i>C. sordellii</i> - Toxoid	≥ 4,4 E
<i>C. haemolyticum</i> - Toxoid	≥ 17,4 E

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schaf

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Vor Licht schützen.
Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH
AT: Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: PEI.V.12037.01.1
AT: Z.Nr.: 840495

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett Flasche - 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bravoxin Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (1 ml) enthält:

<i>C. perfringens</i> Typ A – (α)-Toxoid	≥ 0,5 IE
<i>C. perfringens</i> Typ B & C – (β)-Toxoid	≥ 18,2 IE
<i>C. perfringens</i> Typ D – (ε)-Toxoid	≥ 5,3 IE
<i>C. chauvoei</i> Vollkultur, inaktiviert	≥ 90% Schutz
<i>C. novyi</i> - Toxoid	≥ 3,8 IE
<i>C. septicum</i> - Toxoid	≥ 4,6 IE
<i>C. tetani</i> - Toxoid	≥ 4,9 IE
<i>C. sordellii</i> - Toxoid	≥ 4,4 E
<i>C. haemolyticum</i> - Toxoid	≥ 17,4 E

3. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schaf

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH
AT: Intervet GesmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett Flasche - 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bravoxin



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Clostridien-Zellen und - toxoide; siehe Packungsbeilage.

50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

