

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja para viales de 100 y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FLORFENICEN 300 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Florfenicol 300 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Carne: Vía IM (20 mg/kg peso vivo, dos veces): 30 días
Vía SC (40 mg/kg peso vivo, dosis única): 44 días

Ovino:

Carne: 39 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano, incluyendo animales gestantes destinados a producir leche para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 18 días

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CENAVISA, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2621 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot{número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiquetas para viales de 100 ml y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FLORFENICEN 300 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Florfenicol 300 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o subcutánea.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:Carne: Vía IM (20 mg/kg peso vivo, dos veces): 30 días
Vía SC (40 mg/kg peso vivo, dosis única): 44 díasOvino:

Carne: 39 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano, incluyendo animales gestantes destinados a producir leche se para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 18 días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN



Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

CENAVISA, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}