

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltkarton

50 ml Durchstechflasche

100 ml Durchstechflasche

250 ml Durchstechflasche

10 x 100 ml Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pronestesic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Procainhydrochlorid 40 mg (entsprechend 34,65 mg Procain)

Epinephrinhydrogentartrat 0,036 mg (entsprechend 0,02 mg Epinephrin).

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

10x100 ml

4. ZIELTIERART(EN)



5. ANWENDUNGSGEBIETE

-

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane und perineurale Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp: {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen, verwendbar bis: _____

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Die Durchstechflasche im Umschlag aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

FATRO S.p.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr.: 836934

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100 ml Etikett
250 ml Etikett

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pronestesic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:
Procainhydrochlorid 40 mg (entsprechend 34,65 mg Procain)
Epinephrinhydrogentartrat 0,036 mg (entsprechend 0,02 mg Epinephrin).

3. ZIELTIERART(EN)



4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane und perineurale Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

6. VERFALLDATUM

Exp: {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

FATRO S.p.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

50 ml Etikett

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pronestesic

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Jeder ml enthält:

Procainhydrochlorid 40 mg (entspricht 34,65 mg Procain)

Epinephrinhydrogentartrat 0,036 mg (entspricht 0,02 mg Epinephrin).

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____