

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MS-H Vaccine okulonazāla suspensija

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela:

Viena deva (30 µl) satur:

Mycoplasma synoviae, celms MS-H, dzīvs, novājināts, termojutīgs, vismaz $10^{5.7}$ KMV*

* krāsu mainošās vienības

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs	Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai
Modificēta Frey barotne, kas satur fenola sarkano un cūku serumu.	

Sarkanīgi oranža līdz salmu krāsas, caurspīdīga suspensija.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Vistas.

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Nākamo vaislas broileru, nākamo vaislas dējējvistu un nākamo dējējvistu aktīvai imunizācijai no 5 nedēļu vecuma, lai mazinātu gaisa maisu bojājumus un olu skaitu ar patoloģiski izveidotām čaumalām, ko izraisa *Mycoplasma synoviae*.

Imunitātes iestāšanās: 4 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums pret gaisa maisu bojājumiem: 40 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums, kuras laikā tiek samazināts olu skaits ar patoloģiski izveidotām čaumalām: nav noteikts.

3.3. Kontrindikācijas

Nav.

Skatīt arī 3.7. apakšpunktu.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Nelietot antibiotikas ar iedarbību pret mikoplazmām 2 nedēļas pirms un 4 nedēļas pēc vakcinācijas.

Šādas antibiotikas ir, piemēram, tetraciklīns, tiamulīns, tilozīns, kvinoloni, linkospektīns, gentamicīns vai makrolīdi.

Ja nepieciešams lietot antibiotikas, kā primārās jāizvēlas antibiotikas bez iedarbības pret mikoplazmām, piemēram, penicilīns, amoksicilīns vai neomicīns. Tās nedrīkst lietot 2 nedēļu laikā pēc vakcinācijas.

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Visi putni, kas ganāmpulkā/izmitināti kopā, jāvakcinē vienlaikus.

Vakcinēt tikai tos putnu ganāmpulkus, kuriem nav antivielas pret *M. synoviae*. Putniem, kas brīvi no *M. synoviae*, vakcināciju veikt vismaz 4 nedēļas pirms paredzamā kontakta ar virulento *M. synoviae*. Vispirms *M. synoviae* infekcija ir jāpārbauda jaunputniem. Parasti *M. synoviae* esamību ganāmpulka putniem pārbauda, veicot netiešu diagnostikas testu (piem., ātrās seruma aglutinācijas testu (RSAT) vai ELISA) asins paraugos, kas pārbaudīti 24 stundu laikā pēc noņemšanas. Vēlams *M. synoviae* esamību pārbaudīt, veicot tiešu diagnostikas testu (piem., PQR), tā laika dēļ, kas nepieciešams serokonversijai pēc infekcijas.

Vakcīnas celms var izplatīties no vakcinētiem putniem uz nevakcinētiem, tostarp savvaļas sugām. Vakcinētais putns var inficēt citus visa sava mūža laikā. Jāpiemēro īpaši piesardzības pasākumi, lai novērstu vakcīnas celmu izplatīšanos uz citām putnu sugām, un ir svarīgi, ka visi putni, kas ganāmpulkā/izmitināti kopā, ir vakcinēti.

Vakcīnas celms ir atrodams vīstū elpceļos līdz 55 nedēļām pēc vakcinēšanas.

Atšķirību starp lauka vīrusa celmiem un *M. synoviae* vakcīnas celmiem var noteikt, laboratoriski veicot Hamonda klasifikāciju vai augstas izšķirtspējas kušanas (HRM) analīzi.

M. synoviae infekcija rada īslaicīgi pozitīvu antivielu atbildes reakciju uz *Mycoplasma gallisepticum*. Lai gan dati nav pieejami, visticamāk šī vakcīna radīs īslaicīgi pozitīvu antivielu atbildes reakciju uz *Mycoplasma gallisepticum* un tādējādi var ietekmēt *Mycoplasma gallisepticum* seroloģisko uzraudzību. Ja nepieciešams, turpmāko 2 *Mycoplasma* sugu diferencēšanu var veikt, laboratoriski veicot PQR. Paraugi, kurus var lietot PQR, ir uztriepes, kas ņemtas no patoloģiskām vietām, piemēram, trahejas, aukslēju kaula plaisas, gaisa maisiem vai locītavām.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ietver aizsargcimdus un aizsargbrilles.

Ja vakcīna nejauši iekļūst lietotāja acīs, acis un seja rūpīgi jānomazgā ar ūdeni, lai izvairītos no iespējamām reakcijām uz vakcīnas sastāvdaļām.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Nav piemērojami.

Citi piesardzības pasākumi:

Nav piemērojami.

3.6. Blakusparādības

Vistas:

Nav zināmas.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam pārstāvim vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Dējējputniem:

Nelietot putniem dēšanas periodā un 5 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņemt, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

3.9. Lietošanas veids un devas

Okulonazālai lietošanai.

Cāļiem no 5 nedēļu vecuma.

Ievadīt okulonazāli vienu 30 µl devu.

Neatvērtu flakonu strauji atkausēt ūdens vannā ar regulējamu temperatūras režīmu 10 minūtes, temperatūrā no 33 – 35 °C. Neatkausēt augstā temperatūrā ilgu laika posmu. Pēc atkausēšanas, 2 stundu laikā, lietot to istabas temperatūrā (22 – 27 °C). Atkausēšanas laikā viegli skalināt flakonu. Pēc atkausēšanas atkārtoti, vairākkārt apgriezt flakonu, lai nodrošinātu satura sajaukšanos.

Noņemt alumīnija vāciņu un gumijas aizbāzni pirms plastmasas dozatora gala vai citas ievadīšanas ierīces lietošanas. Lietot kalibrētu dozatoru vai ierīci, lai iepilinātu precīzi 30 µl vakcīnas. Izvairīties no piesārņošanas.

Turēt putnu ar tā galvu noliektu uz vienu pusi. Apgriezt dozatora flakonu vai sagatavot ierīci, lai tās galā būtu viens piliens, kas brīvi iekrīt atvērtā acī un vienmērīgi izplūst. Piliens (pirms izpilināšanas) un dozatora gals nedrīkst aizskart acs virsmu.

Ļaut putnam nomirkšķināt aci pirms piliena izpilināšanas.

3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Pēc 8 reizes lielākas devas ievadīšanas blakusparādības netika novērotas.

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

3.12. Ierobežojumu periods

Nulle dienas.

4. IMUNOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATĶvet kods: QI01AE03.

Vakcīna vistām ierosina aktīvu imunitāti pret *Mycoplasma synoviae*.

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 5 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā iepakojuma atvēršanas: 2 stundas.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt sasaldētu līdz -70 °C ne ilgāk kā 5 gadus.

Pēc izņemšanas no dziļās sasaldēšanas turpmākā īslaicīgā uzglabāšana ir atļauta līdz -18 °C ne ilgāk kā 4 nedēļas. Pēc uzglabāšanas līdz -18 °C vakcīnu nedrīkst atkārtoti uzglabāt temperatūrā -70 °C.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Plastmasas, ZBPE 30 ml flakons (1000 devas) ar butila gumijas aizbāzni, kas pārklāts ar alumīnija vāciņu.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited

7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)

EU/2/11/126/001

8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 14/06/2011

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 17/05/2016

9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

{MM/GGGG}

10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

II PIELIKUMS

CITI TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Nav.

III PIELIKUMS
MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

PIEZĪME: nav kartona kastītes

UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

ZBPE PUDELES MARKĒJUMS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MS-H Vaccine



2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

1000 devas

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Veterināro zāļu nosaukums

MS-H Vaccine okulonazāla suspensija

2. Sastāvs

Viena deva (30 µl) satur:

Aktīvā viela:

Mycoplasma synoviae, celms MS-H, dzīvs, novājināts, termojūtīgs, vismaz $10^{5,7}$ CCU*

* krāsu mainošās vienības

Palīgvielas:

Modificēta Frey barotne, kas satur fenola sarkano un cūku serumu.

Sarkanīgi oranža līdz salmu krāsas, caurspīdīga suspensija.

3. Mērķsugas

Vistas.

4. Lietošanas indikācijas

Nākamo vaislas broileru, nākamo vaislas dējējvistu un nākamo dējējvistu aktīvai imunizācijai no 5 nedēļu vecuma, lai mazinātu gaisa maisa bojājumus un olu skaitu ar patoloģiski izveidotām čaumalām, ko izraisa *Mycoplasma synoviae*.

Imunitātes iestāšanās: 4 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums pret gaisa maisu bojājumiem: 40 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums, kuras laikā tiek samazināts olu skaits ar patoloģiski izveidotām čaumalām: nav noteikts.

5. Kontrindikācijas

Nav.

6. Īpaši brīdinājumi

Nelietot antibiotikas ar iedarbību pret mikoplazmām 2 nedēļas pirms un 4 nedēļas pēc vakcinācijas. Šādas antibiotikas ir, piemēram, tetraciklīns, tiamulīns, tilozīns, kvinoloni, linkospektīns, gentamicīns vai makrolīdi.

Ja nepieciešams lietot antibiotikas, kā primārās jāizvēlas antibiotikas bez iedarbības pret mikoplazmām, piemēram, penicilīns, amoksicilīns vai neomicīns. Tās nedrīkst lietot 2 nedēļu laikā pēc vakcinācijas.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

- Visi putni, kas ganāmpulkā/izmitināti kopā, jāvakcinē vienlaikus.

- Vakcinēt tikai tos putnu ganāmpulkus, kuriem nav antivielas pret *MS (M. synoviae)*. Putniem, kas brīvi no *M. synoviae*, vakcināciju veikt vismaz 4 nedēļas pirms paredzamā kontakta ar virulento *M. Synoviae*.
- Vispirms *M. synoviae* infekcija ir jāpārbauda jaunputniem. Parasti *M. synoviae* esamību ganāmpulka putniem pārbauda, veicot netiešu diagnostikas testu (piem., ātrās seruma aglutinācijas testu (*RSAT*) vai *ELISA*) asins paraugos, kas pārbaudīti 24 stundu laikā pēc noņemšanas. Vēlams *M. synoviae* esamību pārbaudīt, veicot tiešu diagnostikas testu (piem., PQR), tā laika dēļ, kas nepieciešams serokonversijai pēc infekcijas.
- Vakcīnas celms var izplatīties no vakcinētiem putniem uz nevakcinētiem, tostarp savvaļas sugām. Vakcinētais putns var inficēt citus visa sava mūža laikā. Jāpiemēro īpaši piesardzības pasākumi, lai novērstu vakcīnas celmu izplatīšanos uz citām putnu sugām, un ir būtiski svarīgi, ka visi putni, kas ganāmpulkā/izmitināti kopā, ir vakcinēti.
- Atšķirību starp lauka vīrusa celmiem un *M. synoviae* vakcīnas celmiem var noteikt, laboratoriski veicot Hamonda klasifikāciju vai augstas izšķirtspējas kušanas (*HRM*) analīzi.
- *M. synoviae* infekcija rada īslaicīgi pozitīvu antivielu atbildes reakciju uz *Mycoplasma gallisepticum*. Lai gan dati nav pieejami, visticamāk vakcīna radīs īslaicīgi pozitīvu antivielu reakciju uz *Mycoplasma gallisepticum* un tādējādi var ietekmēt *Mycoplasma gallisepticum* seroloģisko uzraudzību. Ja nepieciešams, turpmāko 2 *Mycoplasma* sugu diferencēšanu var veikt laboratoriski veicot PQR. Paraugi, kurus var lietot ar PQR, ir uztriepes, kas ņemtas no patoloģiskām vietām, piemēram, trahejas, aukslēju kaula plaisas, gaisa maisiem vai locītavām.
- Vakcīnas celms ir atrodams vīrusu elpceļos līdz 55 nedēļām pēc vakcinēšanas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

- Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ietver aizsargcimdus un aizsargbrilles.
- Ja vakcīna nejauši iekļuvusi lietotāja acīs, acis un seja rūpīgi jānomazgā ar ūdeni, lai izvairītos no iespējamām reakcijām uz vakcīnas sastāvdaļām.

Dējējputni:

Nelietot putniem dēšanas periodā un 5 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, kad to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par šīs vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņemt, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana:

Pēc 8 reizes lielākas devas ievadīšanas blakusparādības netika novērotas.

Būtiska nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

7. Blakusparādības

Vistas:

Nav zināmas.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: <{informācija par nacionālo ziņošanas sistēmu}>

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Okulonazālai lietošanai.

Cāļus vakcinēt vienu reizi, ievadot vienu pilienu (30 µl), no 5 nedēļu vecuma un vismaz 5 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Cāļiem no 5 nedēļu vecuma.

Ievadīt okulonazāli vienu 30 µl devu.

- Neatvērto flakonu strauji atkausēt ūdens vannā ar regulējamu temperatūras režīmu 10 minūtes, temperatūrā 33 – 35°C. Neatkausēt augstā temperatūrā ilgu laika posmu. Pēc atkausēšanas 2 stundu laikā, lietot to istabas temperatūrā (22 – 27 °C). Atkausēšanas laikā viegli skalināt flakonu. Pēc atkausēšanas atkārtoti vairākkārt apgriezt flakonu, lai nodrošinātu satura sajaukšanos.
- Noņemt alumīnija vāciņu un gumijas aizbāzni pirms plastmasas dozatora gala vai citas ievadīšanas ierīces lietošanas. Lietot kalibrētu dozatoru vai ierīci, lai iepilinātu precīzi 30 µl vakcīnas. Izvairīties no piesārņošanas.
- Turēt putnu ar tā galvu noliektu uz vienu pusi. Apgriezt dozatora flakonu vai sagatavot ierīci, lai tās galā būtu viens piliens, kas brīvi iekrīt atvērtā acī un vienmērīgi izplūst. Piliens (pirms izpilināšanas) un dozatora gals NEDRĪKST aizskart acs virsmu.

Ļaut putnam nomirkšķināt aci pirms piliena izpilināšanas.

10. Ierobežojumu periods

Nulle dienas.

11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt sasaldētu līdz -70 °C ne ilgāk kā 5 gadus. Pēc izņemšanas no dziļās sasaldēšanas turpmākā īslaicīgā uzglabāšana ir atļauta līdz -18 °C ne ilgāk kā 4 nedēļas. Pēc uzglabāšanas līdz -18 °C vakcīnu nedrīkst atkārtoti uzglabāt temperatūrā -70 °C.

Pēc atkausēšanas izlietot 2 stundu laikā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Recepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

EU/2/11/126/001

Plastmasas, LDPE 30 ml flakons (1000 devas) ar butila gumijas aizbāzni, kas pārklāts ar alumīnija vāciņu.

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

<{MM/GGGG}>

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited
4 Fitzwilliam Terrace
Strand Road
Bray
WICKLOW
A98 T6H6
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Laboratoire LCV
Z.I. du Plessis Beuscher
35220 Chateaubourg
Francija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar tirdzniecības atļaujas turētāja vietējo pārstāvi.

België/Belgique/Belgien

Vetpharm

Oude Iepersestraat 88

BE-8870 Izegem

E-mail: info@vetpharm.be

Tel: + 32 51 30 31 00

Lietuva

UAB Vetmarket

Nemuno g. 4, Virbališkių k., Kaunas

LT-53458

E-mail: info@vetmarket.lt

Tel: +370 37 384003

Република България

Dremax Kft.

Fehérvári str. 83

HU-1119 Budapest

E-mail: matyas.essosy@dremax.ltd

Тел: +36 30 311 6908

Luxembourg/Luxemburg

Vetpharm

Oude Iepersestraat 88

BE-8870 Izegem

E-mail: info@vetpharm.be

Tel: + 32 51 30 31 00

Česká republika

Dremax Kft.

Fehérvári str. 83

HU-1119 Budapest

E-mail: matyas.essosy@dremax.ltd

Tel: +36 30 311 6908

Magyarország

Dremax Kft.

Fehérvári str. 83

HU-1119 Budapest

E-mail: matyas.essosy@dremax.ltd

Tel: +36 30 311 6908

Danmark

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited

4 Fitzwilliam Terrace

Strand Road, Bray

WICKLOW

IE-A98 T6H6

Tlf: +353 86 1784658

Malta

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited

4 Fitzwilliam Terrace

Strand Road, Bray

WICKLOW

IE-A98 T6H6

Tel: +353 86 1784658

Deutschland

Gallicare GbR

Leopoldstraße 116

DE-06366 Köthen

E-mail: info@gallicare.de

Tel: +49 3496 405228

Nederland

Vetpharm

Oude Iepersestraat 88

BE-8870 Izegem

E-mail: info@vetpharm.be

Tel: + 32 51 30 31 00

Eesti

UAB Vetmarket

Nemuno g. 4, Virbališkių k., Kaunas

LT-53458

E-mail: info@vetmarket.lt

Tel: +370 37 384003

Norge

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited

4 Fitzwilliam Terrace

Strand Road, Bray

WICKLOW

IE-A98 T6H6

Tlf: +353 86 1784658

Ελλάδα

Ελάνκο Ελλάς ΑΕΒΕ

Μεσογείων 335

EL-152 31 Χαλάνδρι, Αττική

Τηλ: +302130065000

E-mail: contact@elanco.gr**Österreich**

Gallicare GbR

Leopoldstraße 116

DE-06366 Köthen

E-mail: info@gallicare.de

Tel: +49 3496 405228

España

Ceva Salud Animal, S.A.
Avenida Diagonal, 609-615, 9ª planta
ES-08028 Barcelona
E-mail: ceva-salud-animal@ceva.com
Tel: + 34 93 2920660

France

Laboratoire L.C.V.
ZI Plessis Beucher
FR-35220 Châteaubourg
Tél : + 33 (0)2 99 00 92 92

Hrvatska

Dremax Kft.
Fehérvári str. 83
HU-1119 Budapest
e-mail: matyas.essosy@dremax.ltd
Tel: +36 30 311 6908

Ireland

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited
4 Fitzwilliam Terrace
Strand Road, Bray
WICKLOW
IE-A98 T6H6
Tel: +353 86 1784658

Ísland

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited
4 Fitzwilliam Terrace
Strand Road, Bray
WICKLOW
IE-A98 T6H6
Tel: +353 86 1784658

Italia

Boehringer-Ingelheim Animal Health Italia
S.p.a.
Via Vezza d'Oglio-3
IT-20139 Milan
E-mail: BIAHitalia@legalmail.it
Tel: +39 02 5355821

Polska

B4Vet Sp. z o.o.
Ul. Wodna 26, Lubawka, Dolnoslaskie
PL-58-420
E-mail: gabor.kis@B4Vet.com
Tel: +48 728 884 232

Portugal

Ceva Saúde Animal
Rua Dr. António Loureiro Borges, 9/9A - 9º A
PT-1495-131 Algés
E-mail: cevaportugal@ceva.com
Tel: + 351 214 228 400
Fax: (+351) 214 228 422

România

Dremax Kft.
Fehérvári str. 83
HU-1119 Budapest
E-mail: matyas.essosy@dremax.ltd
Tel: +36 30 311 6908

Slovenija

Dremax Kft.
Fehérvári str. 83
HU-1119 Budapest
E-mail: matyas.essosy@dremax.ltd
Tel: +36 30 311 6908

Slovenská republika

Dremax Kft.
Fehérvári str. 83
HU-1119 Budapest
E-mail: matyas.essosy@dremax.ltd
Tel: +36 30 311 6908

Suomi/Finland

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited
4 Fitzwilliam Terrace
Strand Road, Bray
WICKLOW
IE-A98 T6H6
Tel: +353 86 1784658

Κύπρος

Activet

Viomichanias 10D

CY-2671, Agioi Trimithias

Τηλ: +357 22 591918

φαξ: +357 22 591917

κινητό: +357 99 615105

E-mail: costas.activet@cytanet.com.cy**Latvija**

UAB Vetmarket

Nemuno g. 4, Virbališkių k., Kaunas

LT-53458

E-mail: info@vetmarket.lt

Tel: +370 37 384003

Sverige

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited

4 Fitzwilliam Terrace

Strand Road, Bray

WICKLOW

IE-A98 T6H6

Tel: +353 86 1784658

United Kingdom (Northern Ireland)

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited

4 Fitzwilliam Terrace

Strand Road, Bray

WICKLOW

IE-A98 T6H6

Tel: +353 86 1784658