



## PROSPECTO

ELIMINALL 67 mg SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS  
ELIMINALL 134 mg SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS  
ELIMINALL 268 mg SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS  
ELIMINALL 402 mg SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS

### 1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote::

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Eslovenia

Representante del Titular:

Zoetis Spain, S.L.  
Avda. de Europa 20 B  
Parque Empresarial La Moraleja  
28108 Alcobendas (Madrid)  
España

### 2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ELIMINALL 67 mg SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS  
ELIMINALL 134 mg SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS  
ELIMINALL 268 mg SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS  
ELIMINALL 402 mg SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS  
Fipronilo

### 3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Cada pipeta unidosis contiene:

Unidosis	Sustancia activa	Concentración	Excipiente	
			Butilhidroxianisol (E320)	Butilhidroxitolueno (E321)
Eliminall 67 mg	Fipronilo	67 mg	0,134 mg	0,067 mg
Eliminall 134 mg	Fipronilo	134 mg	0,27 mg	0,13 mg
Eliminall 268 mg	Fipronilo	268 mg	0,54 mg	0,27 mg
Eliminall 402 mg	Fipronilo	402 mg	0,80 mg	0,40 mg

Líquido transparente de color amarillo a amarillo claro.



#### 4. INDICACIÓN(ES) DE USO

Tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Dermacentor reticulatus*).

Para el tratamiento de las infestaciones de piojos mordedores en perros *Trichodectes canis*. La mayoría de los piojos mueren en de 2 días. La eficacia insecticida frente a nuevas infestaciones por pulgas adultas persiste durante 8 semanas.

El medicamento veterinario presenta eficacia acaricida persistente durante 3 semanas frente a *Ixodes ricinus* y durante 4 semanas frente a *Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor reticulatus*. Si se han fijado algunas especies de garrapatas (*Ixodes ricinus* y *Rhipicephalus sanguineus*), antes de aplicar el medicamento veterinario, es posible que no todas las garrapatas se eliminen durante las primeras 48 horas.

El medicamento veterinario puede emplearse como parte de la estrategia de tratamiento para el control de la Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulgas (DAPP), una vez diagnosticada previamente por un veterinario.

#### 5. CONTRAINDICACIONES

En ausencia de datos disponibles, el medicamento veterinario no debe utilizarse en cachorros de menos de 2 meses de edad y/o que pesen menos de 2 kg.

No usar en animales enfermos (ej. enfermedades sistémicas, fiebre...) o convalecientes.

No usar en conejos, ya que pueden producirse reacciones adversas e incluso la muerte.

Este medicamento veterinario está especialmente desarrollado para perros. No utilizar en gatos ya que esto podría llevar a sobredosisificación.

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo, a sulfóxido de dimetilo o a cualquiera de los demás excipientes.

#### 6. REACCIONES ADVERSAS

Si el animal se lame, se puede observar un breve periodo de hipersalivación.

Entre las reacciones adversas sospechosas extremadamente raras que se han comunicado después de la utilización del medicamento veterinario, se han descrito reacciones cutáneas transitorias en la zona de la aplicación (descamación, alopecia local, prurito, eritema) y prurito o alopecia generales. En casos excepcionales, tras la administración, se ha observado hipersalivación, síntomas neurológicos reversibles (hiperestesia, depresión, síntomas nerviosos), vómitos o síntomas respiratorios.

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

#### 7. ESPECIES DE DESTINO

Perros.

#### 8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración y dosis:


Sólo para uso externo.

Administrar mediante aplicación tópica sobre la piel según el peso corporal del animal como se indica:

Perros	Número de pipetas	Volumen de las pipetas	Potencia
Más de 2 kg hasta 10 kg	1 pipeta	0,67 ml	67 mg
Más de 10 kg hasta 20 kg	1 pipeta	1,34 ml	134 mg
Más de 20 kg hasta 40 kg	1 pipeta	2,68 ml	268 mg
40 kg hasta 60 kg	1 pipeta	4,02 ml	402 mg
Más de 60 kg	1 pipeta + pipeta menor apropiada	4,02 ml + combinación apropiada	402 mg + combinación apropiada

Método de administración:

1. Extraer la pipeta de la bolsa. Sujetar la pipeta hacia arriba, girar y quitar el tapón.
2. Dar la vuelta al tapón y colocar el otro extremo del mismo sobre la pipeta. Presionar y girar el tapón para romper el precinto, después quitar el tapón de la pipeta.
3. Separar el pelo del animal entre las escápulas dejando expuesta la piel.
4. Colocar la punta de la pipeta sobre la piel y apretar la pipeta unidosis varias veces para vaciar el contenido directamente sobre la piel en uno o dos puntos.



## 9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario se aplica sobre una zona en la que el animal no pueda lamerse y asegurarse de que los animales no se lamen los unos a los otros después del tratamiento.

Debe separarse el pelo y aplicar el medicamento veterinario sobre la piel. Pueden observarse cambios temporales en el manto (pelo enredado o graso y/o depósitos en el pelo) en la zona de aplicación.

Para un control óptimo de la infestación por pulgas y/o garrapatas, la pauta de tratamiento puede basarse en la situación epidemiológica local.

En ausencia de estudios de seguridad, el intervalo mínimo de tratamiento es de 4 semanas.



## 10. TIEMPO DE ESPERA

No procede.

## 11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Conservar en el envase original con objeto de protegerlo de la luz y la humedad.

Mantener el medicamento veterinario a temperatura ambiente (superior a 14º) aproximadamente una hora antes de su administración.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja , el blíster y la pipeta después de {CAD}. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

## 12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Deben evitarse baños o inmersión en agua durante los 2 días siguientes a la aplicación del medicamento veterinario. Después de inmersiones semanales en agua durante un minuto, el periodo de persistencia insecticida frente a pulgas fue de 7 semanas.

El medicamento veterinario no evita que las garrapatas se fijen al animal. Si éste ha recibido el tratamiento antes de la exposición, las garrapatas morirán en las primeras 24-48 horas después de fijarse. Habitualmente, esto se producirá antes de la ingurgitación, lo que minimiza, aunque no excluye, el riesgo de transmisión de enfermedades. Una vez muertas, normalmente las garrapatas se caen del animal, pero si queda alguna pueden eliminarse tirando de ellas ligeramente.

Las pulgas de las mascotas suelen infestar la cesta, la cama y las áreas de descanso habituales de los animales, como, por ejemplo, las alfombras y el mobiliario blando , que deben ser tratados, en caso de infestación masiva y al iniciar las medidas de control, con un insecticida adecuado y deben aspirarse con regularidad.

Cuando se usa como parte de una estrategia para el tratamiento de la Dermatitis Alérgica por Pulgas, se recomiendan aplicaciones mensuales al paciente alérgico y a los otros perros de la casa.

Para un control óptimo de los problemas con las pulgas en una casa con más de una mascota , debe tratarse a todos los perros y gatos de la casa con un insecticida adecuado.

Debe determinarse el peso exacto de los animales antes del tratamiento.

Evitar el contacto con los ojos del animal. En caso de contacto accidental con los ojos, aclarar inmediata y abundantemente los ojos con agua.

Es importante asegurarse de que el medicamento veterinario se aplica en un área en la que el animal no pueda lamerse y de que los animales no se laman unos a otros después del tratamiento.

No aplicar el medicamento veterinario sobre heridas ni sobre la piel dañada.



Los estudios de laboratorio con fipronilo no han puesto de manifiesto ningún efecto teratogénico ni embriotóxico. No se han llevado a cabo estudios con este medicamento veterinario en perras gestantes y lactantes. El uso durante la gestación y la lactancia sólo debe efectuarse previa consulta con un veterinario profesional y con una valoración del beneficio/riesgo.

No se han observado reacciones adversas en los estudios de seguridad realizados en cachorros mayores de 8 semanas de edad y con un peso de aproximadamente 2 kg tratados una vez al mes con cinco veces la dosis recomendada. Sin embargo, el riesgo de experimentar efectos adversos puede aumentar con la sobredosis (véase la sección 6), por lo tanto los animales deben ser tratados siempre con el tamaño correcto de pipeta correspondiente a su peso corporal.

El fipronilo puede afectar adversamente a los organismos acuáticos. No se debe permitir que los perros naden en cursos de agua durante los 2 días después de la aplicación.

#### **Advertencias para el usuario**

Este medicamento veterinario puede causar irritación ocular y de las membranas mucosas. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del medicamento veterinario con la boca o los ojos.

En caso de contacto accidental con los ojos, aclarar inmediata y abundantemente los ojos con agua. Si la irritación ocular persiste, consulte con el médico y muéstrole el prospecto.

No fumar, beber o comer durante la aplicación.

Evitar el contacto del medicamento veterinario con los dedos. Si esto ocurre, lavarse inmediatamente con agua y jabón.

Lavarse las manos después de usar el medicamento veterinario.

Las personas con hipersensibilidad conocida al fipronilo o a sulfóxido de dimetilo o a otros excipientes deben evitar el contacto con el medicamento veterinario.

Los animales tratados no se deben tocar hasta que el punto de aplicación esté seco y no se debe permitir a los niños jugar con los animales tratados hasta que el punto de aplicación esté seco.

Por lo tanto, se recomienda no tratar a los animales durante el día, sino que se traten al atardecer; y que estos animales recientemente tratados no duerman con los propietarios, especialmente con los niños.

Mantener las pipetas en el envase original y desechar las pipetas usadas inmediatamente.

### **13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

El fipronilo puede afectar adversamente a los organismos acuáticos. No contaminar estanques, arroyos o acequias con el medicamento veterinario o con el envase vacío.

### **14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ**

24 de febrero de 2017



## 15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Pipeta de polipropileno blanco cerrada mediante un tapón de polietileno o polioximetileno. Cada pipeta está envasada en una bolsa triple de tereftalato de polietileno/aluminio/polietileno de baja densidad.

Caja que contiene 1, 3, 6, 10, 20 o 30 pipetas.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Pueden solicitar más información sobre este medicamento veterinario dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización.

Uso veterinario. Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.