

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ECTO STOP 650 mg/ml δερματικό διάλυμα
είδη ζώων: σκύλος

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗΣ ΑΕ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΜΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑΣ 4Β
15122 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. : 210 6910311
Φαξ: 210 6981975

Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
BIOVETA S.A.
Komenskeho 212,
Ivanovice na Hane,
Czech Republic

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ECTO STOP
650 mg/ml δερματικό διάλυμα
είδη ζώων: σκύλος
δραστική ουσία: Permethrin

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1ml Διαλύματος περιέχει:
Δραστικό συστατικό: Permethrin 650 mg
Έκδοχα:
Butylparaben, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluen, Diethylenglycol monoethyl ether, Propylenglycol lauryl.

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για τον έλεγχο και τη θεραπεία εκτοπαρασιτώσεων από κρότωνες, φθείρες, ψύλλους και προστασία από νύσسونτα έντομα (κουνούπια, σκνίπες, μύγες) στο σκύλο.
Το ECTO STOP προστατεύει το σκύλο από την προσβολή από κουνούπια (*Aedes aegypti*) για χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων, από την προσβολή από σκνίπες (*Phlebotomus perniciosus*) για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων και από την προσβολή από μύγες (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*) για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων από την εφαρμογή του.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε νεαρούς σκύλους ηλικίας μικρότερης των 2 εβδομάδων.
ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΓΑΤΕΣ.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε ένα μικρό αριθμό ζώων παρατηρείται μετά τη εφαρμογή ένας παροδικός ερεθισμός στην περιοχή εφαρμογής. Συνιστάται λουτρό του σκύλου με ένα καθαριστικό σαμπουάν και συμβουλευτείτε κτηνίατρο.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο φύλλο οδηγιών χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

Εναλλακτικά κάντε χρήση του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Τηλ: +30 2132040213

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σε σκύλους βάρους κάτω των 15 kg.

Τοπικά, ανάμεσα στις ωμοπλάτες, μετά το διαχωρισμό του τριχώματος, 1ml ECTO STOP (το περιεχόμενο μιας φύσιγγας) κατευθείαν επάνω στο δέρμα. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση του διαλύματος στο τρίχωμα. Να αποφεύγεται η επαφή του διαλύματος με τα χέρια.

Σε σκύλους βάρους 15-30 kg.

Τοπικά, μετά το διαχωρισμό του τριχώματος, 1 ml ECTO STOP (το περιεχόμενο μιας φύσιγγας) κατευθείαν επάνω στο δέρμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες και 1 ml ECTO STOP στη βάση της ουράς. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση του διαλύματος επάνω στο τρίχωμα. Να αποφεύγεται η επαφή του διαλύματος με τα χέρια.

Σε σκύλους βάρους άνω των 30 kg.

Τοπικά, ανάμεσα στις ωμοπλάτες, μετά το διαχωρισμό του τριχώματος, 1 ml ECTO STOP (το περιεχόμενο μιας φύσιγγας) κατευθείαν επάνω στο δέρμα, 1 ml στη μέση της πλάτης και 1 ml ECTO STOP στη βάση της ουράς. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση του διαλύματος στο τρίχωμα. Να αποφεύγεται η επαφή του διαλύματος με τα χέρια..

Οι ψύλλοι των κατοικίδιων ζώων καταφεύγουν επίσης στους χώρους διαμονής τους, όπως π.χ. κάνιστρα, οικήματα, χαλιά, καλύμματα επίπλων κ.τ.λ. Για τους χώρους αυτούς συνιστάται διενέργεια εντομοκτονίας με κατάλληλο εντομοκτόνο και συχνός καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για εξωτερική χρήση μόνο.

Το προϊόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τις γάτες και θα μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο εξ' αιτίας της ιδιαίτερης φυσιολογίας και δη της αδυναμίας τους να μεταβολίζουν ορισμένες ουσίες, όπως η περμεθρίνη.

Για να προστατέψετε τις γάτες από τυχαία έκθεση στο προϊόν, απομακρύνετε τους σκύλους από τις γάτες μετά την εφαρμογή της θεραπείας, μέχρι να στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής του προϊόντος. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι γάτες δεν θα γλείφουν το σκύλο στον οποίο έχει χορηγηθεί το προϊόν. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει αμέσως να συμβουλευτείτε κτηνίατρο.

Να αποφεύγεται η επαφή των παιδιών με ζώα στα οποία έχει εφαρμοστεί το προϊόν για 24 ώρες.

Το ιδιοσκεύασμα είναι τοξικό για ψάρια, ερπετά και μέλισσες.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25⁰ C.

Φυλάσσετε προστατευμένο από το φως.

Μην καταψύχετε.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε νεαρούς σκύλους ηλικίας μικρότερης των 2 εβδομάδων.

Να αποφεύγεται η εφαρμογή του διαλύματος επάνω στο τρίχωμα.

Μετά τη χορήγηση δεν πρέπει να διενεργείται τοπική μάλαξη του δέρματος.

Να μην γίνεται λουτρό καθαριότητας και να αποφεύγεται να έρχονται σε επαφή με το νερό οι σκύλοι για 12 ώρες μετά την εφαρμογή. Επίσης, θα πρέπει να περιορίζεται η άμεση έκθεσή τους στον ήλιο.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με το διάλυμα. Να αποφεύγεται, επίσης, η επαφή του διαλύματος με το δέρμα και τα μάτια. Να πλένονται τα χέρια μετά τη χρήση. Να ξεπλένονται αμέσως οποιοσδήποτε κηλίδες από το διάλυμα.

Δεν πρέπει να πίνετε, να τρώγετε ή να καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του φαρμάκου.

Θα πρέπει τα άτομα με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας στην ουσία να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

Άτομα τα οποία κάνουν πολλές διαδοχικές χορηγήσεις, π.χ. σε ενδονοσήμινα σκύλων ή σε εκτροφεία, συνιστάται να φορούν προστατευτικά γάντια από νεοπρένιο ή νιτρίλιο, πάχους 0,3 mm.

Να μην έρχεστε σε επαφή με τα σημεία εφαρμογής του προϊόντος στο σκύλο για 3 έως 6 ώρες .

Η εφαρμογή να γίνεται κατά προτίμηση τις απογευματινές ώρες.

Ζώα στα οποία έχει χορηγηθεί το προϊόν να μη κοιμούνται με ανθρώπους και κυρίως με μικρά παιδιά.

Για κτηνιατρική χρήση μόνο.

Να μην αφαιρείτε χωρίς λόγο το πλαστικό φιαλίδιο από το χάρτινο κουτί.

Να μη χρησιμοποιείται αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί ή/και στα φιαλίδια.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Εξαιρετικά επιβλαβές για τα ψάρια. Να μη ρυπαίνονται υδατοσυλλογές και τρεχούμενα νερά με το προϊόν ή με την συσκευασία του.

Τα άχρηστα υλικά απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για σκύλους: Χάρτινα κουτιά με πλαστικές φύσιγγες των 1x1ml, 2x1ml, 3x1ml, 25x1ml, 50x1ml, 100x1ml.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.