

## RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 1. Nome del prodotto

ZYZEK PLUS (permetrina - estratto di piretro - piperonilbutossido).  
Antiparassitario in Emulsione Microincapsulata per Uso Esterno.

### 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

100 ml di prodotto contengono:

Principi attivi:	Permetrina (cis/trans 25:75)	0,40 g
	Estratto di Piretro (25% piretrine)	0,40 g
	Piperonilbutossido	0,60 g
Eccipienti:	Membrana Poliammidica	
	Alchilfenolo etossilato	
	Acqua Depurata.	

### 3. FORMA FARMACEUTICA

Emulsione microincapsulata per uso esterno.

### 4. INFORMAZIONI CLINICHE

#### 4.1 Specie di destinazione

Cani e gatti.

#### 4.2 Indicazioni per l'impiego

ZYZEK Plus è indicato per il trattamento di ectoparassiti sensibili ai piretroidi ed in particolare nel trattamento e nella prevenzione di infestazioni da pulci e zecche di cani e gatti.

#### 4.3 Controindicazioni

Non utilizzare su animali malati, convalescenti e con estese lesioni della pelle.

#### 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nei gatti l'uso eccessivo di prodotto può determinare ipersalivazione.

#### 4.5 Speciali precauzioni per l'impiego

##### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Evitare il contatto con gli occhi dell'animale.

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

##### 4.5.1 Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

- Utilizzare guanti di protezione;
- Non mangiare, non bere, né fumare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare con il prodotto cibi, bevande o recipienti destinati a contenerli;
- Non respirare gli aerosoli;
- Se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente, è bene aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente;
- Dopo l'applicazione, in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua;
- In caso di ingestione accidentale o malessere consultare immediatamente il medico e se possibile mostrargli l'etichetta.

#### **4.6 Reazioni avverse: frequenza e gravità**

Non sono noti dati di reazioni avverse.

Segnalare al medico veterinario eventuali reazioni avverse e/o reazioni non menzionate in etichetta.

#### **4.7 Impiego durante la gravidanza e l'allattamento**

Non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e l'allattamento.

Consultare il medico veterinario prima dell'impiego.

#### **4.8 Interazione con altri medicinali ed altre forme d'interazione**

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari esterni.

#### **4.9 Posologia e via di somministrazione**

Via di somministrazione esterna mediante nebulizzatore.

Agitare prima dell'uso e nebulizzare il prodotto sull'intera superficie dell'animale.

Utilizzando un paio di guanti di protezione, applicare contropelo (in funzione della sua lunghezza), da 4 a 8 ml di prodotto pari a 16 – 32 mg di permetrina, 16 – 32 mg di estratto di piretro e 24 – 48 mg piperonilbutossido per kg di peso dell'animale (corrispondenti a 7 – 14 pressioni della pompetta/kg), avendo cura di bagnare uniformemente l'intero mantello. Dopo l'applicazione frizionare, onde far penetrare il prodotto alla base del pelo. Lasciare asciugare naturalmente. Far trascorrere almeno 7 giorni, prima di un successivo utilizzo. L'efficacia del prodotto in relazione alla carica parassitaria varia da 1 a 3 settimane.

#### **4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)**

Vedi 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione.

Non superare le dosi consigliate.

Nei gatti l'uso eccessivo di prodotto può determinare ipersalivazione.

#### **4.11 Tempo di attesa**

Non pertinente.

### **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

Codice ATCvet: QP53AC54.

#### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Zytek Plus è un formulato microincapsulato, pronto all'uso, contenente due sostanze ad attività antiparassitaria: la permetrina dotata di azione residuale e l'estratto di piretro dotato anche di proprietà repellenti. L'azione sinergizzata del piperonilbutossido, conferisce al prodotto una elevata efficacia. La microincapsulazione inoltre consente un lento rilascio dei principi attivi, e li preserva da una rapida inattivazione. Le proprietà che conseguono sono una ridotta tossicità del prodotto, e una prolungata attività biologica.

#### **5.2 Proprietà farmacocinetiche**

Non applicabile.

### **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

#### **6.1 Elenco eccipienti**

Membrana poliammidica

Alchilfenolo etossilato

Acqua Depurata

#### **6.2 Incompatibilità**

Non sono noti dati di incompatibilità.

### **6.3 Periodo di validità**

36 mesi per il medicinale veterinario confezionato per la vendita.

### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

Conservare in luogo asciutto, a temperatura inferiore a 25 °C, al riparo dalla luce diretta del sole.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande.

### **6.5 Natura e composizione del confezionamento primario**

ZYZEK Plus viene confezionato in flaconi di PE da 100 ml.

### **6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo**

- Non contaminare con il prodotto corsi d'acqua;

- non riutilizzare il contenitore, né disperderlo nell'ambiente dopo l'uso;

- le confezioni vuote possono essere smaltite con i rifiuti domestici;

- il prodotto non utilizzato, deve essere conferito negli abituali punti di raccolta per farmaci scaduti o inutilizzati.

## **7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

ICF Srl Industria Chimica Fine

Via G.B. Benzoni, 50 - 26020 Palazzo Pignano – Cremona

Produttore e responsabile rilascio lotti:

CICIEFFE SRL

Via Marconi, 13 – 24040 Fornovo S. Giovanni – Bergamo.

## **8. NUMERO AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone PE da 100 ml A.I.C. n° 103296012

Flacone PE da 200 ml A.I.C. n° 103296024

Flacone PE da 250 ml A.I.C. n° 103296036

Flacone PE da 375 ml A.I.C. n° 103296048

Flacone PE da 400 ml A.I.C. n° 103296051

Flacone PE da 500 ml A.I.C. n° 103296063

Flacone PE da 1 L A.I.C. n° 103296075

Flacone PE da 5 L A.I.C. n° 103296087

## **9. DATA AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Giugno 2001

## **10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Gennaio 2006

## **11. MODALITÀ DI DISPENSAZIONE**

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è soggetta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

-----  
**TESTO:**

**ZYZEK PLUS 500 ml**

## **Antiparassitario in emulsione microincapsulata per uso esterno per il trattamento di ectoparassiti (zecche e pulci) di cani e gatti. Agitare prima dell'uso**

### **Composizione:**

100 ml di prodotto contengono:

- permetrina (cis-trans 25:75) micro incapsulata 0,40 g
- estratto di piretro (25% di piretrine) microincapsulato 0,40 g
- piperonilbutossido microincapsulato 0,60 g
- eccipienti: membrana poliammidica, alchilfenolo etossilato, acqua depurata q.b. a 100 ml

### **Proprietà farmacologiche:**

Zytek Plus è un formulato microincapsulato, pronto all'uso, contenente due sostanze ad attività antiparassitaria: la permetrina dotata di azione residuale e l'estratto di piretro dotato anche di proprietà repellenti. L'associazione, sinergizzata dal piperonilbutossido, conferisce al prodotto una elevata efficacia. La microincapsulazione inoltre consente un lento riascio dei principi attivi, e li preserva da una rapida inattivazione. Le proprietà che conseguono sono una ridotta tossicità del prodotto, e una prolungata attività biologica.

### **Indicazioni:**

Zytek Plus è indicato per il trattamento di ectoparassiti sensibili ai piretroidi ed in particolare nel trattamento e nella prevenzione di infestazioni da pulci e zecche di cani e gatti.

### **Controindicazioni:**

Non utilizzare su animali malati, convalescenti e con estese lesioni delle pelle. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari esterni. Nei gatti l'uso eccessivo di prodotto può provocare ipersalivazione.

### **Modalità e vie di somministrazione, posologia:**

- via di somministrazione: esterna mediante nebulizzazione.
- modalità di somministrazione: agitare prima dell'uso e spruzzare sull'intera superficie dell'animale, evitando il contatto con occhi e bocca.
- posologia: utilizzando un paio di guanti di protezione applicare contro pelo (in funzione della sua lunghezza), da 4 a 8 ml di prodotto pari a 16-32 mg di permetrina, 16-32 mg di estratto di piretro e 24-48 mg di piperonilbutossido per Kg di peso dell'animale (corrispondenti a 7-14 pressioni della pompetta/Kg), avendo cura di bagnare uniformemente l'intero mantello. Dopo l'applicazione frizionare onde far penetrare il prodotto alla base del pelo. Lasciare asciugare naturalmente. Far trascorrere almeno 7 giorni, prima di un successivo utilizzo. L'efficacia del prodotto in relazione alla carica parassitaria varia da 1 a 3 settimane.

### **Speciali precauzioni per la conservazione:**

Conservare in luogo asciutto, al riparo della luce diretta del sole a temperatura inferiore a 25°C. Conservare lontano da alimenti, mangimi, bevande.

### **Avvertenze:**

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare con il prodotto cibi, bevande o recipienti destinati a contenerli.
- Non contaminare con il prodotto corsi d'acqua.
- Non riutilizzare il contenitore né disperderlo nell'ambiente dopo l'uso.
- Non respirare gli aerosoli.
- Se il prodotto viene usato in luoghi dove si soggiorna lungamente è bene areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
- Da non vendersi sfuso.
- Consultare un medico veterinario prima di applicare su animali in gestazione o in lattazione.
- In caso di ingestione accidentale o malessere consultare immediatamente un medico. Se possibile mostrargli l'etichetta.
- Utilizzare guanti di protezione.
- Dopo l'applicazione, in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

- Le confezioni vuote possono essere smaltite con i rifiuti domestici, il prodotto non utilizzato può essere conferito negli abituali punti di raccolta di farmaci scaduti o inutilizzati.

**Reazioni avverse: frequenza e gravità:**

Non sono note reazioni avverse durante l'uso del medicinale veterinario. Segnalare al medico veterinario eventuali reazioni avverse e/o reazioni non menzionate in etichetta.

**PER USO VETERINARIO**

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è soggetta all'obbligo di ricetta medica veterinaria.

Medicinale Veterinario A.I.C. N° 103296063 del Ministero della Salute

Titolare A.I.C. - I.C.F. s.r.l.  
Industria Chimica Fine  
Palazzo Pignano - CR -

Officina di produzione  
CICIEFFE Srl  
Via Marconi, 13  
24040 Fornovo S. Giovanni (BG)