

ANNEXE III
ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTION DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîtes de :

flacon de 50 ml

flacon de 100 ml

flacon de 250 ml

10 flacons de 100 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Pronestestic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient:

Chlorhydrate de procaïne 40 mg (équivalent à 34,65 mg de procaïne)

Tartrate d'épinéphrine 0,036 mg (équivalent à 0,02 mg d'épinéphrine).

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

50 ml

100 ml

250 ml

10 x 100 ml

4. ESPÈCES CIBLES



5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie sous-cutanée et périneurale

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats: zéro jour.

Lait: zéro heure.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours

Après ouverture, utiliser avant le ...

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

A usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

FATRO S.p.A.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V497475

18. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Étiquette 100 ml
Étiquette 250 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Pronestestic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml solution injectable


2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient:

Chlorhydrate de procaine 40 mg (équivalent à 34,65 mg de procaine)

Tartrate d'épinéphrine 0,036 mg (équivalent à 0,02 mg épinéphrine).

3. ESPÈCES CIBLES



4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie sous-cutanée et périmébrale.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats: zéro jour.

Lait: zéro heure.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours

Après ouverture, utiliser avant le _____

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Etiquetage Version FR
Pronestesic

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
--


FATRO S.p.A.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE Étiquette 50 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE



2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient : Chlorhydrate de procaine 40 mg (équivalent à 34,65 mg de procaine)
Tartrate d'épinéphrine 0,036 mg (équivalent à 0,02 mg épinéphrine).

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PEREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.
Après ouverture, utiliser avant le...