

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

1x50 ml, 1x100 ml, 1x200ml/200, 1x200/250, 1x250 ml, 5x50 ml, 5x100 ml, 5x200 ml/200, 5x200/250, 5x250 ml Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Hyogen
Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF

Eine 2 ml Dosis enthält: *Mycoplasma hyopneumoniae*, Stamm 2940, inaktiviert: min. 328 ELISA-Einheiten

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml (25 Dosen)
100 ml (50 Dosen)
200 ml (100 Dosen) in einer Flasche mit einem Nennvolumen von 200 ml
200 ml (100 Dosen) in einer Flasche mit einem Nennvolumen von 250 ml
250 ml (125 Dosen)
5x50 ml (5x25 Dosen)
5x100 ml (5x50 Dosen)
5x200 ml (5x100 Dosen) in Flaschen mit einem Nennvolumen von 200 ml
5x200 ml (5x100 Dosen) in Flaschen mit einem Nennvolumen von 250 ml
5x250 ml (5x125 Dosen)

4. ZIELTIERART

Schweine (zur Mast)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2°C – 8°C).
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: Zul.-Nr. PEI.V.11714.01.1
AT: Z.Nr.: 836202

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100, 200 oder 250 ml Flasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Hyogen
Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF

Eine 2 ml Dosis enthält:
Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm 2940, inaktiviert: min. 328 ELISA-Einheiten

3. ZIELTIERART

Schweine (zur Mast)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2°C – 8°C).
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
--

50 ml Flasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Hyogen

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN
--

Eine 2 ml Dosis enthält:

Mycoplasma hyopneumoniae, Stamm 2940, inaktiviert: min. 328 ELISA-Einheiten

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

