

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
{ŠKATLA}**

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Sprednja stran: ProtecTix 250 mg/1250 mg kožni nanos, raztopina za pse

Zadnja stran: ProtecTix 500 mg/1250 mg kožni nanos, raztopina za pse nad 10 kg do 25 kg

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 2,5-ml merilna kapalka vsebuje:

250 mg imidakloprida

1250 mg permetrina

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 2,5 ml

2 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

4 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

12 x 2,5 ml

24 x 2,5 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



10 - 25 kg

5. INDIKACIJE

[Za škatle: to besedilo velja (samo) za sprednjo stran škatle.]

- Uničuje klope, bolhe in uši
- Odganja klope, komarje, peščene muhe in hlevske muhe
- Zmanjšuje tveganje prenosa pasje leišmanioze in erlihioze

Piktogrami šestih zajedavcev, tj. klopov, bolh, uši, komarjev, peščenih muh in hlevskih muh

[Za škatle: to besedilo velja (samo) za hrbtno stran škatle]

– Zdravljenje in preprečevanje bolh za 4 tedne; lahko se uporablja kot del strategije zdravljenja alergijskega dermatitisa na bolhe (FAD).

– Odpravlja pasje uši.

– Odvrča in uničuje klope za 3 do 4 tedne, odvisno od vrste klopa. Klopi, ki so že na psu, ni nujno, da bodo v dveh dneh po zdravljenju uničeni in lahko ostanejo pritrjeni in vidni. Zato je priporočljivo odstraniti klope, ki so ob zdravljenju že na psu, da bi preprečili njihovo pritrditev in sesanje krvi.

– Odganja peščene muhe, komarje in hlevske muhe za 2 do 4 tedne.

– Zmanjšuje tveganje prenosa pasje leišmaniozne (do 3 tedne) in pasje erlihiozne (do 4 tedne).

6. POTI UPORABE

Uporaba z nanosom na kožo. Samo za zunanjo uporabo

Za zdravljenje enega psa uporabite eno merilno kapalko.



Zdravilo ostane učinkovito, če se pes zmoči. Zagotavlja larvicidni učinek proti bolham v neposredni okolici zdravljenih psov. Ne uporabite pri mladičih, mlajših od 7 tednov ali lažjih od 10 kg. V primeru brejosti ali laktacije uporabite le v skladu z nasvetom odgovornega veterinarja.

7. KARENCA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lill}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.
Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo in vlago.

10. BESEDILO »PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO«

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.



12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

beaphar[®]

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0801/003

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

{Vrečica}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ProtecTix



2. KOLIČINA UČINKOVIN

250 mg Imidacloprid(e)

1250 mg Permethrin(e)

2,5 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lilll}

Ko je merilna kapalka odprta, jo takoj uporabite.

beaphar[®]

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

{Merilna kapalka}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ProtecTix



2. KOLIČINA UČINKOVIN

250 mg Imidacloprid(e)

1250 mg Permethrin(e)

2,5 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lilll}

beaphar[®]