

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Bovix Microclox EDC 600 mg zawiesina dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tubostrzykawka dowymieniowa 3,6 g zawiera 600 mg kloksacyliny (w postaci kloksacyliny benzatynowej)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

12 x 3,6 g
24 x 3,6 g
60 x 3,6 g
120 x 3,6 g

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie zasuszenia)

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie dowymieniowe

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne: 0 dni.

Mleko:

- jeśli wycielenie nastąpi 42 lub więcej dni po leczeniu: 48 godzin po wycieleniu.

- jeśli wycielenie nastąpi w czasie krótszym niż 42 dni po leczeniu: 44 dni po ostatnim zastosowaniu leczenia.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Kernfarm B.V.

14. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia:

15. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Etykieta na tubostrzykawkę

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Bovix Microclox EDC

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tubostrzykawka dowymieniowa 3,6 g zawiera 600 mg kloksacyliny (w postaci kloksacyliny benzatynowej)

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.