

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
{katonska škatla z robčki}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

INTRAMAR Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg intramamarna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak intramamarni injektor (3 g) vsebuje:

amoksisicilin (kot amoksisicilin trihidrat)	200,0 mg	
klavulanska kislina (kot kalijev klavulanat)	50,0 mg	
prednizolon		10,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

24 intramamarnih injektorjev

Vsako pakiranje vsebuje 24 dezinfekcijskih robčkov, navlaženih s 65% raztopino (v/v) izopropilalkohola za čiščenje seskov.

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v laktaciji).



5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Intramamarno dajanje.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 7 dni.

Mleko: 84 ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrpto zdravilo uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.
Shranjujte na suhem mestu.

10. BESEDILO »PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO«

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.

12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Bioveta, a.s.

**14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

DC/V/0814/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Škatla brez robčkov}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

INTRAMAR Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg intramamarna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak intramamarni injektor (3 g) vsebuje:

amoksisilin (kot amoksisilin trihidrat)	200,0 mg	
klavulanska kislina (kot kalijev klavulanat)	50,0 mg	
prednizolon		10,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

24 intramamarnih injektorjev

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v laktaciji).

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Intramamarno dajanje.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 7 dni.

Mleko: 84 ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odpro zdravilo uporabite takoj.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Shranjujte na suhem mestu.

10. BESEDILO »PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO«

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.

12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Bioveta, a.s.



14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0814/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

{Intramamarni injektor}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

INTRAMAR Lacto

2. PODATKI O KOLIČINSKI SESTAVI UČINKOVIN

amoksisicilin 200,0 mg/injektor
klavulanska kislina 50,0 mg/injektor
prednizolon 10,0 mg/injektor

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Odprto zdravilo uporabite takoj.

