

PAKKAUSSSELOSTE

Beviplex vet. injektioneste, liuos

1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:

Pharmaxim AB

Örjaleden 48

261 51 Landskrona

Ruotsi

Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja:

Bela-Pharm GmbH & Co KG

Lohner Straße 19

D-49377 Vechta

Saksa

2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Beviplex vet. injektioneste, liuos

3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml sisältää:

Vaikuttavat aineet:

Tiamiiinhydrokloridi (B ₁ -vitamiini)	4 mg
Riboflaviininatriumfosfaatti (B ₂ -vitamiini)	3 mg
Pyridoksiinihydrokloridi (B ₆ -vitamiini)	2 mg
Nikotiiniamidi	25 mg
Dekspantenoli	5 mg
Syanokobalamiini (B ₁₂ -vitamiini)	5 µg

Apuaineet:

Kloorivetyhappo, laimea

Metyyliparahydroksibentsoaatti (E218)

Propyyliparahydroksibentsoaatti (E216)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

4. KÄYTTÖAIHEET

Sika, nauta, hevonen, lammas, koira ja minkki

Tilat, jotka lisäävät B-vitamiinien tarvetta, kuten pötsin ja suoliston häiriintynyt toiminta (esim. tulehdus, imetyymishäiriö), heikentynyt ruokahalu (esim. asetonitauti, poikimahalvaus), pitkittynyt sairaus (esim. infektiotaudit), sekä ihmisoireiden ja kouristuksien tukihoito.

Vasikka ja lammas

Tiamiiinin puutteesta johtuva aivokuoren nekroosi (serebrokortikaalinen nekroosi).

5. VASTA-AIHEET

Ei tunneta.

6. HAITTAVAIKUTUKSET

Ei tiedossa.

Jos havaitset vakavia vaikutuksia tai joitakin muita sellaisia vaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi.

7. KOHDE-ELÄINLAJIT

Sika, nauta, hevonen, lammas, koira ja minkki.

8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

Injectio lihakseen, laskimoon tai nahaan alle. Alla mainitut vuorokausiannokset ovat ohjeellisia, ja antokertoja ja -tiheyttä voidaan säädellä tapauksesta riippuen.

Annostusesimerkit:

Hevonen ja nauta	20-40 ml
Varsa, vasikka, sika ja lammas	10-20 ml
Pikkuporsas	2-5 ml
Koira	1-5 ml
Minkki	0,5-1 ml

Serebrokortikaalisen nekroosin hoitoon:
vasikka ja lammas 100 ml, josta puolet annetaan laskimoon ja puolet lihakseen tai nahaan alle.
Käsitteily toistetaan päivittäin, kunnes oireet häviävät.

9. ANNOSTUSOHJEET

Koska yhteensovittamattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden eläinlääkevalmisteiden kanssa.

10. VAROAIKA

Maito: nolla vrk.

Teurastus: nolla vrk.

11. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Säilytä jäääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Herkkä valolle.

Ei saa käyttää pulloon merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 4 viikkoa.

12. ERITYISVAROITUKSET

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Ei erityisiä varotoimia.

Valmiste voi aiheuttaa kirveltyä lihakseen tai nahaan alle annettuna, minkä vuoksi eläin saattaa reagoida

äkkinäisesti injektion aikana.

Eriyiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmisteesta antavan henkilön on noudatettava
Kädet on pestävä lääkkeen antamisen jälkeen.

Tiineys ja laktaatio:

Voidaan käyttää tiineyden ja laktaation aikana.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet)

Oireita ei ole todettu.

**13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI
JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI**

Käyttämättä jäänyt valmiste toimitetaan hävitettäväksi apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle.

14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY

07.07.2023

15. MUUT TIEDOT

Kaikkia pakkaukokoja ei vältämättä ole markkinoilla.

BIPACKSEDEL FÖR

Beviplex vet. injektionsvätska, lösning

- NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLika**

Innehavare av godkännande för försäljning:

Pharmaxim AB
Örjaleden 48
261 51 Landskrona
Sverige

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Bela-Pharm GmbH & Co KG
Lohner Straße 19
D-49377 Vechta
Tyskland

- DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Beviplex vet. injektionsvätska, lösning

3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml innehåller:

Aktiva substanser:

Tiaminhydroklorid (Vitamin B ₁)	4 mg
Riboflavinatriumfosfat (Vitamin B ₂)	3 mg
Pyridoxinhydroklorid (Vitamin B ₆)	2 mg
Nikotinamid	25 mg
Dexpantenol	5 mg
Cyanokobalamin (Vitamin B ₁₂)	5 µg

Hjälpämnen:

Saltsyra, utspädd
Metylparahydroxibensoat (E218)
Propylparahydroxibensoat (E216)
Vatten för injektionsvätskor

4. ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Svin, nöt, häst, får, hund och mink

Tillstånd som ökar behovet av B-vitaminer såsom störningar i vommen och tarmsystemets funktioner (t.ex. vid infektioner, hämmat näringssupptag), minskad appetit (t.ex. vid förekomst av aceton i blodet, kalvningsförlamning), långvarig sjukdom (t.ex. infektionssjukdomar) samt som kompletterande behandling vid hudsjukdomar och krämper.

Kalv och får

Nekros i hjärnbarken (CCN, cerebrokortikal nekros) till följd av tiaminbrist.

5. KONTRAINDIKATIONER

Inga kända.

6. BIVERKNINGAR

Inga kända.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Svin, får, nötkreatur, häst, hund och mink.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär, intravenös eller subkutan injektion. Angivna dygnsdoser får betraktas som en vägledning och kan upprepas allt efter fallets art.

Doseringsexempel:

Häst och nötkreatur	20-40 ml
Föl, kalv, gris och får	10-20 ml
Växande svin	2-5 ml
Hund	1-5 ml
Mink	0,5-1 ml

Vid cerebrokortikal nekros (CCN): Kalv och får 100 ml, varav hälften ges intravenöst och hälften subkutant eller intramuskulärt. Behandlingen upprepas dagligen tills symptomen försvinner.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

10. KARENSTID

Mjölk: noll dagar.

Slakt: noll dagar.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylnskåp (2 °C-8 °C).

Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 4 veckor.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Inga särskilda åtgärder.

Djuret kan reagera tvärt vid intramuskulär eller subkutan injektion eftersom injektionen kan orsaka sveda.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter administrering.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Inga symptom har konstaterats.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUCTION AVEJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

07.07.2023

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.