

ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Suvaxyn Circo+MH RTU инжекционна емулсия за свине

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка 2 ml доза съдържа:

Активни вещества:

Инактивиран рекомбинантен химерен свински цирковирус тип 1,
съдържащ свински цирковирус тип 2 ORF2 протеин 2,3 – 12,4 RP*

Инактивирана *Mycoplasma hyopneumoniae*, щам Р-5722-3 1,5 – 3,8 RP*

*Единици за относителна активност, ELISA количествено определяне на антигена (*in vitro* тест за активност), сравнен с референтна ваксина.

Адjuванти:

MetaStim съдържа:

Squalane 0,4% (v/v)
Poloxamer 401 0,2% (v/v)
Polysorbate 80 0,032% (v/v)

Помощни вещества:

Качествен състав на помощните вещества и другите съставки	Количествен състав, ако тази информация е важна с оглед на правилното прилагане на ветеринарния лекарствен продукт
Thiomersal	0,2 mg
Monobasic potassium phosphate anhydrous	
Sodium chloride	
Potassium chloride	
Disodium phosphate anhydrous	
Sodium phosphate dibasic heptahydrate	
Disodium tetraborate decahydrate	
EDTA tetrasodium	
Water for injections	

Бяла хомогенна емулсия.

По време на съхранение може да се появи малко количество черна утайка и емулсията може да се раздели на две отделни части. При разклащане, черната утайка изчезва и емулсията отново става хомогенна.

3. КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Свине (за угояване).

3.2 Показания за употреба за всеки вид животни, за който е предназначен продуктът

За активна имунизация на свине на възраст от 3 седмици срещу свински цирковирс тип 2 (PCV2) за намаляване количеството на вируса в кръвта и лимфоидните тъкани и отделянето с фекалиите, причинени от инфекция с PCV2.

За активна имунизация на свине на възраст от 3 седмици срещу *Mycoplasma hyopneumoniae*, за намаляване на белодробните лезии, свързани с инфекцията с *M. hyopneumoniae*.

Начало на имунитета: 3 седмици.

Продължителност на имунитета: 23 седмици.

3.3 Противопоказания

Няма.

3.4 Специални предупреждения

Да се ваксинират само здрави животни.

3.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарния лекарствен продукт на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Не е приложимо.

3.6 Неблагоприятни реакции

Прасета (за уговяване):

Много чести (повече от 1 на 10 третиращи животни):	Повишена температура ¹ Възпаление в мястото на приложение ² , Болка в мястото на приложение ³ , зачервяване в мястото на приложение ³ , оток в мястото на приложение ³
Нечести (1 до 10 на 1 000 третиращи животни):	Реакции на свръхчувствителност (напр. депресия, диария или повръщане) ⁴
Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третиращи животни, включително изолирани съобщения):	Анафилаксия ⁵

¹ Преходна; наблюдавана през първите 24 часа след ваксинацията. Средно с 1°C, но може да надвишава 2°C при отделните свине. Това повишаване отшумява спонтанно в рамките на 48 часа без лечение.

² При постмортално изследване на тъканите в мястото на приложение, направено 4 седмици след прилагане на повторна единична доза от ваксината, много често се открива лек лимфоцитно-грануломатозен възпалителен отговор.

³ Локалните тъканни реакции обикновено са в зона с диаметър под 2 cm и могат да се задържат до 2 дни.

⁴ Обикновено изчезват без лечение.

⁵ В случай на такива реакции се препоръчва подходящо лечение

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на ветеринарния лекарствен продукт. Съобщенията трябва да се изпращат, за предпочитане чрез ветеринарен лекар, или на притежателя на разрешението за търговия или на местния му представител, или на националния компетентен орган чрез националната система за съобщаване. За съответните данни за връзка вижте листовката.

3.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана по време на бременност и лактация.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Заплодяемост:

Няма налична информация за безопасността от използването на тази ваксина при нерези за разплод. Да не се използва при нерези за разплод.

3.8 Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарни лекарствени продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарен лекарствен продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

3.9 Начин на приложение и дозировка

За интрамускулно приложение.

Приложете една доза от 2 ml на свиня, във врата зад ухото.

Схема за ваксинация:

Едно инжектиране на възраст от 3 седмици.

Разклатете флакона добре преди употреба и периодично по време на процеса на ваксинация.

Препоръчва се употребата на многодозови спринцовки. Използвайте устройствата за ваксиниране съгласно инструкциите на производителя. Ваксината да се прилага асептично. По време на съхранение може да се появи малко количество черна утайка и емулсията може да се раздели на две отделни части. При разклащане, черната утайка изчезва и емулсията отново става хомогенна.

3.10 Симптоми на предозиране (и когато е приложимо — процедури на действие при спешни случаи и антидоти)

4 часа след приложение на двойна доза се наблюдава преходно повишаване на телесната температура (средно с 0,8 °C). Това повишаване спонтанно отшумява в рамките на 24 часа без лечение.

В мястото на приложение често се наблюдава локална тъканна реакция под формата на оток (с диаметър до 2 cm), която отшумява в рамките на 2 дни.

3.11 Специални ограничения за употреба и специални условия за употреба, включително ограничения за употребата на антимикробни и противопаразитни ветеринарни лекарствени продукти, с цел да се ограничи рискът от развитие на резистентност

Не е приложимо.

3.12 Карентни срокове

Нула дни.

4. ИМУНОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Ветеринарен лекарствен анатомо-терапевтичен код (ATCvet Code): QI09AL08

Ваксината съдържа инактивиран рекомбинантен химерен свински цирковирус тип 1, съдържащ свински цирковирус тип 2 ORF2 протеин. Ваксината съдържа още инактивирана *Mycoplasma hyorheumoniae*. Предназначена е да стимулира изграждането на активен имунитет срещу PCV2 и *Mycoplasma hyorheumoniae* при свине

5. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

5.1 Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарен лекарствен продукт.

5.2 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарен лекарствен продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно.

5.3 Специални условия за съхранение

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C).

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

5.4 Вид и състав на първичната опаковка

Полиетиленови флакони с висока плътност от 50 ml, от 100 ml и от 250 ml (25, 50 и 125 дози), с хлоробутилова еластомерна тапа, запечатани с алуминиева капачка.

Картонена кутия с 1 флакон от 50 ml (25 дози), 100 ml (50 дози) или 250 ml (125 дози).

Картонена кутия с 10 флакона от 50 ml (25 дози) или 100 ml (50 дози).

Картонена кутия с 4 флакона от 250 ml (125 дози).

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

5.5 Специални мерки за унищожаване на неизползвани продукти или остатъци от тях

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.

6. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Zoetis Belgium

7. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

EU/2/15/190/001-006.

8. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Дата на първото издаване на разрешението за търговия: 06/11/2015.

9. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

10. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Няма.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА

А. ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Suvaxyn Circo+МН RTU инжекционна емулсия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка 2 ml доза съдържа:

Инактивиран рекомбинантен химерен свински цирковир тип 1,

съдържащ свински цирковир тип 2 ORF2 протеин

2,3 – 12,4 RP

Инактивирана *Mycoplasma hyorheumoniae*, щам Р-5722-3

1,5 – 3,8 RP

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x 50 ml (25 дози)

1 x 100 ml (50 дози)

1 x 250 ml (125 дози)

10 x 50 ml (25 дози)

10 x 100 ml (50 дози)

4 x 250 ml (125 дози)

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Свине (за угодяване).

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За интрамускулно приложение.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок: нула дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След пробиване използвай незабавно.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние.
Да не се замразява.
Да се пази от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Zoetis Belgium

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

EU/2/15/190/001 (1 x 50 ml)
EU/2/15/190/002 (1 x 100 ml)
EU/2/15/190/003 (1 x 250 ml)
EU/2/15/190/004 (10 x 50 ml)
EU/2/15/190/005 (10 x 100 ml)
EU/2/15/190/006 (4 x 250 ml)

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

HDPE флакони (125 дози)

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Suvaxyn Circo+МН RTU инжекционна емулсия



2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка 2 ml доза съдържа:

Инактивиран рекомбинантен химерен PCV тип 1, съдържащ PCV тип 2

ORF2 протеин

2,3 – 12,4 RP

Инактивирана *Mycoplasma hyopneumoniae*, щам Р-5722-3

1,5 – 3,8 RP

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Свине (за угояване).

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

i.m.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок: нула дни.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След пробиване използвай незабавно.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние.

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Zoetis Belgium

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

HDPE флакони (25 или 50 дози)

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Suvaxyn Circo+МН RTU



2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Инактивиран рекомбинантен химерен PCV тип 1, съдържащ PCV тип 2

ORF2 протеин

2,3 – 12,4 RP

Инактивирана *Mycoplasma hyopneumoniae*, щам Р-5722-3

1,5 – 3,8 RP

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След пробиване използвай незабавно.

В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Suvaxyn Circo+MH RTU инжекционна емулсия за свине

2. Състав

Всяка 2 ml доза съдържа:

Активни вещества:

Инактивиран рекомбинантен химерен свински цирковирус тип 1,
съдържащ свински цирковирус тип 2 ORF2 протеин 2,3 – 12,4 RP*

Инактивирана *Mycoplasma hyopneumoniae*, щам Р-5722-3 1,5 – 3,8 RP*

*Единици за относителна активност, ELISA количествено определяне на антигена (*in vitro* тест за активност), сравнен с референтна ваксина.

Адjuванти:

MetaStim съдържа:

Squalane	0,4% (v/v)
Poloxamer 401	0,2% (v/v)
Polysorbate 80	0,032% (v/v)

Помощни вещества:

Thiomersal	0,2 mg
------------	--------

Бяла хомогенна емулсия.

По време на съхранение може да се появи малко количество черна утайка и емулсията може да се раздели на две отделни части.

При разклащане, черната утайка изчезва и емулсията отново става хомогенна.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Свине (за угодяване).

4. Показания за употреба

За активна имунизация на свине на възраст от 3 седмици срещу свински цирковирус тип 2 (PCV2) за намаляване количеството на вируса в кръвта и лимфоидните тъкани и отделянето с фекалиите, причинени от инфекция с PCV2.

За активна имунизация на свине на възраст от 3 седмици срещу *Mycoplasma hyopneumoniae*, за намаляване на белодробните лезии, свързани с инфекция с *M. Hyopneumoniae*.

Начало на имунитета: 3 седмици.

Продължителност на имунитета: 23 седмици.

5. Противопоказания

Няма.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана по време на бременност и лактация.

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Заплодяемост:

Няма налична информация за безопасността от използването на тази ваксина при нерези за разплод. Да не се използва при нерези за разплод.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарни лекарствени продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарен лекарствен продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай.

Предозиране:

4 часа след приложение на двойна доза се наблюдава преходно повишаване на телесната температура (средно с 0,8 °C). Това повишаване спонтанно отшумява в рамките на 24 часа без лечение.

В мястото на приложение често се наблюдава локална тъканна реакция под формата на оток (с диаметър до 2 cm), която отшумява в рамките на 2 дни.

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарен лекарствен продукт.

7. Неблагоприятни реакции

Свине (за уговяване):

Много чести (повече от 1 на 10 третиращи животни):	Повишена температура ¹ Възпаление в мястото на приложение ² , Болка в мястото на приложение ³ , зачервяване в мястото на приложение ³ , оток в мястото на приложение
Нечести (1 до 10 на 1 000 третиращи животни):	Реакции на свръхчувствителност (напр. депресия, диария или повръщане) ⁴
Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третиращи животни, включително изолирани съобщения):	Анафилаксия (тежка алергична реакция) ⁵

¹ Преходна; наблюдавана през първите 24 часа след ваксинацията. Средно с 1°C, но може да надвишава 2°C при отделните прасета. Това повишаване отшумява спонтанно в рамките на 48 часа без лечение.

² При постмортално изследване на тъканите в мястото на приложение, направено 4 седмици след прилагане на повторна единична доза от ваксината, много често се открива лек лимфоцитно-грануломатозен възпалителен отговор.

³ Локалните тъканни реакции обикновено са в зона с диаметър под 2 cm и могат да се задържат до 2 дни.

⁴ Обикновено изчезват без лечение.

⁵ В случай на такива реакции се препоръчва подходящо лечение

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или местния представител на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: {подробности за националната система}

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За интрамускулно приложение.

Еднократно интрамускулно приложение във врата зад ухото по една доза (2 ml) на прасе на възраст над 3 седмици.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Разклатете флакона добре преди употреба и периодично по време на процеса на ваксинация. Ваксината да се прилага асептично.

Препоръчва се употребата на многодозови спринцовки. Използвайте устройствата за ваксиниране съгласно инструкциите на производителя.

По време на съхранение може да се появи малко количество черна утайка и емулсията може да се раздели на две отделни части. При разклащане, черната утайка изчезва и емулсията отново става хомогенна.

10. Карентни срокове

Нула дни.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 °C – 8 °C).

Да не се замразява.

Да се пази от светлина.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху картонената кутия и върху флакона след Exp. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: използвай незабавно.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

EU/2/15/190/001-006.

Картонена кутия с 1 флакон от 50 ml (25 дози), 100 ml (50 дози) или 250 ml (125 дози).

Картонена кутия с 10 флакона от 50 ml (25 дози) или 100 ml (50 дози).

Картонена кутия с 4 флакона от 250 ml (125 дози).

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Белгия

Местни представители и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

België/Belgique/Belgien
Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
BE-1930 Zaventem
Tél/Tel: +32 (0) 800 99 189

Lietuva
Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belgija
Tel: +370 610 05088

Република България

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Белгия
Тел: +359 888 51 30 30

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.
náměstí 14. října 642/17
CZ 150 00 Praha
Tel: +420 257 101 111

Danmark

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Tlf: +45 70 20 73 05
adr.scandinavia@zoetis.com

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH
Schellingstr. 1
DE-10785 Berlin
Tel: +49 30 2020 0049
tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com

Eesti

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belgia
Tel: +370 610 05088

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.
Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι
EL-15125 Αττική
Τηλ: +30 210 6791900

España

Zoetis Spain, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte Edificio nº1,
c/ Quintanavides nº13
ES-28050 Madrid
Tel: +34 91 4191900

France

Zoetis France
10 rue Raymond David
FR-92240 Malakoff
Tél: +33 (0)800 73 00 65

Luxembourg/Luxemburg

Zoetis Belgium
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
Belsch
Tél/Tel: +32 (2) 746 80 11

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.
Csörsz u. 41.
HU-1124 Budapest
Tel.: +36 1 224 5200

Malta

Agrimed Limited
Mdina Road, Zebbug ZBG 9016,
MT
Tel: +356 21 465 797

Nederland

Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
NL-2909 LD Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0)10 714 0900

Norge

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark
Tlf: +47 23 29 86 80
adr.scandinavia@zoetis.com

Österreich

Zoetis Österreich GmbH
Floridsdorfer Hauptstr. 1
AT-1210 Wien
Tel: +43 (0)1 2701100 100
tierarzneimittelsicherheit@zoetis.com

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
PL - 02-676 Warszawa
Tel.: +48 22 2234800

Portugal

Zoetis Portugal Lda.
Lagoas Park, Edifício 10
PT-2740-271 Porto Salvo
Tel: +351 21 042 72 00

Hrvatska

Zoetis B.V.
 Podružnica Zagreb za promidžbu
 Petra Hektorovića 2
 HR-10000 Zagreb
 Tel: +385 1 6441 462

Ireland

Zoetis Belgium S.A. (Irish Branch)
 2nd Floor, Building 10,
 Cherrywood Business Park,
 Loughlinstown,
 Co. Dublin,
 IE – Dublin D18 T3Y1
 Tel: +353 (0) 1 256 9800

Ísland

Zoetis Animal Health ApS
 Øster Alle 48
 DK-2100 København
 Danmörku
 Sími: +45 70 20 73 05
adr.scandinavia@zoetis.com

Italia

Zoetis Italia S.r.l.
 Via Andrea Doria 41M,
 IT-00192 Roma
 Tel: +39 06 3366 8111

Κύπρος

Zoetis Hellas S.A.
 Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι
 15125, Αττική
 Ελλάδα
 Τηλ: +30 210 6791900

Latvija

Zoetis Belgium
 Mercuriusstraat 20
 1930 Zaventem
 België
 Tel: +370 610 05088

România

Zoetis România S.R.L.
 Expo Business Park, 54A Aviator Popișteanu,
 Clădirea 2, Etaj 1-3, Sector 1,
 București, 012095 - RO
 Tel: +40785019479

Slovenija

Zoetis B.V.
 Podružnica Zagreb za promidžbu
 Petra Hektorovića 2,
 10000 Zagreb,
 Hrvatska
 Tel: +385 1 6441 462

Slovenská republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.
 náměstí 14. října 642/17
 150 00 Praha
 Česká republika
 Tel: +420 257 101 111

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy
 Bulevardi 21 / SPACES
 FI-00180 Helsinki/Helsingfors
 Suomi/Finland
 Puh/Tel: +358 10 336 7000
laaketurva@zoetis.com

Sverige

Zoetis Animal Health ApS
 Øster Alle 48
 DK-2100 Köpenhamn
 Danmark
 Tel: +46 (0) 76 760 0677
adr.scandinavia@zoetis.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Zoetis Belgium S.A. (Irish Branch)
 2nd Floor, Building 10,
 Cherrywood Business Park,
 Loughlinstown,
 Co. Dublin,
 IE – Dublin D18 T3Y1
 Tel: +353 (0) 1 256 9800

17. Допълнителна информация

Ваксината съдържа инактивиран рекомбинантен химерен свински цирковирус тип 1, съдържащ свински цирковирус тип 2 ORF2 протеин и инактивирана *Mycoplasma hyorhneumoniae*. Предназначена е да стимулира изграждането на активен имунитет срещу PCV2 и *Mycoplasma hyorhneumoniae* при свине.