

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:
HIPRAVIAR – S**

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:
LABORATORIOS HIPRA S.A.
Avda. la Selva 135
Amer (Girona)
ΙΣΠΑΝΙΑ

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

HIPRAVIAR – S

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σύνθεση ανά 1 δόση

Δραστικό συστατικό:

Live Newcastle Disease Virus, strain La Sota $\geq 10^{6.5}$ EID₅₀

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την ενεργό ανοσοποίηση ορνίθων για την πρόληψη της νόσου του Newcastle (ψευδοπανώλους).

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην εμβολιάζονται ασθενείς και εξασθενημένες όρνιθες.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πιθανόν να παρατηρηθούν αναπνευστικά συμπτώματα σε όρνιθες που εμβολιάστηκαν, 5-7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Όρνιθες.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται 1 δόση ανά όρνιθα.

Ενστάλαξη στον οφθαλμό ή στους ρώθωνες.

Το λυόφιλο δισκίο διαλύεται σε απεσταγμένο νερό (30 mL ανά 1.000 δόσεις). Μία σταγόνα του εναιωρήματος ενσταλάζεται στον οφθαλμό ή στους ρώθωνες της όρνιθας, χρησιμοποιώντας κατάλληλο σταγονόμετρο.

Χορήγηση με το πόσιμο νερό:

Διαλύετε το δισκίο γεμίζοντας το φιαλίδιο με την μισή ποσότητα απεσταγμένου νερού.

Μετά από ανακίνηση, το περιεχόμενο ρίχνεται σε ανάλογη ποσότητα νερού, ώστε να καταναλωθεί σε μισή ή μία ώρα το πολύ.

Ηλικία	Ποσότητα νερού για περίπου 1.000 όρνιθες
1-3 εβδομάδες	5-10 λίτρα
4-9 εβδομάδες	12-23 λίτρα
10-16 εβδομάδες	27-37 λίτρα

Χορήγηση με ψεκασμό:

Χρησιμοποιείται η κατάλληλη ποσότητα απεσταγμένου νερού (π.χ. για όρνιθια μιας ημέρας χρησιμοποιούνται 250 mL/1.000 δόσεις) και η συσκευή ψεκασμού.

Γενικά, εάν ο αριθμός των ορνίθων δεν ταιριάζει με τον αριθμό των δόσεων, τότε χρησιμοποιείτε όλο το εμβόλιο και με υπερδοσία, ποτέ όμως με μειωμένη δοσολογία.

Συνιστώμενο εμβολιακό πρόγραμμα

Ο θεράπων κτηνίατρος ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, ανάλογα με την υγιεινή κατάσταση της εκτροφής και την περιοχή της.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Όταν το εμβόλιο χορηγείται με ψεκασμό, θα πρέπει ο χειριστής να φοράει προστατευτική μάσκα και προστατευτικά γυαλιά.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Μηδέν ημέρες.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται και να μεταφέρεται σε ψυγείο (2 °C – 8 °C)

Να φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Ειδική προφύλαξη για τη χορήγηση στα ζώα:

- Χρησιμοποιείτε στείρα υλικά για την ανασύσταση του εμβολίου.
- Σιγουρευτείτε ότι όλες οι όρνιθες λαμβάνουν τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.
- Οι συσκευές ψεκασμού και οι περιέκτες του νερού πρέπει να είναι καθαροί και απαλλαγμένοι από ιζήματα, σκουριές και υπολείμματα απορρυπαντικών.

- Ως διαλύτης χρησιμοποιείται το απεσταγμένο νερό.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

<DD/MM/YYYY>

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συσκευασίες:

Κυτίο με 10 φιαλίδια των 1.000 δόσεων.

Κυτίο με 5 φιαλίδια των 5.000 δόσεων.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: 210 4978660