

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BECO-JECT, injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

| | |
|----------------------------|----------|
| tiamino hidrochlorido | 10 mg, |
| riboflavino natrio fosfato | 4 mg, |
| piridoksino hidrochlorido | 4 mg, |
| ciankobalamino | 0,01 mg, |
| nikotinamido | 50 mg, |
| kalcio pantotenato | 5 mg, |
| kepenų ekstrakto | 25 mg; |

pagalbinių medžiagų: iki 1 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai, galvijai, kumeliukai, veršeliai, avys, ėriukai, paršeliai, šunys ir katės.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Arkliais, galvijams, kumeliukams, veršeliams, avims, ėriukams, paršeliams, šunims ir katėms, sutrikus augimui, esant naujagimių silpnumui, sutrikus kepenų funkcijai ar žarnyno mikrofloros veiklai, ilgai gydžius antibiotikais, nusilpus raumenims, sergant nervų ligomis ar esant prastam kailiui.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinomos.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Preparatą reikia švirkšti į raumenis ar po oda:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| arkliui | 10–20 ml, |
| galvijui | 10–20 ml, |
| veršeliui, kumeliukui ir aviai | 5 ml, |
| ėriukui | 2–4 ml, |
| paršeliui, šuniui ir katei | 0,5–2 ml 10 kg kūno svorio. |

Jei reikia, preparatą galima švirkšti pakartotinai po 10–14 dienų.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Nepalankių reakcijų neturėtų būti.

4.11. Išlauka

Arklienai, galvijienai, kiaulienai ir pienui – 0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: vitaminų ir mineralinių medžiagų deriniai.

ATCvet kodas: QA11JC.

5.1. Farmakodinaminės savybės

B grupės vitaminai, nikotinamidas ir kalcio pantotenas teigiamai veikia organizmo medžiagų apykaitą, odos funkcijas bei neurovegetacinę sistemą.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Sušvirkštus preparatą, vitaminai absorbuojami į kraują ir transportuojami į visus audinius ir organus. Kai kurie vitaminai organizme kaupiasi organuose, pvz., kepenyse. Nepanaudotos sudėtinės dalys iš organizmo išsiskiria su šlapimu ir tulžimi.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Metilparahidroksibenzoatas, injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinomi.

6.3. Tinkamumo laikas

24 mėn.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje..
Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Tamsaus II tipo stiklo buteliukai po 100 ml, užkimšti guminiiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

Dopharma B.V.,
Zalmweg 24,
4941 VX Raamsdonksveer,
Olandija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1433/001

9. PERREGISTRACIJOS DATA

2007-09-14

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2007-08-30

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**

**KARTONINĖ DĖŽUTĖ
BUTELIUKAS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BECO-JECT, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

| | |
|----------------------------|----------|
| tiamino hidrochlorido | 10 mg, |
| riboflavino natrio fosfato | 4 mg, |
| piridoksino hidrochlorido | 4 mg, |
| ciankobalamino | 0,01 mg, |
| nikotinamido | 50 mg, |
| kalcio pantotenato | 5 mg, |
| kepenų ekstrakto | 25 mg. |

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, kumeliukai, veršeliai, avys, ėriukai, paršeliai, šunys ir katės.

6. INDIKACIJOS

Arkliams, galvijams, kumeliukams, veršeliams, avims, ėriukams, paršeliams, šunims ir katėms, sutrikus augimui, esant naujagimių silpnumui, sutrikus kepenų funkcijai ar žarnyno mikrofloros veiklai, ilgai gydžius antibiotikais, nusilpus raumenims, sergant nervų ligomis ar esant prastam kailiui.

7. NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS

Preparatą reikia švirkšti į raumenis ar po oda:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| arkliui | 10–20 ml, |
| galvijui | 10–20 ml, |
| veršeliui, kumeliukui ir aviai | 5 ml, |
| ėriukui | 2–4 ml, |
| paršeliui, šuniui ir katei | 0,5–2 ml 10 kg kūno svorio. |

Jei reikia, preparatą galima švirkšti pakartotinai po 10–14 dienų.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina išdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma B.V.,
Zalmweg 24,
4941 VX Raamsdonksveer,
Olandijos

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1433/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
BECO-JECT, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Dopharma B.V.,
Zalmweg 24,
4941 VX Raamsdonksveer,
Olandija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BECO-JECT, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

| | |
|-----------------------------|-----------|
| tiamino hidrochlorido | 10 mg, |
| riboflavino natrio fosfato | 4 mg, |
| piridoksino hidrochlorido | 4 mg, |
| ciankobalamino | 0,01 mg, |
| nikotinamido | 50 mg, |
| kalcio pantotenato | 5 mg, |
| kepenų ekstrakto | 25 mg; |
| pagalbinių medžiagų: | iki 1 ml. |

4. INDIKACIJOS

Arkliams, galvijams, kumeliukams, veršeliams, avims, ėriukams, paršeliams, šunims ir katėms, sutrikus augimui, esant naujagimių silpnumui, sutrikus kepenų funkcijai ar žarnyno mikrofloros veiklai, ilgai gydžius antibiotikais, nusilpus raumenims, sergant nervų ligomis ar esant prastam kailiui.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokių sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, kumeliukai, veršeliai, avys, ėriukai, paršeliai, šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Preparatą reikia švirkšti į raumenis ar po oda:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| arkliui | 10–20 ml, |
| galvijui | 10–20 ml, |
| veršeliui, kumeliukui ir aviai | 5 ml, |
| ėriukui | 2–4 ml, |
| paršeliui, šuniui ir katei | 0,5–2 ml 10 kg kūno svorio. |

Jei reikia, preparatą galima švirkšti pakartotinai po 10–14 dienų.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

10. IŠLAUKA

Arkliai, galvijai, kiaulienai ir pienui – 0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje..

Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2007-08-30

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: vitaminų ir mineralinių medžiagų deriniai.

ATCvet kodas: QA11JC.

B grupės vitaminai, nikotinamidas ir kalcio pantotenas teigiamai veikia organizmo medžiagų apykaitą, odos funkcijas bei neurovegetacinę sistemą.

Sušvirkštus preparatą, vitaminai absorbuojami į kraują ir transportuojami į visus audinius ir organus. Kai kurie vitaminai organizme kaupiasi organuose, pvz., kepenyse. Nepanaudotos sudėtinės dalys iš organizmo išsiskiria su šlapimu ir tulžimi.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.