

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Tasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PROMYCINE PULVIS 4.800 I.U./mg, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/Milch.
 Kälber (nicht wiederkäuend), Schweine und Geflügel.
 Colistini sulfas

2. WIRKSTOFF

Colistini sulfas 4.800.000 U.I. – Excipients q.s. ad 1 g.

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/Milch.

4. PACKUNGSGRÖSSE

100 g, 250 g, 500 g, 1 kg und 2 kg.

5. ZIELTIERARTEN

Kälber (nicht wiederkäuend), Schweine und Geflügel.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

- Schweine: 21 mg PROMYCINE Pulvis 4.800 I.U./mg (100.000 I.E. /kg) pro kg Körpergewicht pro Tag, während 5 bis 7 aufeinander folgenden Tagen, über das Trinkwasser.

Dosierungsschema:

Schweine						
Körpergewicht	10 kg	20 kg	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Trinkwasser PROMYCINE	1.5 L	2.5 L	4.5 L	7.0 L	7.5 L	8.5 L
Pulvis 4800 I.U./mg	0.2 g	0.4 g	0.8 g	1.25 g	1.65 g	2 g

Art der Anwendung:

Das Pulver in der für 24 Stunden Behandlung erforderlichen Menge Trinkwasser lösen.

- Kälber: 21 mg PROMYCINE Pulvis 4.800 I.U./mg (100.000 I.E./kg) pro kg Körpergewicht pro Tag, während 5 bis 7 aufeinander folgenden Tagen, mit der Kunstmilch

Dosierungsschema (Zweimal täglich):

Kälber			
Körpergewicht Kunstmilch PROMYCINE	50 kg 8 L	75 kg 16 L	200 kg 16-18 L

Pulvis 4800 I.U./mg	0,5 g	0,75 g	2 g
------------------------	-------	--------	-----

Art der Anwendung: Es ist ratsam, die erforderliche Menge Promycine Pulvis 4.800 I.U./mg per Kalb genau abzuwiegen und diese in 1/3 bis der Hälfte des Gesamtvolumens der Kunstmilch aufzulösen. So kann das Kalb zuerst die medizinisierte Kunstmilch trinken. Das Restvolumen der Kunstmilch sollte danach verabreicht werden.

Geflügel: 31,25 mg PROMYCINE Pulvis 4.800 I.U./mg (150.000 I.E./kg) pro kg Körpergewicht pro Tag, während 5 bis 7 aufeinander folgenden Tagen, über das Trinkwasser.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Kalb: Essbare Gewebe: 1 Tag.

Schwein: Essbare Gewebe: 2 Tage.

Geflügel: Essbare Gewebe: Null Tage.

Eier: Nicht bei Legetieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP:

Nach erstmaligem Öffnen: 1 Monat.

Nach Rekonstituieren in medizinischen Trinkwassers: 24 Stunden.

Nach Rekonstituieren in Kunstmilch: 2 Stunden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETOEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere - Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk.

16. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V192272 (Sack)

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Topf****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PROMYCINE PULVIS 4.800 I.U./mg, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/Milch.
 Kälber (nicht wiederkäuend), Schweine und Geflügel.
 Colistini sulfas

2. WIRKSTOFF

Colistini sulfas 4.800.000 U.I. – Excipients q.s. ad 1 g.

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser/Milch.

4. PACKUNGSGRÖSSE

100 g, 250 g, 500 g und 1 kg.

5. ZIELTIERARTEN

Kälber (nicht wiederkäuend), Schweine und Geflügel.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

- Schweine: 21 mg PROMYCINE Pulvis 4.800 I.U./mg (100.000 I.E. /kg) pro kg Körpergewicht pro Tag, während 5 bis 7 aufeinander folgenden Tagen, über das Trinkwasser.

Dosierungsschema:

Schweine						
Körpergewicht	10 kg	20 kg	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Trinkwasser PROMYCINE	1.5 L	2.5 L	4.5 L	7.0 L	7.5 L	8.5 L
Pulvis 4800 I.U./mg	0.2 g	0.4 g	0.8 g	1.25 g	1.65 g	2 g

Art der Anwendung:

Das Pulver in der für 24 Stunden Behandlung erforderlichen Menge Trinkwasser lösen.

- Kälber: 21 mg PROMYCINE Pulvis 4.800 I.U./mg (100.000 I.E./kg) pro kg Körpergewicht pro Tag, während 5 bis 7 aufeinander folgenden Tagen, mit der Kunstmilch

Dosierungsschema (Zweimal täglich):

Kälber			
Körpergewicht Kunstmilch PROMYCINE	50 kg 8 L	75 kg 16 L	200 kg 16-18 L

Pulvis 4800 I.U./mg	0,5 g	0,75 g	2 g
------------------------	-------	--------	-----

Art der Anwendung: Es ist ratsam, die erforderliche Menge Promycine Pulvis 4.800 I.U./mg per Kalb genau abzuwiegen und diese in 1/3 bis der Hälfte des Gesamtvolumens der Kunstmilch aufzulösen. So kann das Kalb zuerst die medizierte Kunstmilch trinken. Das Restvolumen der Kunstmilch sollte danach verabreicht werden.

Geflügel: 31,25 mg PROMYCINE Pulvis 4.800 I.U./mg (150.000 I.E./kg) pro kg Körpergewicht pro Tag, während 5 bis 7 aufeinander folgenden Tagen, über das Trinkwasser.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Kalb: Essbare Gewebe: 1 Tag.

Schwein: Essbare Gewebe: 2 Tage.

Geflügel: Essbare Gewebe: Null Tage.

Eier: Nicht bei Legetieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP:

Nach erstmaligem Öffnen: 2 Monate.

Nach Rekonstituieren in medizinischen Trinkwassers: 24 Stunden.

Nach Rekonstituieren in Kunstmilch: 2 Stunden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren.

Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETOEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere - Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

V.M.D. n.v.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk.

16. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V322077 (Topf)

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot