

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Schachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Narcostart 1 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Medetomidinhydrochlorid 1,0 mg  
(entsprechend 0,85 mg Medetomidin)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 1 Durchstechflasche mit 10 ml Injektionslösung.  
5 x 1 Durchstechflasche mit 10 ml Injektionslösung.

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hunde und Katzen.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Hunde: Zur intramuskulären oder intravenösen Anwendung.  
Katzen: Zur intramuskulären Anwendung.

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.  
Nach Anbrechen verwendbar bis ...

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht einfrieren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Le Vet B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V368611 (BrombutylGummistopfen)

BE-V662962 (ChlorbutylGummistopfen)

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Durchstechflasche**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Narcostart



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Medetomidinhydrochlorid 1 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...