

**GEBRAUCHSINFORMATION**  
**MOXAJECT 15%, Injektionssuspension für Rind und Schwein**

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:

V.M.D. n.v.  
Hoge Mauw 900  
B-2370 Arendonk

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

**MOXAJECT 15%, Injektionssuspension für Rind und Schwein**  
Amoxicillin-Trihydrat

**3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Wirkstoff: Amoxicillin-Trihydrat 172.2 mg entspricht 150 mg Amoxicillin pro ml.  
Sonstige Bestandteile: Benzylalkohol  
Hydrogeniertes Kokosöl.

**4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Rind, Schwein:

Zur Behandlung von durch auf Amoxicillin sensibel reagierende Keime verursachte Infektionen, stets unter Berücksichtigung der pharmakokinetischen Eigenschaften des Antibiotikums, wobei effektive Konzentrationen direkt an der Infektionsstelle verabreicht werden sollen.

**5. GEGENANZEIGEN**

- Nicht bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern und Wüstenrennmäuse anwenden.
- Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Penicilline.
- Nicht bei Infektionen anwenden, die durch Penicillinase produzierende Bakterien verursacht wurden.
- Nicht intravenös injizieren.
- Nicht anwenden bei Tieren mit Nierenfunktionsstörungen einschließlich Anurie und Oligurie.

**6. NEBENWIRKUNGEN**

- Magen-Darm-Störungen sind selten und erfordern keine Einstellung der Behandlung.
- Es können Hypersensibilitätsreaktionen auftreten, von leichten Hautreaktionen bis zur Anaphylaxie.
- Die intramuskuläre Applikation kann manchmal vorübergehende Schwellungen an der Injektionsstelle verursachen.
- Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

**7. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schwein

**8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Injektionssuspension zur intramuskulären Anwendung.  
Vor Gebrauch gut schütteln.

Rind und Schwein:

15 mg Amoxicillin/kg Körpergewicht (= 1 ml MOXAJECT 15% je 10 kg), 1 Mal täglich, während 3 bis 5 Tage.

Um eine korrekte Dosierung zu gewährleisten und eine Unterdosierung zu vermeiden, muss das Körpergewicht so genau wie möglich bestimmt werden.

Abwechselnd auf der linken und rechten Seite des Tiers applizieren.

**9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Eine gleichzeitige Anwendung rasch wirkender bakteriostatischer Arzneimittel, wie Tetracycline, vermeiden.

Durch den unangemessenen Einsatz des Produkts kann das Auftreten gegen Amoxicillin resistenter Bakterien zunehmen.

Sollten sich allergische Reaktionen zeigen muss die Behandlung beendet werden.

Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln, um eine homogene Suspension zu erhalten.

**10. WARTEZEIT(EN)**

- Essbare Gewebe:

Rind: 110 Tage.

Schwein: 93 Tage.

- Milch:

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25°C lagern.

Vor Licht schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem Behältnis angegeben Verfalldatum nach dem EXP.

Haltbarkeit des Tierarzneimittels im unversehrten Behältnis: 2 Jahre.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

**12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Bei Verwendung des Produktes sollten offizielle und örtliche Bestimmungen zur Verwendung von Antibiotika berücksichtigt werden.

Die Therapieentscheidung ist auf der Basis einer Empfindlichkeitsuntersuchung der aus dem erkrankten Tier isolierten Bakterien zu treffen. Wenn dies nicht möglich ist, muss die Therapie auf der Grundlage lokaler (regionaler oder auf Betriebsebene vorliegender) epidemiologischer Daten zur Empfindlichkeit der bakteriellen Zielerreger erfolgen. Eine Anwendung des Produkts abweichend von den Angaben der Fachinformation, kann die Prävalenz von Bakterien, die gegen Amoxicillin resistent sind, erhöhen und auch die Wirksamkeit der Behandlung verringern.

Brechen Sie die Behandlung ab, wenn allergische Reaktionen auftreten.  
Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln, um eine homogene Suspension zu erhalten.  
Verabreichen Sie das Mittel abwechselnd auf der linken und rechten Seite des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

- Nach der Injektion oder dem Kontakt mit der Haut können Penicilline Hypersensibilität auslösen. Die Hypersensibilität gegen Penicilline kann der auslösende Faktor für eine Hypersensibilität gegen Cephalosporine und umgekehrt sein.

Manchmal können allergische Reaktionen schwerwiegende Formen annehmen.

Sie dürfen dieses Produkt nicht handhaben, wenn Sie auf derartige Produkte sensibel reagieren oder Ihnen von der Arbeit mit solchen Produkten abgeraten wurde.

Handhaben Sie dieses Produkt mit der nötigen Umsicht und allen empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen, um eine Exposition zu vermeiden.

Falls Symptome wie ein Hautausschlag auftreten, müssen Sie ärztliche Hilfe einholen und dem behandelnden Arzt diesen Warnhinweis zeigen. Schwellungen im Gesicht, an den Lippen oder Augen oder Atembeschwerden stellen sehr ernste Symptome dar, die dringend eine medizinische Betreuung erfordern.

Nach dem Gebrauch die Hände waschen.

- Da keine Kompatibilitätsstudien durchgeführt wurden, darf dieses Tierarzneimittel nicht mit anderen Tierarzneimitteln gemischt werden.

- Amoxicillin führt die Plazenta, aber die fötalen Blutkonzentrationen sind verglichen mit dem Muttertier niedrigeres. Es ist jedoch für das Fötus nicht schädlich.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

Oktober 2021

**15. WEITERE ANGABEN**

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Zulassungsnummer: BE-V179907

Ablieferung: Verschreibungspflichtig.