

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton mit Spritzen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****ORBENIN Long Acting**, 200 mg, Suspension zur intramammären Anwendung**2. WIRKSTOFF(E)***Cloxacillin. natricum monohydricum* (= Cloxacillin. 200 mg/3g)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

3, 12 oder 48 Euterinjektoren

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Laktierendes Milchrind).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

-

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Der Applikator Orbenin Long Acting ermöglicht die Verabreichung des Tierarzneimittels entweder mit einer langen oder einer kurzen Kanüle. Gebrauchen Sie vorzugsweise die kurze Kanüle.

Gebrauchsanweisung für die kurze Kanüle:

Brechen Sie das Ende der Kappe ab. Führen Sie nur die kurze Kanüle in den Zitzenkanal ein und spritzen Sie langsam. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Kanüle mit den Fingern.

Gebrauchsanweisung für die lange Kanüle:

Entfernen Sie die Kappe, indem Sie diese am unteren Ende leicht zusammendrücken, so dass sie sich löst. Führen Sie die Kanüle vorsichtig in den Zitzenkanal ein und spritzen Sie langsam. Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Kanüle mit den Fingern.

*Dessin explicitant l'utilisation de la seringue avec embout court ou avec embout long.***7. WARTEZEITEN****Wartezeit:**

Milch: 120 Stunden nach der letzten Behandlung

Essbare Gewebe: 1 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V080437

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Spritzen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****ORBENIN Long Acting**, 200 mg, Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN***Cloxacillin. natricum monohydricum* (= *Cloxacillin*. 200 mg/3g)**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}