

**ANEXO I**

**RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

## 1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO

Porcilis PCV ID emulsão injetável para porcos

## 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada dose de 0,2 ml contém:

### Substância ativa:

Circovírus porcino tipo 2 ORF2, subunidade do antigénio  $\geq 1436 \text{ UA}^1$

### Adjuvantes:

Acetato de dl- $\alpha$ -tocoferol 0,6 mg

Parafina líquida leve 8,3 mg

<sup>1</sup> Unidades antigénicas determinadas através do teste de potência *in vitro*.

### Excipientes:

Composição qualitativa dos excipientes e outros componentes
Polissorbato 80
Simeticone
Cloreto de sódio
Cloreto de potássio
Fosfato dissódico dihidratado
Dihidrogenofosfato de potássio
Água para injetáveis

Emulsão homogénea, branca a esbranquiçada após agitação.

## 3. INFORMAÇÃO CLÍNICA

### 3.1 Espécies-alvo

Porcos.

### 3.2 Indicações de utilização para cada espécie-alvo

Para a imunização ativa de porcos para reduzir a viremia, a carga viral nos pulmões e nos tecidos linfóides, e a excreção do vírus causada pela infeção por PCV2. Para diminuir a redução no ganho de peso diário e mortalidade associada à infeção pelo PCV2.

Início da imunidade: 2 semanas após a vacinação.

Duração da imunidade: 23 semanas após a vacinação.

### 3.3 Contraindicações

Não existentes.

### 3.4 Advertências especiais

Vacinar apenas animais saudáveis.

### 3.5 Precauções especiais de utilização

### Precauções especiais para a utilização segura nas espécies-alvo:

A administração da vacina a machos não foi avaliada.

### Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

Aviso ao utilizador:

Este medicamento veterinário contém óleo mineral. A injeção acidental ou a autoinjeção pode provocar dor intensa e tumefação, em particular se injetado numa articulação ou dedo, podendo, em casos raros, resultar na perda do dedo afetado, caso não sejam prestados cuidados médicos imediatos. Em caso de injeção acidental, e ainda que a quantidade injetada seja mínima, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe o folheto informativo do medicamento veterinário. Se as dores persistirem por mais de 12 horas após o exame médico, consulte novamente o médico.

Aviso ao médico:

Este medicamento veterinário contém óleo mineral. A injeção acidental, ainda que numa quantidade mínima, pode provocar tumefação intensa que pode resultar, por exemplo, em necrose isquémica e, caso a zona afetada seja um dedo, na perda deste. É necessário prestar **IMEDIATAMENTE** cuidados cirúrgicos, podendo ser necessário proceder à incisão precoce e à irrigação da zona injetada, em especial se esta envolver os tecidos moles ou o tendão de um dedo.

### Precauções especiais para a proteção do ambiente:

Não aplicável.

## **3.6 Eventos adversos**

Porcos:

Muito frequentes (>1 animal / 10 animais tratados):	Tumefação no local de injeção*
--	--------------------------------

\* consistem principalmente em tumefações duras não dolorosas de até 2 cm de diâmetro. É frequentemente observado um padrão bifásico da tumefação no local de injeção, que consiste num aumento e diminuição seguidas por outro aumento e diminuição do tamanho. Em porcos, individualmente, o tamanho pode aumentar até 6,5 cm e pode ser observada vermelhidão e/ou crostas. As tumefações no local de injeção desaparecem completamente em, aproximadamente, 7 semanas após a vacinação.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. As notificações devem ser enviadas, de preferência por um veterinário, ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou ao respetivo representante local ou à autoridade nacional competente através do sistema nacional de farmacovigilância veterinária. Para obter informações de contacto, consulte também a secção 16 do Folheto Informativo.

## **3.7 Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos**

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

## **3.8 Interação com outros medicamentos e outras formas de interação**

Existem dados sobre segurança e eficácia em porcos, desde as 3 semanas de idade, que demonstram que esta vacina pode ser administrada misturada com Porcilis Lawsonia ID (ver secção 3.9 abaixo) e/ou não misturada com Porcilis M Hyo ID ONCE e/ou não misturada com Porcilis PRRS (via intradérmica).

O local de administração das vacinas não misturadas deve ser separado por, pelo menos, 3 cm. O folheto informativo da Porcilis Lawsonia ID, Porcilis M Hyo ID ONCE e Porcilis PRRS deve ser consultado antes da administração.

Os eventos adversos estão descritos na secção 3.6, exceto para a tumefação no local de injeção, onde pode ocorrer até um tamanho máximo de 7 cm em porcos, individualmente. A tumefação no local de injeção pode persistir até 7 semanas e é muito frequente acompanhada por vermelhidão e crostas. No caso da crosta ser esfregada podem, frequentemente, observar-se algumas pequenas lesões cutâneas. É

comum no dia da vacinação um aumento da temperatura (média 0,3 °C, em porcos, individualmente, até 2 °C). A temperatura dos animais volta ao normal 1-2 dias após ter sido observado o pico de temperatura. Pode ser observado, pouco frequentemente, decúbito e mal-estar nos porcos vacinados.

As indicações estão descritas na secção 3.2, exceto para a duração da imunidade, a qual foi demonstrada ser de 26 semanas após a vacinação.

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com aqueles já referidos. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso e tendo em consideração a especificidade da situação.

### 3.9 Posologia e via de administração

Para administração intradérmica.

Antes de administrar, permitir que a vacina atinja a temperatura ambiente (15°C – 25°C) e agitar bem antes de administrar.

Evitar múltiplas perfurações.

Administração intradérmica de 0,2 ml por animal, preferencialmente nas partes laterais do pescoço, ao longo dos músculos das costas ou na pata traseira (todos os porcos) ou na zona perianal (em porcos para reprodução) utilizando um dispositivo de injeção multidose sem agulha para administração intradérmica de líquidos, que permita a administração de um volume *jet-stream* de vacina (0,2 ml ± 10%) através das camadas epidérmicas da pele.

A segurança e eficácia de Porcilis PCV ID foram demonstradas utilizando o dispositivo IDAL.

#### Esquema de vacinação:

Vacinar uma vez a partir das 3 semanas de idade e é recomendado revacinar no intervalo de 23 semanas.

#### *Administração misturada com Porcilis Lawsonia ID*

A vacina Porcilis PCV ID pode ser utilizada para reconstituir o liofilizado de Porcilis Lawsonia ID imediatamente antes da vacinação em porcos a partir das 3 semanas de idade de acordo com o seguinte:

Liofilizado de Porcilis Lawsonia ID	Porcilis PCV ID
50 doses	10 ml
100 doses	20 ml

Para reconstituição adequada e administração correta, utilizar o seguinte procedimento:

1. Permitir que a Porcilis PCV ID atinja a temperatura ambiente e agitar bem antes de administrar.
2. Adicionar aproximadamente 5-10 ml de Porcilis PCV ID ao liofilizado de Porcilis Lawsonia ID e misturar brevemente.
3. Retirar o concentrado reconstituído do frasco e transferi-lo de volta para o frasco com a Porcilis PCV ID. Agitar brevemente para misturar.
4. Administrar a vacina em suspensão no prazo de 6 horas após reconstituição. Qualquer vacina remanescente no final deste tempo deverá ser descartada.

#### Dose:

Administrar, por via intradérmica no pescoço, uma dose única (0,2 ml) de Porcilis Lawsonia ID misturada com Porcilis PCV ID.

Aspetto visual após reconstituição: emulsão homogénea branca a esbranquiçada após agitação.

Evitar a introdução de contaminação através de múltiplas perfurações.

### **3.10 Sintomas de sobredosagem (e, quando aplicável, procedimentos de emergência e antídotos)**

Sem informação disponível.

### **3.11 Restrições especiais de utilização e condições especiais de utilização, incluindo restrições à utilização de medicamentos veterinários antimicrobianos e antiparasitários, a fim de limitar o risco de desenvolvimento de resistência**

Não aplicável.

### **3.12 Intervalos de segurança**

Zero dias.

## **4. PROPRIEDADES IMUNOLÓGICAS**

### **4.1 Código ATCvet: QI09AA07**

O medicamento veterinário estimula o desenvolvimento de imunidade ativa contra o circovírus porcino tipo 2 em porcos.

## **5. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS**

### **5.1 Incompatibilidades principais**

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário exceto aqueles mencionados na secção 3.8.

### **5.2 Prazo de validade**

Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda: 2 anos.

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 8 horas.

### **5.3 Precauções especiais de conservação**

Conservar no frigorífico (2 °C – 8 °C).

Não congelar.

Proteger da luz solar direta.

### **5.4 Natureza e composição do acondicionamento primário**

Frasco de vidro (tipo I) de 10 ml fechado com tampa de borracha nitrilo e selado com cápsula de alumínio.

Frasco PET (polietileno tereftalato) de 20 ml fechado com tampa de borracha nitrilo e selado com cápsula de alumínio.

Apresentações:

Caixa de cartão com 1 frasco de vidro de 10 ml.

Caixa de cartão com 10 frascos de vidro de 10 ml.

Caixa de cartão com 1 frasco PET de 20 ml.

Caixa de cartão com 10 frascos PET de 20 ml.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

## **5.5 Precauções especiais para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de desperdícios derivados da utilização desses medicamentos**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis ao medicamento veterinário em causa.

## **6. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Intervet International B.V.

## **7. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/2/15/187/001

EU/2/15/187/002

EU/2/15/187/003

EU/2/15/187/004

## **8. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO**

Data da primeira autorização: 28/08/2015.

## **9. DATA DA ÚLTIMA REVISÃO DO RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

{MM/AAAA}

## **10. CLASSIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **ANEXO II**

### **OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Não existentes.

**ANEXO III**  
**ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO**

## **A. ROTULAGEM**

**INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO**

CAIXA DE CARTÃO

**1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

Porcilis PCV ID emulsão injetável para porcos

**2. DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

Por 0,2 ml:

Subunidade do antigénio PCV2 ORF2  $\geq$  1436 UA**3. DIMENSÃO DA EMBALAGEM**

10 ml

20 ml

10 x 10 ml

10 x 20 ml

**4. ESPÉCIES-ALVO**

Porcos

**5. INDICAÇÕES****6. VIAS DE ADMINISTRAÇÃO**

Via intradérmica.

**7. INTERVALOS DE SEGURANÇA**

Intervalo de segurança: zero dias.

**8. PRAZO DE VALIDADE**

Exp. {mm/aaaa}

Após abertura da embalagem, administrar no prazo de 8 horas.

**9. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO**

Conservar no frigorífico.

Não congelar.

Proteger da luz solar direta.

**10. MENÇÃO "Antes de administrar, ler o folheto informativo"**

Antes de administrar, ler o folheto informativo.

**11. MENÇÃO "USO VETERINÁRIO"**

USO VETERINÁRIO

**12. MENÇÃO "MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

**13. NOME DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

Intervet International B.V.

**14. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO**

EU/2/15/187/001 (1x 10ml)

EU/2/15/187/002 (10x 10ml)

EU/2/15/187/003 (1x 20ml)

EU/2/15/187/004 (10x 20ml)

**15. NÚMERO DO LOTE**

Lot {número}

**INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE  
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO**

FRASCOS DE 10 E 20 ML

**1. NOME DO MEDICAMENTO VETERINÁRIO**

Porcilis PCV ID



**2. INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS SOBRE AS SUBSTÂNCIAS ATIVAS**

Subunidade do antigénio PCV2 ORF2

10 ml

20 ml

**3. NÚMERO DO LOTE**

Lot {número}

**4. PRAZO DE VALIDADE**

Exp. {mm/aaaa}

**B. FOLHETO INFORMATIVO**

## FOLHETO INFORMATIVO

### 1. Nome do medicamento veterinário

Porcilis PCV ID emulsão injetável para porcos

### 2. Composição

Cada dose de 0,2 ml contém:

#### Substância ativa:

Circovírus porcino tipo 2 ORF2, subunidade do antigénio  $\geq 1436$  UA<sup>1</sup>

#### Adjuvantes:

Acetato de dl- $\alpha$ -tocoferol 0,6 mg

Parafina líquida leve 8,3 mg

<sup>1</sup> Unidades antigénicas determinadas através do teste de potência *in vitro*.

Emulsão injetável.

Emulsão homogénea, branca a esbranquiçada após agitação.

### 3. Espécies-alvo

Porcos.

### 4. Indicações de utilização

Para a imunização ativa de porcos para reduzir a viremia, a carga viral nos pulmões e nos tecidos linfóides, e a excreção do vírus causada pela infeção por PCV2. Para diminuir a redução no ganho de peso diário e mortalidade associada à infeção pelo PCV2.

Início da imunidade: 2 semanas após a vacinação.

Duração da imunidade: 23 semanas após a vacinação.

### 5. Contraindicações

Nenhuma.

### 6. Advertências especiais

#### Advertências especiais:

Vacinar apenas animais saudáveis.

#### Precauções especiais para uma utilização segura nas espécies-alvo:

A administração da vacina a machos não foi avaliada.

#### Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais:

Aviso ao utilizador:

Este medicamento veterinário contém óleo mineral. A injeção acidental ou a autoinjeção pode provocar dor intensa e tumefação, em particular se injetado numa articulação ou dedo, podendo, em casos raros, resultar na perda do dedo afetado, caso não sejam prestados cuidados médicos imediatos.

Em caso de injeção acidental, e ainda que a quantidade injetada seja mínima, consulte imediatamente um médico e mostre-lhe o folheto informativo do medicamento veterinário. Se as dores persistirem por mais de 12 horas após o exame médico, consulte novamente o médico.

**Aviso ao médico:**

Este medicamento veterinário contém óleo mineral. A injeção acidental, ainda que numa quantidade mínima, pode provocar tumefação intensa que pode resultar, por exemplo, em necrose isquémica e, caso a zona afetada seja um dedo, na perda deste. É necessário prestar **IMEDIATAMENTE** cuidados cirúrgicos, podendo ser necessário proceder à incisão precoce e à irrigação da zona injetada, em especial se esta envolver os tecidos moles ou o tendão de um dedo.

**Precauções especiais para a proteção do ambiente:**

Não aplicável.

**Gestação e lactação:**

Pode ser administrado durante a gestação e lactação.

**Interação com outros medicamentos e outras formas de interação:**

Existem dados sobre segurança e eficácia em porcos, desde as 3 semanas de idade, que demonstram que esta vacina pode ser administrada misturada com Porcilis Lawsonia ID (ver secção 8 abaixo) e/ou não misturada com Porcilis M Hyo ID ONCE e/ou não misturada com Porcilis PRRS (via intradérmica).

O local de administração das vacinas não misturadas deve ser separado por, pelo menos, 3 cm. O folheto informativo da Porcilis Lawsonia ID, Porcilis M Hyo ID ONCE e Porcilis PRRS deve ser consultado antes da administração.

Os eventos adversos estão descritos na secção 7, exceto para a tumefação no local de injeção, onde pode ocorrer até um tamanho máximo de 7 cm em porcos, individualmente. A tumefação no local de injeção pode persistir até 7 semanas e é muito frequente acompanhada por vermelhidão e crostas. No caso da crosta ser esfregada podem, frequentemente, observar-se algumas pequenas lesões cutâneas. É comum no dia da vacinação um aumento da temperatura (média 0,3 °C, em porcos, individualmente, até 2 °C). A temperatura dos animais volta ao normal 1-2 dias após ter sido observado o pico de temperatura. Pode ser observado, pouco frequentemente, decúbito e mal-estar nos porcos vacinados. As indicações estão descritas na secção 4, exceto para a duração da imunidade, a qual foi demonstrada ser de 26 semanas após a vacinação.

Não existe informação disponível sobre a segurança e a eficácia desta vacina quando utilizada com qualquer outro medicamento veterinário, exceto com aquele já referido. A decisão da administração desta vacina antes ou após a administração de outro medicamento veterinário, deve ser tomada caso a caso e tendo em consideração a especificidade da situação.

**Incompatibilidades principais:**

Não misturar com qualquer outro medicamento veterinário exceto aqueles mencionados acima.

## **7. Eventos adversos**

Porcos:

Muito frequentes (>1 animal / 10 animais tratados):	Tumefação no local de injeção*
--	--------------------------------

\* consistem principalmente em tumefações duras não dolorosas de até 2 cm de diâmetro. É frequentemente observado um padrão bifásico da tumefação no local de injeção, que consiste num aumento e diminuição seguidas por outro aumento e diminuição do tamanho. Em porcos, individualmente, o tamanho pode aumentar até 6,5 cm e pode ser observada vermelhidão e/ou crostas. As tumefações no local de injeção desaparecem completamente em, aproximadamente, 7 semanas após a vacinação.

A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. As notificações devem ser enviadas, de preferência por um veterinário, ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou ao respetivo representante local ou à autoridade nacional competente através do sistema nacional de farmacovigilância veterinária. Para obter informações de contacto, consulte também a secção 16 do Folheto Informativo.

## **8. Dosagem em função da espécie, via e modo de administração**

Para administração intradérmica.

Administração intradérmica de 0,2 ml por animal, preferencialmente nas partes laterais do pescoço, ao longo dos músculos das costas ou na pata traseira (todos os porcos) ou na zona perianal (em porcos para reprodução) utilizando um dispositivo de injeção multidose sem agulha para administração intradérmica de líquidos, que permita a administração de um volume *jet-stream* de vacina (0,2 ml ± 10%) através das camadas epidérmicas da pele.

A segurança e eficácia de Porcilis PCV ID foram demonstradas utilizando o dispositivo IDAL.

### Esquema de vacinação:

Vacinar uma vez a partir das 3 semanas de idade e é recomendado revacinar no intervalo de 23 semanas.

### *Administração misturada com Porcilis Lawsonia ID*

A vacina Porcilis PCV ID pode ser utilizada para reconstituir o liofilizado de Porcilis Lawsonia ID imediatamente antes da vacinação em porcos a partir das 3 semanas de idade de acordo com o seguinte:

Liofilizado de Porcilis Lawsonia ID	Porcilis PCV ID
50 doses	10 ml
100 doses	20 ml

Para reconstituição adequada e administração correta, utilizar o seguinte procedimento:

1. Permitir que a Porcilis PCV ID atinja a temperatura ambiente e agitar bem antes de administrar.
2. Adicionar aproximadamente 5-10 ml de Porcilis PCV ID ao liofilizado de Porcilis Lawsonia ID e misturar brevemente.
3. Retirar o concentrado reconstituído do frasco e transferi-lo de volta para o frasco com a Porcilis PCV ID. Agitar brevemente para misturar.
4. Administrar a vacina em suspensão no prazo de 6 horas após reconstituição. Qualquer vacina remanescente no final deste tempo deverá ser descartada.

Dose:

Administrar, por via intradérmica no pescoço, uma dose única (0,2 ml) de Porcilis Lawsonia ID misturada com Porcilis PCV ID.

Aspetto visual após reconstituição: emulsão homogénea branca a esbranquiçada após agitação.

Evitar a introdução de contaminação através de múltiplas perfurações.

## **9. Instruções com vista a uma administração correta**

Antes de administrar, permitir que a vacina atinja a temperatura ambiente (15°C – 25°C) e agitar bem antes de administrar.

Evitar múltiplas perfurações.

## **10. Intervalos de segurança**

Zero dias.

#### **11. Precauções especiais de conservação**

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Conservar no frigorífico (2 °C - 8°C).

Não congelar.

Proteger da luz solar direta.

Não administrar o medicamento veterinário depois de expirado o prazo de validade indicado no rótulo após Exp.

Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário: 8 horas.

#### **12. Precauções especiais de eliminação**

Os medicamentos não devem ser eliminados no lixo ou nos esgotos domésticos.

Utilize regimes de recolha de medicamentos veterinários para a eliminação de medicamentos veterinários não utilizados ou de resíduos resultantes da utilização desses medicamentos, em cumprimento dos requisitos nacionais e de quaisquer sistemas de recolha nacionais aplicáveis. Estas medidas destinam-se a ajudar a proteger o ambiente.

Pergunte ao seu médico veterinário ou farmacêutico como deve eliminar os medicamentos veterinários que já não são necessários.

#### **13. Classificação dos medicamentos veterinários**

Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

#### **14. Números de autorização de introdução no mercado e tamanhos de embalagem**

EU/2/15/187/001-004.

Caixa de cartão com 1 ou 10 frascos de 10 ou 20 ml.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

#### **15. Data em que o folheto informativo foi revisto pela última vez**

{MM/AAAA}

Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento veterinário na base de dados de medicamentos da União Europeia (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

#### **16. Detalhes de contacto**

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante responsável pela libertação do lote:  
Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer  
Países Baixos

Detalhes de contacto para comunicar suspeitas de eventos adversos:

**België/Belgique/Belgien**

MSD Animal Health Belgium BV-SRL  
Tél/Tel: + 32 (0)2 370 94 01

**Република България**

Intervet International B.V.  
Тел: + 359 28193749

**Česká republika**

Intervet s.r.o.  
Tel: + 420 233 010 242

**Danmark**

MSD Animal Health A/S  
Tlf: + 45 44 82 42 00

**Deutschland**

Intervet Deutschland GmbH  
Tel: + 49 (0)8945614100

**Eesti**

Intervet International B.V.  
Tel: + 37052196111

**Ελλάδα**

Intervet Hellas A.E.  
Τηλ: + 30 210 989 7452

**España**

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.  
Tel: + 34 923 19 03 45

**France**

Intervet S.A.S / Intervet / MSD Santé Animale  
Tél: + 33 (0)241228383

**Hrvatska**

Intervet International B.V. podružnica u  
Republici Hrvatskoj  
Tel: + 385 1 6611339

**Ireland**

Intervet (Ireland) Limited  
Tel: + 353 (0) 1 2970220

**Ísland**

Vistor hf.  
Sími: + 354 535 7000

**Lietuva**

Intervet International B.V.  
Tel: + 37052196111

**Luxembourg/Luxemburg**

MSD Animal Health Belgium BV-SRL  
Tél/Tel: + 32 (0)2 370 94 01

**Magyarország**

Intervet Hungaria Kft./ Intervet Hungaria  
Értékesítő Kft.  
Tel.: + 36 1 439 4597

**Malta**

Intervet International B.V.  
Tel: + 39 02 516861

**Nederland**

MSD Animal Health-Intervet Nederland B.V.  
Tel: + 32 (0)2 370 94 01

**Norge**

MSD Animal Health Norge AS  
Tlf: + 47 55 54 37 35

**Österreich**

Intervet Ges.mb.H.  
Tel: + 43 (1) 256 87 87

**Polska**

Intervet Sp. z o.o.  
Tel.: + 48 22 18 32 200

**Portugal**

MSD Animal Health Lda.  
Tel: + 351 214 465 700

**România**

Intervet Romania S.R.L.  
Tel: + 40 21 311 83 11

**Slovenija**

Intervet International B.V.  
Podružnica u Republici Hrvatskoj  
Tel: + 385 1 6611339

**Slovenská republika**

Intervet s.r.o.  
Tel: + 420 233 010 242

**Italia**

MSD Animal Health S.r.l.  
Tel: + 39 02 516861

**Κύπρος**

Intervet Hellas A.E.  
Τηλ: + 30 210 989 7452

**Latvija**

Intervet International B.V.  
Tel: + 37052196111

**Suomi/Finland**

MSD Animal Health Oy  
Puh/Tel: + 358 10 2310 750

**Sverige**

MSD Animal Health Sweden AB  
Tel: + 46 (0)8 522 216 60

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Intervet (Ireland) Limited  
Tel: + 353 (0) 1 2970220

**17. Outras informações**