

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Combo Cat 50,00 mg / 60,00 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem un mājas seskiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra 0,5 ml pipete satur:

Aktīvās vielas:

Fipronils 50,00 mg
(S)-metoprens 60,00 mg

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs	Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai
Butilēts hidroksianizols (E320)	0,10 mg
Butilēts hidroksitoluols (E321)	0,05mg
Etilspirts	
Polisorbāts 80 (E433)	
Povidons	
Dietilēnglikola monoetilēteris	

Caurspīdīgs, dzeltens šķīdums.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Kaķi un mājas seski.

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Kaķiem:

Blusu invāzijas un jauktas blusu un ērcu un/vai utu invāzijas novēršanai.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai. Insekticīda iedarbība pret pieaugušu blusu jaunu invāziju saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai, kavējot olu (ovocīda darbība) veidošanos un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas, 6 nedēļas pēc aplikācijas.
- Ērcu (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm noturīga akaricīda iedarbība pret ērcēm saglabājas līdz 2 nedēļām (pamatojoties uz eksperimentāliem datiem).
- Utu (*Felicola subrostratus*) iznīcināšanai.

Šīs veterinārās zāles var lietot blusu izraisīta alerģiska dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna ietvaros.

Mājas seskiem:

Blusu un jauktas blusu un ērcu invāzijas novēršanai.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai. Insekticīda iedarbība pret pieaugušo blusu jaunu invāziju saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai, kavējot olu (ovocīda darbība)

veidošanos un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas, 4 nedēļas pēc aplikācijas.

- Ērcu (*Ixodes ricinus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm ir noturīga akaracīda iedarbība pret ērcēm 4 nedēļas (pamatojoties uz eksperimentāliem datiem).

3.3. Kontrindikācijas

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai kaķēniem, kuri sver mazāk par 1 kg. Veterinārās zāles nelietot mājas seskiem līdz 6 mēnešu vecumam. Nelietot trušiem, jo ir novērotas šo veterināro zāļu blakusparādības un var pat iestāties nāve. Tā kā nav pētījumu, nav ieteicams lietot šīs veterinārās zāles citām sugām izņemot norādītās mērķsugas.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis u.c.) un dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Nevajadzīga pretparazitāro līdzekļu lietošana vai lietošana citādi, nekā noteikts zāļu aprakstā, var palielināt rezistences izlases spiedienu un samazināt iedarbīgumu. Lēmumam par veterināro zāļu lietošanu ir jābūt balstītam uz katra atsevišķa dzīvnieka parazitāru sugas un sloga apstiprinājumu vai invāzijas riska, pamatojoties uz tā epidemioloģiskajām iezīmēm.

Nav pieejami dati par mazgāšanas/šampūnu pielietošanas ietekmi uz šo veterināro zāļu iedarbīgumu kaķiem un mājas seskiem. Tomēr pamatojoties uz informāciju par iedarbīgumu suņiem, kas mazgāti ar šampūnu 2 dienas pēc veterināro zāļu aplikācijas, nav ieteicams mazgāt dzīvniekus 2 dienas pēc šo veterināro zāļu aplikācijas.

Atsevišķas ērces tomēr var piesūkties pēc ārstēšanas. Šādos gadījumos pie noteiktiem apstākļiem nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesanu.

Blusas no mājdzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās, piemēram, paklājos un mīkstajās mēbelēs, kas masveida invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā ir jāapstrādā ar piemērotiem insekticīdiem un regulāri jātīra ar putekļsūcēju.

Pārējie dzīvnieki, kas dzīvo tajā pašā mājāsaimniecībā, arī ir jāapstrādā ar atbilstošu pretparazitāru līdzekli.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Izvairīties no veterināro zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

Ir svarīgi pārliecināties, ka šīs veterinārās zāles tiek uzklātas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Nav informācijas par šo veterināro zāļu toksicitāti kaķēniem, kuri ir jaunāki par 8 nedēļām, kuru mātēm ir lietotas šīs veterinārās zāles. Šajā gadījumā jāievēro īpaša piesardzība.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles var izraisīt gļotādas, ādas un acu kairinājumu. Tādēļ jānovērš šo veterināro zāļu saskare ar mutes gļotādu, ādu un acīm.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret fipronilu vai (S)-metoprēnu, vai spirtu, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Nepieļaut zāļu saskari ar pirkstiem. Ja tas ir noticis, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi veterināro zāļu nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Pēc veterināro zāļu aplicēšanas mazgāt rokas.

Apstrādātos dzīvniekus nedrīkst glaudīt līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un neļaut bērniem rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi. Tādēļ ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet pievakarē un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Apstrādes laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Skatīt 5.5. apakšpunktu.

3.6. Blakusparādības

Kaķi un mājas seski:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Reakcijas aplikācijas vietā (ādas krāsas izmaiņas ¹ , alopēcija ¹ , nieze ¹ , eritēma ¹). Vispārēja nieze vai alopēcija. Hipersalivācija ² , vemšana. Hiperestēzija ³ , depresija ³ , citi neiroloģiski simptomi ³ .
---	--

¹ Pārejošas.

² Ja notikusi zāļu ielaizīšana, var novērot īslaicīgu siekalošanos, galvenokārt palīgvielu dēļ.

³ Atgriezeniski.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam pārstāvim vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Laboratoriskajos pētījumos kaķiem netika konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība.

Grūsnība un laktācija:

Kaķiem:

Drīkst lietot grūsnības laikā.

Par lietošanu laktācijas laikā skatīt 3.5. apakšpunktā.

Mājas seskiem:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu drošums grūsnības un laktācijas laikā mājas seskiem. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

3.9. Lietošanas veids un devas

Uzpilināšanai.

Nepietiekamas devas lietošana var būt neefektīva un var veicināt rezistences attīstību.

Kaķiem:

Minimālā deva ir 5 mg/kg fipronila un 6 mg/kg (S)-metoprēna, kas atbilst vienai 0,5 ml pipetei kaķim. Tā kā nav pietiekošu drošuma pētījumu, minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas.

Mājas seskiem:

Deva ir 50 mg fipronila un 60 mg (S)-metoprēna, kas atbilst vienai 0,5 ml pipetei mājas seskam. Minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas.

Ārstējot pret blusu un/vai ērcu invāziju, lēmumu par atkārtotas ārstēšanas nepieciešamību un biežumu jābalsta uz profesionālu ieteikumu un jāņem vērā vietējā epidemioloģiskā situācija un dzīvnieka dzīvesveids.

Lietošanas metode:

Turēt pipeti vertikāli. Uzsist pa pipetes šaurāko daļu, lai nodrošinātu, ka saturs atrodas pipetes paplašinātajā daļā. Nolauzt pipetes galu. Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz muguras starp kakla pamatni un lāpstiņām līdz redzama āda. Novietot pipetes galu uz ādas un saspiest pipeti vairākas reizes, lai iztukšotu tās saturu pilnībā un tieši uz ādas vienā punktā.

3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Nepārdozēt.

Novēroto blakusparādību risks pie pārdozēšanas var palielināties (skatīt 3.6. apakšpunktu).

Kaķiem:

Drošuma pētījumos mērķdzīvniekiem netika novērotas blakusparādības pieaugušiem kaķiem un 8 nedēļas veciem un vecākiem kaķēniem, kuri sver aptuveni 1 kg, lietojot vienu reizi mēnesī devā, kas piecas reizes pārsniedza ieteicamo devu, 6 mēnešus pēc kārtas.

Pēc aplikācijas var būt novērojama nieze.

Vienā vietā aplicējot pārāk daudz šķīduma, tas izraisīs apmatojuma salipšanu aplikācijas vietā. Ja tā notiek, salipums izzudīs 24 stundu laikā pēc aplikācijas.

Mājas seskiem:

Svara zudums novērots dažiem 6 mēnešus veciem un vecākiem mājas seskiem, kuri tika ārstēti vienreiz katrās divās nedēļās, četras reizes devā, kas piecas reizes pārsniedza ieteicamo devu.

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

3.12. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATĶvet kods: QP53AX65

Šīs veterinārās zāles ir insekticīds un akaricīds šķīdums lokālai lietošanai, kas satur aktīvo vielu ar adulticīdu iedarbību – fipronilu, kombinācijā ar aktīvo vielu ar ovicīdu un larvicīdu iedarbību – (S)-metoprēnu.

4.2. Farmakodinamiskās īpašības

Fipronils ir insekticīda un akaricīda viela, kas pieder pie fenilpirazolu grupas. Tas mijiedarbojas ar liganda hlorīdu kanāliem, kas ir saistīti ar neiromediatoru gamma-aminosviestskābi (GASS), tādējādi bloķējot hlorā jonu pre- un postsinaptisko pārnasi starp šūnu membrānām. Tas noved pie centrālās nervu sistēmas nekoordinētas darbības un kukaiņu un ērcu bojāejas. Fipronils nogalina blusas 24 stundu laikā, ērces (*Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*) un utis 48 stundu laikā pēc aplikācijas.

(S)-metoprēns ir insektu augšanas regulators (IAR) no savienojumu klases, kas pazīstami kā juvenilo hormonu analogi, kas aptur kukaiņu attīstību nenobriedušā stadijā. Šī viela darbojas līdzīgi juvenilajiem hormoniem un izraisa traucētu blusu attīstību un bojāeju kukaiņu nobriešanas stadijās. Uz dzīvnieka (S)-metoprēna ovicīdā iedarbība notiek vai nu tieši iekļūstot tikko izdētajās olīnās, vai iekļūstot caur kutikulu pieaugušas blusas organismā. (S)-metoprēns efektīvi aptur blusu olīņu un kāpuru tālāko attīstību, kas pasargā no dzīvnieku tuvākās apkārtnes piesārņošanas ar blusām to nenobriedušās attīstības stadijās.

4.3. Farmakokinētiskās īpašības

Fipronila metabolisma pētījumi pierāda, ka fipronila biežāk sastopamais metabolīts ir sulfona atvasinājums.

(S)-metoprēns sadalās oglekļa dioksīdā un acetātā, kuri pēc tam iekļaujas endogēnos materiālos.

Fipronila un (S)-metoprēna kombinācijas lietošana lokāli kaķiem tika salīdzināta ar tikai fipronila vai tikai (S)-metoprēna intravenozām injekcijām. Konstatēta absorbcija un citi farmakokinētiskie parametri tika novērtēti klīniskos izmēģinājumos. Lokālā aplikācija kopā ar iespējamo zāļu uzņemšanu iekšķīgi pēc ielaizīšanas nodrošina fipronila vispārēju sistēmisku uzsūkšanos (18%) ar vidējo maksimālo koncentrāciju (C_{max}) asins plazmā aptuveni 10 ng/ml fipronilam un 13 ng/kg fipronila sulfonam.

Fipronils maksimālo koncentrāciju asins plazmā sasniedz ātri (t_{max} aptuveni 6 stundu laikā) un terminālais eliminācijas pusperiods ir aptuveni 25h.

Fipronils kaķa organismā metabolizējas fipronila sulfonā.

(S)-metoprēna koncentrācija plazmā kopumā bija zemāka par kvantitatīvo robežu (20 ng/ml) kaķiem pēc lokālas aplikācijas.

Gan (S)-metoprēns, gan fipronils kopā ar to lielākajiem metabolītiem labi izplatās pa kaķa ādu un apmatojumu vienas dienas laikā pēc aplikācijas. Fipronila, fipronila sulfona un (S)-metoprēna koncentrācija kaķa apmatojumā ar laiku samazinās un ir nosakāms vismaz 59 dienas pēc aplikācijas. Parazīti iet bojā drīzāk kontakta ceļā, retāk sistēmiskas iedarbības rezultātā.

Farmakoloģiskā nesaderība starp fipronilu un (S)-metoprēnu nav konstatēta.

Mājas seskiem zāļu farmakokinētiskais profils nav pētīts.

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nav zināma.

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 3 gadi.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Tiešā iepakojuma veids:

Zaļa pipete, kas sastāv no termiski veidota apvalka (poliakrilnitrila-metilāta kopolimērs / polipropilēns) un plēves (polietilēns/poliakrilnitrila-metilāta kopolimērs).

Iepakojuma lielumi:

Blisteris, kas satur 1 x 0,5 ml pipeti ar rievotu galu.

Kaste ar 1 blisteri, kas satur 3 x 0,5 ml pipetes ar rievotu galu.

Kaste ar 2 blisteriem, kas satur 3 x 0,5 ml pipetes ar rievotu galu.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo fipronils un (S)-metoprēns var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem. Nepiesārņot dīkus, tekošus ūdeņus vai grāvjus ar veterinārajām zālēm vai to tukšajiem iepakojumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Francija

7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)

V/NRP/03/1587

8. PIRMĀS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: 07/11/2003

9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

03/2025

10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PIELIKUMS

MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA- APVIENOTAIS MARKĒJUMA UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TEKSTS

Kaste, kas satur 3 pipetes vai 6 pipetes

GADĪJUMS Nr.1: Šis teksts atbilst gadījumiem, kad visa informācija, kas ietverta lietošanas instrukcijā, VAR tikt pārnesta uz ārējo iepakojumu un konteineru. Tāpēc šajā gadījumā saskaņā ar pašreizējo QRD veidni atsevišķa instrukcija netiks nodrošināta.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline ComboCat 50,00 mg / 60,00 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem un mājas seskiem

2. SASTĀVS

Aktīvās vielas:

Fipronils 50,00 mg

(S)-metoprēns 60,00 mg

Palīgvielas:

Butilēts hidroksianizols (E320) 0,10 mg

Butilēts hidroksitoluols (E321) 0,05 mg

FIPRONIL 10% w/v (S)-METHOPRENE 12% w/v

[Ja ir pietiekami daudz vietas, pēc aktīvo vielu procentuālā daudzuma pievienos "w/v". Tur, kur trūkst vietas, blakus procentiem tiks pievienota zvaigznīte ar paskaidrojošu piezīmi blakus produkta nosaukumam.]

Caurspīdīgs, dzeltens šķīdums.

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

3 x 0,5 ml

6 x 0,5 ml

4. MĒRĶSUGAS

Kaķi

Mājas seski

5. LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

Lietošanas indikācijas

Kaķiem:

Blusu invāzijas un jauktas blusu un ērcu un/vai utu invāzijas novēršanai.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai. Insekticīda iedarbība pret pieaugušo blusu jaunu invāziju saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai, kavējot olu (ovocīda darbība) veidošanos un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas, 6 nedēļas pēc aplikācijas.

- Ērcu (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm noturīga akaricīda iedarbība pret ērcēm saglabājas līdz 2 nedēļām (pamatojoties uz eksperimentāliem datiem).
- Utu (*Felicola subrostratus*) iznīcināšanai.

Šīs veterinārās zāles var lietot blusu izraisīta alerģiska dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna ietvaros.

Mājas seskiem:

Blusu un jauktas blusu un ērcu invāzijas novēršanai.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai. Insekticīda iedarbība pret pieaugušo blusu jaunu invāziju saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai, kavējot olu (ovocīda darbība) veidošanos un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas, 4 nedēļas pēc aplikācijas.
- Ērcu (*Ixodes ricinus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm noturīga akaricīda iedarbība pret ērcēm saglabājas 4 nedēļas (pamatojoties uz eksperimentāliem datiem).

Fipronils nogalina blusas 24 stundu laikā, un ērces un utis 48 stundu laikā pēc aplikācijas.

6. KONTRINDIKĀCIJAS

Kontrindikācijas

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai kaķēniem, kuri sver mazāk par 1 kg. Veterinārās zāles nelietot mājas seskiem līdz 6 mēnešu vecumam. Nelietot trušiem, jo ir novērotas veterināro zāļu blakusparādības un var pat iestāties nāve. Tā kā nav pētījumu, nav ieteicams lietot šīs veterinārās zāles citām sugām izņemot norādītās mērķsugas.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas sasilšanas, drudzis u.c.) un dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

7. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi

Tikai ārīgai lietošanai.

Nevajadzīga pretparazitāro līdzekļu lietošana vai lietošana citādi, nekā noteikts zāļu aprakstā, var palielināt rezistences izlases spiedienu un samazināt iedarbīgumu. Lēmumam par veterināro zāļu lietošanu ir jābūt balstītam uz katra atsevišķa dzīvnieka parazitāru sugas un sloga apstiprinājumu vai invāzijas riska, pamatojoties uz tā epidemioloģiskajām iezīmēm.

Nav pieejami dati par mazgāšanas un šampūnu pielietošanas ietekmi uz šo veterināro zāļu iedarbīgumu kaķiem un mājas seskiem. Tomēr pamatojoties uz informāciju par iedarbīgumu suņiem, kas mazgāti ar šampūnu 2 dienas pēc veterināro zāļu aplikācijas, nav ieteicams mazgāt dzīvniekus 2 dienas pēc šo veterināro zāļu aplikācijas.

Atsevišķas ērces tomēr var piesūkties pēc ārstēšanas. Šādos gadījumos pie noteiktiem apstākļiem nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesanu.

Blusas no mājdzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās, piemēram, paklājos un mīkstajās mēbelēs, kas masveida invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā ir jāapstrādā ar piemērotiem insekticīdiem un regulāri jātīra ar putekļsūcēju.

Pārējie dzīvnieki, kas dzīvo tajā pašā mājāsaimniecībā, arī ir jāapstrādā ar atbilstošu pretparazitāru līdzekli.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Izvairīties no veterināro zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

Ir svarīgi pārliecināties, ka šīs veterinārās zāles tiek uzklātas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Nav informācijas par šo veterināro zāļu toksicitāti kaķēniem, kas ir jaunāki par 8 nedēļām, kuru mātēm ir lietotas šīs veterinārās zāles. Šajā gadījumā jāievēro īpaša piesardzība.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles var izraisīt gļotādas, ādas un acu kairinājumu. Tādēļ jānovērš šo veterināro zāļu saskare ar mutes gļotādu, ādu un acīm.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret fipronilu vai (S)-metoprēnu, vai spirtu, jāizvairas no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Nepieļaut zāļu saskari ar pirkstiem. Ja tas ir noticis, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi veterināro zāļu nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Pēc veterināro zāļu aplicēšanas mazgāt rokas.

Apstrādātos dzīvniekus nedrīkst glaudīt līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un neļaut bērniem rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi. Tādēļ ieteicams dzīvniekus apstrādāt ar veterinārajām zālēm nevis pa dienu, bet pievakarē un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Apstrādes laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Skatīt sadaļu "Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai".

Grūsnība un laktācija:

Kaķiem šīs veterinārās zāles drīkst lietot grūsnības laikā. Par lietošanu laktācijas laikā skatīt iepriekš. Mājas seskiem lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana:

Nepārdozēt.

Novēroto blakusparādību risks pie pārdozēšanas var palielināties (skatīt "Blakusparādības").

Kaķiem:

Drošuma pētījumos mērķa dzīvniekiem netika novērotas nevēlamas blakusparādības pieaugušiem kaķiem un 8 nedēļas veciem kaķēniem un vecākiem, kuri sver mazāk par 1 kg, lietojot vienu reizi mēnesī piekārtīgā ieteicamā devā 6 mēnešus pēc kārtas.

Pēc aplikācijas var būt novērojama nieze.

Vienā vietā aplicējot pārāk daudz šķidruma, tas izraisīs apmatojuma salipšanu aplikācijas vietā. Ja tā notiek, salipums izzudīs 24 stundu laikā pēc aplikācijas.

Mājas seskiem:

Svara zudums novērots dažiem 6 mēnešus veciem un vecākiem mājas seskiem, kuri tika ārstēti vienreiz katrās divās nedēļās četras reizes ar piekārtīgu ieteicamo devu.

8. BLAKUSPARĀDĪBAS

Blakusparādības

Kaķi un mājas seski:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):

Reakcijas aplikācijas vietā (ādas krāsas izmaiņas¹, alopēcija¹, nieze¹, eritēma¹). Vispārēja nieze vai alopēcija. Hiperaktivitāte², vemšana. Hiperestēzija³, depresija³, citi neiroloģiski simptomi³.

¹ Pārejošas.

² Ja notikusi zāļu ielaizīšana, var novērot īslaicīgu siekalošanos, galvenokārt palīgvielu dēļ.

³ Atgriezeniski.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontakttinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: <https://www.pvd.gov.lv/lv>.

9. DEVA KATRAI DZĪVNIEKU SUGAI, LIETOŠANAS VEIDS UN METODE

Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Uzpilināšanai.

Nepietiekamas devas lietošana var būt neefektīva un var veicināt rezistences attīstību.

Kaķiem:

Minimālā deva ir 5 mg/kg fipronila un 6 mg/kg (S)-metoprēna, kas atbilst vienas pipetes saturam – 0,5 ml kaķim.

Mājas seskiem:

Deva ir 50 mg fipronila un 60 mg (S)-metoprēna, kas atbilst vienas pipetes saturam - 0,5 ml mājas seskam.

Ārstējot pret blusu un/vai ērcu invāziju, lēmumu par atkārtotas ārstēšanas nepieciešamību un biežumu jābalsta uz profesionālu ieteikumu un jāņem vērā vietējā epidemioloģiskā situācija un dzīvnieka dzīvesveids.

10. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ieteikumi pareizai lietošanai

- 1 - Izņemt pipeti no iepakojuma.
- 2 - Turēt pipeti vertikāli. Uzstīt pa pipetes šaurāko daļu, lai nodrošinātu, ka saturs atrodas pipetes paplašinātajā daļā. Nolauzt pipetes galu.
- 3 - Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz muguras starp kakla pamatni un lāpstiņām līdz redzama āda. Novietot pipetes galu uz ādas un saspīst pipeti vairākas reizes, lai iztukšotu tās saturu pilnībā un tieši uz ādas vienā punktā.

11. IEROBEŽOJUMU PERIODS

Ierobežojumu periods: Nav piemērojams.

12. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kastītes pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo fipronils un (S)-metoprēns var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem. Nepiesārņot dīķus, tekošus ūdeņus vai grāvjus ar veterinārajām zālēm vai to tukšajiem iepakojumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

14. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Veterināro zāļu klasifikācija

Bezrecepšu veterinārās zāles.

15. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI UN IEPAKOJUMA LIELUMI

V/NRP/03/1587

Iepakojuma lielumi

Blisteris, kas satur 1 x 0,5 ml pipeti.

Kaste ar 1 blisteri, kas satur 3 x 0,5 ml pipetes.

Kaste ar 2 blisteriem, kas satur 3 x 0,5 ml pipetes.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

16. DATUMS, KAD ETIĶETE PĒDĒJO REIZI PĀRSKATĪTA

Datums, kad etiķete pēdējo reizi pārskatīta

03/2025

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē.

17. KONTAKTINFORMĀCIJA

Kontaktinformācija

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon, Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 chemin du Calquet
31000 Toulouse, Francija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Vīne

AHRCVAnimalHealthPV.AT@boehringer-ingelheim.com
Tel: +371 67 240 011

18. CITA INFORMĀCIJA

19. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

20. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

21. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

Kaste, kas satur 3 pipetes vai 6 pipetes

GADĪJUMS Nr.2: Šis teksts atbilst gadījumiem, kad visa informācija, kas ietverta lietošanas instrukcijā, nevar tikt pārnesta uz ārējo iepakojumu un konteineru (**piemēram daudzvalodu iepakojums**). Līdz ar to tiek pievienota lietošanas instrukcija.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Combo Cat šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem un mājas seskiem

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katra 0,5 ml pipete satur:

Fipronils	50,00 mg
(S)-metoprēns	60,00 mg

FIPRONIL 10% w/v (S)-METHOPRENE 12% w/v

[Ja ir pietiekami daudz vietas, pēc aktīvo vielu procentuālā daudzuma pievienos “w/v”. Tur, kur trūkst vietas, blakus procentiem tiks pievienota zvaigznīte ar paskaidrojošu piezīmi blakus produkta nosaukumam.]

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

3 x 0,5 ml
6 x 0,5 ml

4. MĒRĶSUGAS

Kaķi
Mājas seski

5. INDIKĀCIJAS

Iznīcina blusas uz jūsu kaķa un aizsargā pret atkārtotu invāziju līdz 4 nedēļām.

Kavē blusu olniņu, blusu kāpuru un kūniņu attīstību (līdz 6 nedēļām kaķiem), tādējādi novēršot jūsu kaķa apkārtējās vides piesārņojumu uz tādu pašu laiku.

Iznīcina ērces uz jūsu kaķa un aizsargā pret atkārtotu invāziju līdz pat 2 nedēļām.

Iznīcina utis uz jūsu kaķa.

Var lietot blusu izraisīta alerģiska dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna ietvaros kaķiem.

Pasargā ārstēto dzīvnieku tuvāko apkārtni no piesārņošanas ar blusām to nenobriedušās attīstības stadijās.

Iznīcina blusas uz jūsu seska un aizsargā pret atkārtotu invāziju līdz 4 nedēļām.

Iznīcina ērces uz jūsu seska un aizsargā pret atkārtotu invāziju līdz pat 4 nedēļām.
{piktogramma}

6. LIETOŠANAS VEIDI

Uzpilināšanai.

LIETOŠANAS METODE

- 1 - Izņemt pipeti no iepakojuma.
- 2 - Turēt pipeti vertikāli. Uzsist pa pipetes šaurāko daļu, lai nodrošinātu, ka saturs atrodas pipetes paplašinātajā daļā. Nolauzt pipetes galu.
- 3 - Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz muguras starp kakla pamatni un lāpstiņām līdz redzama āda. Novietot pipetes galu uz ādas un saspiest pipeti vairākas reizes, lai iztukšotu tās saturu pilnībā un tieši uz ādas vienā punktā.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI

V/NRP/03/1587

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

Blisteris, kas satur 1 pipeti

Tālāk minētā informācija ir visa informācija, kas ir redzama uz šī iepakojuma, vai nu uz blistera, vai uz tajā ievietotās kombinētās etiķetes-iepakojuma instrukcijas.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Combo Cat šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem un mājas seskiem

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Katra 0,5 ml pipete satur:

Fipronils 50,00 mg

(S)-metoprēns 60,00 mg

FIPRONIL 10% w/v (S)-METHOPRENE 12% w/v

[Ja ir pietiekami daudz vietas, pēc aktīvo vielu procentuālā daudzuma pievienos “w/v”. Tur, kur trūkst vietas, blakus procentiem tiks pievienota zvaigznīte ar paskaidrojošu piezīmi blakus produkta nosaukumam.]

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

0,5 ml

4. MĒRĶSUGAS

Kaķi

Mājas seski

5. INDIKĀCIJAS

Iznīcina blusas.

Iznīcina ērces.

Iznīcina utis uz jūsu kaķa.

Pasargā ārstēto dzīvnieku tuvāko apkārtni no piesārņošanas ar blusām to nenobriedušās attīstības stadijās.

6. LIETOŠANAS VEIDI

Uzpilināšanai.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS
--

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI
--

V/NRP/03/1587

15. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1 pipete

Tiešais iepakojums ir pipete: tālāk norādītā informācija ir redzama uz pipetes apvalka vai uzliktņa.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Combo

[Piktogramma ar pilienu, kas no pipetes krīt uz dzīvnieka ādas, tādējādi norādot lietošanas veidu]

2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

0,5 ml:

Fipronil 50 mg

(S)-methoprene 60 mg

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

Kaste ar 3 pipetēm: 1 blisteris ar 3 pipetēm

Kaste ar 6 pipetēm: 2 blisteri ar 3 pipetēm

Blistera iepakojums abos gadījumos ir vienāds: tālāk norādītā informācija ir redzama uz blistera apvalka vai uz blistera iepakojuma blistera vāciņa.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Combo Cat

2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

Fipronil, (s)-methoprene

50 mg / 60 mg

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Kaste ar 3 pipetēm

Kaste ar 6 pipetēm

Tālāk aprakstītā instrukcija attiecas uz gadījumu Nr. 2, kad iepakojumam ir pievienota lietošanas instrukcija. Gadījumā Nr. 1 instrukcija netiek pievienota.

1. Veterināro zāļu nosaukums

Frontline Combo Cat 50,00 mg / 60,00 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem un mājas seskiem

2. Sastāvs

Katra 0,5 ml pipete satur:

Aktīvās vielas:

Fipronils 50,00 mg

S-metoprens 60,00 mg

Palīgvielas:

Butilēts hidroksianizols (E320) 0,10 mg

Butilēts hidroksitoluols (E321) 0,05 mg

Caurspīdīgs, dzeltens šķīdums pilināšanai uz ādas.

3. Mērķsugas

Kaķi, mājas seski.

4. Lietošanas indikācijas

Kaķiem:

Blusu invāzijas un jauktas blusu un ērcu un/vai utu invāzijas novēršanai.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai. Insekticīda iedarbība pret pieaugušo blusu jaunu invāziju saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai, kavējot olu (ovocīda darbība) veidošanos un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas 6 nedēļas pēc aplikācijas.
- Ērcu (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm noturīga akaricīda iedarbība pret ērcēm saglabājas līdz 2 nedēļām (pamatojoties uz eksperimentu datiem).
- Utu (*Felicola subrostratus*) iznīcināšanai.

Šīs veterinārās zāles var lietot blusu izraisīta alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna ietvaros.

Mājas seskiem:

Blusu un jauktas blusu un ērcu invāzijas novēršanai.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai. Insekticīda iedarbība pret pieaugušo blusu jaunu invāziju saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai, kavējot olu (ovocīda darbība) veidošanos un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas 4 nedēļas pēc aplikācijas.
- Ērcu (*Ixodes ricinus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm ir stabila akaricīda iedarbība, kas pasargā pret ērcēm 4 nedēļas (pamatojoties uz eksperimentāliem datiem).

5. Kontrindikācijas

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai kaķēniem, kuri sver mazāk par 1 kg. Veterinārās zāles nelietot mājas seskiem līdz 6 mēnešu vecumam. Nelietot trušiem, jo ir novērotas šo veterināro zāļu blakusparādības un var pat iestāties nāve. Tā kā nav pētījumu, nav ieteicams lietot šīs veterinārās zāles citu sugu dzīvniekiem, izņemot norādītās mērķsugas.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis u.c.) un dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. Īpaši brīdinājumi

Nevajadzīga pretparazitāro līdzekļu lietošana vai lietošana citādi, nekā noteikts zāļu aprakstā, var palielināt rezistences izlases spiedienu un samazināt iedarbīgumu. Lēmumam par veterināro zāļu lietošanu ir jābūt balstītam uz katra atsevišķa dzīvnieka parazitū sugas un sloga apstiprinājumu vai invāzijas riska, pamatojoties uz tā epidemioloģiskajām iezīmēm.

Nav pieejami dati par mazgāšanas un šampūnu pielietošanas ietekmi uz šo veterināro zāļu iedarbīgumu kaķiem un mājas seskiem. Tomēr pamatojoties uz informāciju par iedarbīgumu suņiem, kas mazgāti ar šampūnu 2 dienas pēc veterināro zāļu aplikācijas, nav ieteicams mazgāt dzīvniekus 2 dienas pēc šo veterināro zāļu aplikācijas.

Atsevišķas ērces tomēr var piesūkties pēc ārstēšanas. Šādos gadījumos pie noteiktiem apstākļiem nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesanu.

Blusas no mājdzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās, piemēram, paklajos un mīkstajās mēbelēs, kas masveida invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā ir jāapstrādā ar piemērotiem insekticīdiem un regulāri jātīra ar putekļsūcēju.

Pārējie dzīvnieki, kas dzīvo tajā pašā mājāsaimniecībā, arī ir jāapstrādā ar atbilstošu pretparazitāru līdzekli.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Izvairīties no veterināro zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

Ir svarīgi pārliecināties, ka šīs veterinārās zāles tiek uzklātas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Nav informācijas par šo veterināro zāļu toksicitāti kaķēniem, kas ir jaunāki par 8 nedēļām, kuru mātēm ir lietotas šīs veterinārās zāles. Šajā gadījumā jāievēro īpaša piesardzība.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles var izraisīt gļotādas, ādas un acu kairinājumu. Tādēļ jānovērš šo veterināro zāļu saskare ar mutes gļotādu, ādu un acīm.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret fipronilu vai (S)-metoprēnu, vai spirtu, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Nepieļaut veterināro zāļu saskari ar pirkstiem. Ja tas ir noticis, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi veterināro zāļu nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Pēc veterināro zāļu aplicēšanas mazgāt rokas.

Apstrādātos dzīvniekus nedrīkst glaudīt līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un neļaut bērniem rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi. Tādēļ ieteicams dzīvniekus apstrādāt ar veterinārajām zālēm nevis pa dienu, bet pievakarē un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Apstrādes laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Skatīt sadaļu "Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai".

Grūsnība un laktācija:

Kaķiem šīs veterinārās zāles drīkst lietot grūsnības laikā. Par lietošanu laktācijas laikā skatīt iepriekš. Mājas seskiem lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana:

Nepārdozēt.

Novēroto blakusparādību risks pie pārdozēšanas var palielināties (skatīt “Blakusparādības”).

Kaķiem:

Drošuma pētījumos mērķdzīvniekiem netika novērotas blakusparādības pieaugušiem kaķiem un 8 nedēļas veciem kaķēniem un vecākiem, kuri sver mazāk par 1 kg, lietojot vienu reizi mēnesī devā, kas piecas reizes pārsniedza ieteicamo devu, 6 mēnešus pēc kārtas.

Pēc aplikācijas var būt novērojama nieze.

Vienā vietā aplicējot pārāk daudz šķīduma, tas izraisīs apmatojuma salipšanu aplikācijas vietā. Ja tā notiek, salipums izzudīs 24 stundu laikā pēc aplikācijas.

Mājas seskiem:

Svara zudums novērots dažiem 6 mēnešus veciem un vecākiem mājas seskiem, kuri tika ārstēti vienreiz katrās divās nedēļās četras reizes ar devu, kas piecas reizes pārsniedza ieteicamo devu.

7. Blakusparādības

Kaķi un mājas seski:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):

Reakcijas aplikācijas vietā (ādas krāsas izmaiņas¹, alopēcija¹, nieze¹, eritēma¹). Vispārēja nieze vai alopēcija. Hipersalivācija², vemšana. Hiperestēzija³, depresija³, citi neiroloģiski simptomi³.

¹ Pārejošas.

² Ja notikusi zāļu ielaizīšana, var novērot īslaicīgu siekalošanos, galvenokārt palīgvielu dēļ.

³ Atgriezeniski.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontakttinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: <https://www.pvd.gov.lv/lv>.

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

Nepietiekamas devas lietošana var būt neefektīva un var veicināt rezistences attīstību.

Kaķim minimālā deva ir 5 mg/kg fipronila un 6 mg/kg (S)-metoprēna, kas atbilst vienai 0,5 ml pipetei kaķim. Tā kā nav pietiekošu drošuma pētījumu, minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas.

Mājas sēkam deva ir 50 mg fipronila un 60 mg (S)-metoprēna, kas atbilst vienai 0,5 ml pipetei mājas sēkam. Minimālais lietošanas intervāls ir 4 nedēļas.

Ārstējot pret blusu un/vai ērcu invāziju, lēmumu par atkārtotas ārstēšanas nepieciešamību un biežumu ir jābalsta uz profesionālu ieteikumu un jāņem vērā vietējā epidemioloģiskā situācija un dzīvnieka dzīvesveids.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai

Lietošanas metode: skatīt uz ārējā iepakojuma.

10. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

11. Īpaši uzglabāšanas norādījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc Exp.

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo fipronils un (S)-metoprēns var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem. Nepiesārņot dīķus, tekošus ūdeņus vai grāvjus ar veterinārajām zālēm vai to tukšajiem iepakojumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

V/NRP/03/1587

Blisteris, kas satur 1 x 0,5 ml pipeti.

Kaste ar 1 blisteri, kas satur 3 x 0,5 ml pipetes.

Kaste ar 2 blisteriem, kas satur 3 x 0,5 ml pipetes.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi tika pārskatīta

03/2025

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29, avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 chemin du Calquet
31000 Toulouse
Francija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Vīne
AHRCVAnimalHealthPV.AT@boehringer-ingelheim.com
Tel: +371 67 240 011

17. Cita informācija

Farmakodinamiskās īpašības:

Fipronils nonāvē blusas 24 stundu laikā, ērces un utis – 48 stundu laikā pēc lietošanas.

Apvienotais markējuma un lietošanas instrukcijas teksts blisterim ar 1 pipeti

Tālāk minētā informācija tiek norādīta šīs kombinētās etiķetes un lietošanas instrukcijas iekšējā pusē.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Combo Cat 50,00 mg / 60,00 mg šķīdums pilināšanai uz ādas kaķiem un mājas seskiem

2. SASTĀVS

Aktīvās vielas:

Fipronils 50,00 mg

(S)-metoprēns 60,00 mg

Palīgvielas:

Butilēts hidroksianizols (E320) 0,10 mg

Butilēts hidroksitoluols (E321) 0,05 mg

Fipronil 10% w/v (S)-methoprene 12% w/v

[Ja ir pietiekami daudz vietas, pēc aktīvo vielu procentuālā daudzuma pievienos "w/v". Tur, kur trūkst vietas, blakus procentiem tiks pievienota zvaigznīte ar paskaidrojošu piezīmi blakus produkta nosaukumam.]

Caurspīdīgs, dzeltens šķīdums.

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

0,5 ml

4. MĒRĶSUGAS

Kaķi

Mājas seski

5. LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

Lietošanas indikācijas

Kaķiem:

Blusu invāzijas un jauktas blusu un ērcu un/vai utu invāzijas novēršanai.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai. Insekticīda iedarbība pret pieaugušo blusu jaunu invāziju saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai, kavējot olu (ovocīda darbība) veidošanos un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas, 6 nedēļas pēc aplikācijas.
- Ērcu (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm noturīga akaricīda iedarbība pret ērcēm saglabājas līdz 2 nedēļām (pamatojoties uz eksperimentāliem datiem).
- Utu (*Felicola subrostratus*) iznīcināšanai.

Šīs veterinārās zāles var lietot blusu izraisīta alerģiska dermatīta (BAD) ārstēšanas plāna ietvaros.

Mājas seskiem:

Blusu un jauktas blusu un ērcu invāzijas novēršanai.

- Blusu (*Ctenocephalides* spp.) iznīcināšanai. Insekticīda iedarbība pret pieaugušo blusu jaunu invāziju saglabājas 4 nedēļas. Blusu vairošanās novēršanai, kavējot olu (ovocīda darbība)

veidošanos un kāpuru un kūniņu (larvicīda darbība) attīstību no olām, kuras izdējušas pieaugušas blusas, 4 nedēļas pēc aplikācijas.

- Ērcu (*Ixodes ricinus*) iznīcināšanai. Šīm veterinārajām zālēm ir noturīga akaracīda iedarbība, kas pasargā pret ērcēm 4 nedēļas (pamatojoties uz eksperimentāliem datiem).

6. KONTRINDIKĀCIJAS

Kontrindikācijas

Tā kā nav veikti šo veterināro zāļu drošuma pētījumi, nelietot kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un/vai kaķēniem, kuri sver mazāk par 1 kg. Veterinārās zāles nelietot mājas seskiem līdz 6 mēnešu vecumam. Nelietot trušiem, jo ir novērotas šo veterināro zāļu blakusparādības un var pat iestāties nāve. Tā kā nav pētījumu, nav ieteicams lietot šīs veterinārās zāles citām sugām izņemot norādītās mērķa sugas.

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas saslimšanas, drudzis u.c.) un dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

7. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi

Nevajadzīga pretparazitāro līdzekļu lietošana vai lietošana citādi, nekā noteikts zāļu aprakstā, var palielināt rezistences izlases spiedienu un samazināt iedarbīgumu. Lēmumam par veterināro zāļu lietošanu ir jābūt balstītam uz katra atsevišķa dzīvnieka parazitū sugas un sloga apstiprinājumu vai invāzijas riska, pamatojoties uz tā epidemioloģiskajām iezīmēm.

Nav pieejami dati par mazgāšanas un šampūnu pielietošanas ietekmi uz šo veterināro zāļu iedarbīgumu kaķiem un mājas seskiem. Tomēr pamatojoties uz informāciju par iedarbīgumu suņiem, kas mazgāti ar šampūnu 2 dienas pēc veterināro zāļu aplikācijas, nav ieteicams mazgāt dzīvniekus 2 dienas pēc šo veterināro zāļu aplikācijas.

Atsevišķas ērces tomēr var piesūkties pēc ārstēšanas. Šādos gadījumos pie noteiktiem apstākļiem nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesanu.

Blusas no mājdzīvniekiem bieži iemitinās dzīvnieka grozā, guļvietā un regulārās uzturēšanās vietās, piemēram, paklājos un mīkstajās mēbelēs, kas masveida invāzijas gadījumā un kontroles pasākumu sākumā ir jāapstrādā ar piemērotiem insekticīdiem un regulāri jātīra ar putekļsūcēju.

Pārējie dzīvnieki, kas dzīvo tajā pašā mājstāvētnībā, arī ir jāapstrādā ar atbilstošu pretparazitāro līdzekli.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērķsugām:

Izvairīties no veterināro zāļu nokļūšanas dzīvnieka acīs.

Ir svarīgi pārliecināties, ka šīs veterinārās zāles tiek uzklātas vietā, kur dzīvnieki tās nevar nolaizīt, un nodrošināt, lai pēc apstrādes dzīvnieki viens otru nelaizītu.

Nav informācijas par šo veterināro zāļu toksicitāti kaķēniem, kas ir jaunāki par 8 nedēļām, kuru mātēm ir lietotas šīs veterinārās zāles. Šajā gadījumā jāievēro īpaša piesardzība.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles var izraisīt gļotādas, ādas un acu kairinājumu. Tādēļ jānovērš šo veterināro zāļu saskare ar mutes gļotādu, ādu un acīm.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret fipronilu vai (S)-metoprēnu, vai spirtu, jāizvairās no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Nepieļaut zāļu saskari ar pirkstiem. Ja tas ir noticis, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi veterināro zāļu nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Pēc veterināro zāļu aplicēšanas mazgāt rokas.

Apstrādātos dzīvniekus nedrīkst glaudīt līdz aplikācijas vieta ir izžuvusi, un neļaut bērniem rotaļāties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem, kamēr aplikācijas vieta nav nožuvusi. Tādēļ ieteicams dzīvniekus

apstrādāt ar veterinārajām zālēm nevis pa dienu, bet pievakarē un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.
Apstrādes laikā nesmēķēt, nedzert un neēst.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:
Skatīt sadaļu “Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai”.

Grūsnība un laktācija:

Kaķiem šīs veterinārās zāles drīkst lietot grūsnības laikā. Par lietošanu laktācijas laikā skatīt iepriekš.
Mājas seskiem lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana:

Nepārdozēt.

Novēroto blakusparādību risks pie pārdozēšanas var palielināties (skatīt “Blakusparādības”).

Kaķiem:

Drošuma pētījumos mērķa dzīvniekiem netika novērotas nevēlamas blakusparādības pieaugušiem kaķiem un 8 nedēļas veciem kaķēniem un vecākiem, kuri sver mazāk par 1 kg, lietojot vienu reizi mēnesī devā, kas piecas reizes pārsniedza ieteicamo devu, 6 mēnešus pēc kārtas.

Pēc aplikācijas var būt novērojama nieze.

Vienā vietā aplicējot pārāk daudz šķīduma, tas izraisīs apmatojuma salipšanu aplikācijas vietā. Ja tā notiek, salipums izzudīs 24 stundu laikā pēc aplikācijas.

Mājas seskiem:

Svara zudums novērots dažiem 6 mēnešus veciem un vecākiem mājas seskiem, kuri tika ārstēti vienreiz katrās divās nedēļās četras reizes ar devu, kas piecas reizes pārsniedza ieteicamo devu.

8. BLAKUSPARĀDĪBAS

Blakusparādības

Kaķi un mājas seski:

Ļoti reti (<1 dzīvniekam/10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):

Reakcijas aplikācijas vietā (ādas krāsas izmaiņas¹, alopecija¹, nieze¹, eritēma¹). Vispārēja nieze vai alopecija. Hiperaktivitāte², vemšana. Hiperestēzija³, depresija³, citi neiroloģiski simptomi³.

¹ Pārejošas.

² Ja notikusi zāļu ielaizīšana, var novērot īslaicīgu siekalošanos, galvenokārt palīgvielu dēļ.

³ Atgriezeniski.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam tirdzniecības atļaujas turētāja vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: <https://www.pvd.gov.lv/lv>.

9. DEVA KATRAI DZĪVNIEKU SUGAI, LIETOŠANAS VEIDS UN METODE

Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

Nepietiekamas devas lietošana var būt neefektīva un var veicināt rezistences attīstību.

Kaķiem:

Minimālā deva ir 5 mg/kg fipronila un 6 mg/kg (S)-metoprēna, kas atbilst vienai 0,5 ml pipetei kaķim.

Mājas seskiem:

Deva ir 50 mg fipronila un 60 mg (S)-metoprēna, kas atbilst viena 0,5 ml pipetei mājas seskam. Ārstējot blusu un/vai ērcu invāziju, lēmumu par atkārtotas ārstēšanas nepieciešamību un biežumu ir jābalsta uz profesionālu ieteikumu un jāņem vērā vietējā epidemioloģiskā situācija un dzīvnieka dzīvesveids.

10. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Ieteikumi pareizai lietošanai

- 1 - Izņemt pipeti no iepakojuma.
- 2 - Turēt pipeti vertikāli. Uzstīt pa pipetes šaurāko daļu, lai nodrošinātu, ka saturs atrodas pipetes paplašinātajā daļā. Nolauzt pipetes galu.
- 3 - Pašķirt dzīvnieka apmatojumu uz muguras starp kakla pamatni un lāpstiņām līdz redzama āda. Novietot pipetes galu uz ādas un saspiest pipeti vairākas reizes, lai iztukšotu tās saturu pilnībā un tieši uz ādas vienā punktā.

11. IEROBEŽOJUMU PERIODS

Ierobežojumu periods: Nav piemērojams.

12. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kastītes pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo fipronils un (S)-metoprēns var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem. Nepiesārņot dīķus, tekošus ūdeņus vai grāvjus ar veterinārajām zālēm vai to tukšajiem iepakojumiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi. Jautājjiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

14. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Veterināro zāļu klasifikācija

Bezrecepšu veterinārās zāles.

15. TIRDZniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

V/NRP/03/1587

Iepakojuma lielumi

Blisteris, kas satur 1 x 0,5 ml pipeti.

Kaste ar 1 blisteri, kas satur 3 x 0,5 ml pipetes.

Kaste ar 2 blisteriem, kas satur 3 x 0,5 ml pipetes.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

16. DATUMS, KAD ETIĶETE PĒDĒJO REIZI PĀRSKATĪTA

Datums, kad etiķete pēdējo reizi pārskatīta

03/2025

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē.

17. KONTAKTINFORMĀCIJA

Kontaktinformācija

Tirdzniecības atļaujas turētājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon, Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

4 chemin du Calquet

31000 Toulouse, Francija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Vīne

AHRCVAnimalHealthPV.AT@boehringer-ingelheim.com

Tel: +371 67 240 011

18. CITA INFORMĀCIJA

Cita informācija:

Farmakodinamiskās īpašības:

Fipronils nonāvē blusas 24 stundu laikā, ērces un utis – 48 stundu laikā pēc lietošanas.

19. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

20. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

21. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}