

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Emdofluxin 50 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES)

Chaque mL contient: 50 mg de flunixin (sous forme de flunixin méglumine)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

50 mL

100 mL

250 mL

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins, chevaux, porcins

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins : voie intramusculaire ou intraveineuse.

Chevaux : voie intraveineuse.

Porcins : voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins :

Viande et abats : 4 jours (voie intraveineuse).

31 jours (voie intramusculaire).

Lait : 24 heures (voie intraveineuse).

36 heures (voie intramusculaire).

Chevaux :

Viande et abats : 5 jours (voie intraveineuse).

Ne pas utiliser chez les juments produisant du lait destiné à la consommation humaine.

Porcins :

Viande et abats : 24 jours.

8. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mm/aaaa}

Après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

Après ouverture, utiliser avant...

9. PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka

14. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V567093

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Flacon (étiquette pour 100, 250 mL)

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Emdofluxin 50 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque mL contient: 50 mg de flunixine (sous forme de flunixine méglumine)

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins, chevaux, porcins

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Bovins : voie IM ou IV.

Chevaux : voie IV.

Porcins : voie IM.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins :

Viande et abats : 4 jours (voie intraveineuse).

31 jours (voie intramusculaire).

Lait : 24 heures (voie intraveineuse).

36 heures (voie intramusculaire).

Chevaux :

Viande et abats : 5 jours (voie intraveineuse).

Ne pas utiliser chez les juments produisant du lait destiné à la consommation humaine.

Porcins :

Viande et abats : 24 jours.

6. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mm/aaaa}

Après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

Après ouverture, utiliser avant...

7. PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS
PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Flacon** (étiquette pour 50 mL)**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Emdofluxin 50 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque ml contient 50 mg de flunixin (sous forme de flunixin méglumine)

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

Après ouverture, utiliser avant...