

PAKNINGSVEDLEGG

TERRAMYCIN VET. 20% pulver oksyttetracyklinhydroklorid

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Animal Health ApS, Øster Alle 48, DK-2100 København, Danmark

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia

2. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Terramycin vet. 20% pulver

3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF OG HJELPESTOFFER

1 g pulver inneholder:

Virkestoff: oksyttetracyklinhydroklorid 220 mg, tilsvarende 203,8 mg oksyttetracyklin.

Hjelpestoffer: vinsyre (E334), laktosemonohydrat.

4. INDIKASJONER

Behandling av infeksjoner forårsaket av mikroorganismer følsomme for oksyttetracyklin.

Kraftfôrfôring hos voksne drøvtyggere.

5. KONTRAINDIKASJONER

Voksne drøvtyggere må ikke behandles, bortsett fra ved kraftfôrfôring.

6. BIVIRKNINGER

Bivirkninger i mave-tarmkanalen kan forekomme.

Ved behandling i perioden når tennene mineraliseres kan en misfarging eller emaljeskade oppstå.

Ved moderat overdosering forventes ikke andre effekter enn ovenfor nevnte bivirkninger.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL

Kalv, lam, gris, hund, katt, fjørfe og pelsdyr.

8. DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEIER OG -MÅTE

En strøken måleskje inneholder 5 g pulver (1 g oksyttetracyklin).

Gris, lam, kalv, hund og katt:

Normal døgnsdose er 40 mg oksyttetracyklin per kg fordelt på 2 ganger.

Dette tilsvarer 2 g pulver per 10 kg kroppsvekt eller 1 måleskje per 25 kg.

Fjørfe:

50 mg per kg kroppsvekt, tilsvarende 1 måleskje per 20 kg kroppsvekt.

Pelsdyr:

50 mg per kg kroppsvekt.

Ved kraftfôrfôring hos drøvtyggere gis 5 - 10 g pulver (1-2 måleskjeer) per 100 kg kroppsvekt.

Pulveret gis i drikkevannet, melkeerstatning, eller blandes med fôret.

9. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Samtidig tilførsel av jern eller kalsium gir nedsatt absorpsjon av oksytetracyklin.

Forsiktighet ved behandling av dyr med nedsatt nyrefunksjon.

Akutt syke dyr har redusert vann- og fôrinntak. Dette kan innebære en risiko for underdosering.

Ved vannmedisinering bør kun medisineret drikkevann gis til dyrene har drukket opp dette.

10. TILBAKEHOLDESESTIDER

Slakt: 14 dogn.

Melk: 2 dogn.

Egg: 7 dogn.

11. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn

Oppbevares ved høyst 25° C.

Ferdigblandet oppløsning er holdbar i 24 timer i værelsestemperatur.

Hold beholderen tett lukket.

12. SPESIELLE ADVARSLER

Hendene bør vaskes etter kontakt med legemiddelet.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med overflødige legemidler. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

16.12.2021

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

15. YTTERLIGERE INFORMASJON

-