

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

{Schachtel mit 1 Durchstechflasche zu 6, 20, 50, 100 ml und Schachtel mit 10 Durchstechflaschen zu 6 ml}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acegon, 50 Mikrogramm/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

50 µg/ml Gonadorelin
(entspricht 52,5 µg Gonadorelin Acetat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

6 ml
20 ml
50 ml
100 ml
10 x 6 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh und Färse)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: Null Tage
Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach Anbrechen verwendbar bis _____

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Laboratorios SYVA S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V446373

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**{50-ml/100-ml-Durchstechflaschen}****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Acegon, 50 Mikrogramm/ml, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)50 µg/ml Gonadorelin
(entspricht 52,5 µg Gonadorelin Acetat)**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder (Kuh und Färsen)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis _____

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Laboratorios SYVA S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

{6 ml/20 ml}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Acegon

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

50 µg/ml Gonadorelin
(entspricht 52,5 µg Gonadorelin Acetat)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach Anbrechen verwendbar bis _____