

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/97/0549

**Oxytocin 10 IU/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām,
suņiem, kaķiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN
ADRESE, JA DAŽĀDI**

Alfasan International BV
P.O. Box 78
3440 AB Woerden
Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Oxytocin 10 IU/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem,
kaķiem**
Oxytocin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur:

Aktīvā viela:

Sintētiskais oksitocīns 10 IU

4. INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem, kaķiem:

Vāji izteiktas dzemdību kontrakcijas, dzemdes atonija, placentas aizture, dzemdes involūcijas stimulācija, dzemdes izkritums.

Cūkām:

Laktācijas traucējumi sivēnmātēm (mastīts, agalaktija).

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot agrās dzemdību stadijās, kamēr nav pilnībā atvēries dzemdes kakls, mehāniska aizsprostojuma gadījumā vai pie jebkādiem citiem apstākļiem, kas var radīt dzemdes plīsumu. Nelietot dzīvniekiem ar traucētu sirds vai nieru darbību.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pārlietu lielas devas var izraisīt koronāro artēriju spazmas un paaugstinātu asins spiedienu. Veterinārās zāles lietot piesardzīgi.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi (ķēves), liellopi (govis), cūkas (sivēnmātes), aitas, kazas, suņi (kuces), kaķi (kaķenes).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārām vai subkutānām injekcijām.

Deva:

Ķēvēm	4-5 ml
Govīm	4-6 ml
Sivēnmātēm	2-4 ml
Aitām un kazām	1-3 ml
Kucēm	0,5-1 ml
Kaķenēm	0,3-0,5 ml

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 12. punktu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt vēsā vietā, temperatūrā 8°C līdz 15°C.

Pēc atvēršanas: uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Adrenālīns mazina oksitocīna ietekmi uz dzemdi un piena dziedzeriem. Tādēļ, ja vēlama oksitocīna maksimāla iedarbība, dzīvnieku nedrīkst izbiedēt.

Oksitocīna darbību inhibē epinefrīns un norepinefrīns.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārlietu lielas devas var izraisīt koronāro artēriju spazmas un paaugstinātu asins spiedienu.

Veterinārās zāles lietot piesardzīgi.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO
ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

01/2022

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Tiešā iepakojuma veids un saturs :

50 ml dzeltena stikla (II tipa) flakoni. Vāciņš: brombutila gumijas aizbāznis, kas pārklāts ar alumīnija korķīti.