

Kenostart
3 mg/g Zitzentauchmittel, Lösung für Rinder (Milchkühe)

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN
UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICH IST**

CIDLINES NV
Water poortstraat 2
8900 Ieper
Belgium
Tel. +32 (0) 57 21 78 77
Fax. +32 (0) 57 21 78 79
Mail: info@cidlines.com

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Kenostart
3 mg/g Zitzentauchmittel, Lösung für Rinder (Milchkühe)

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Iod 3 mg/g

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zitzendesinfektion zur Unterstützung der Mastitisprophylaxe bei Rindern.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Iod oder einem der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Milchkühe)

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Das Arzneimittel ist eine gebrauchsfertige Zitzentauchlösung. Der Becher sollte mindestens 5 ml der Tauchlösung fassen. Tauchen Sie jede Zitze sofort nach dem Melken ein und stellen Sie sicher, dass die Zitze über dreiviertel ihrer Länge vollständig benetzt wird. Den Becher wenn nötig nachfüllen. Den Becher nach der Behandlung leeren und vor der Wiederverwendung reinigen. Das Arzneimittel ist als Zitzentauchmittel nach dem Melken vorgesehen und kann bis zu zweimal täglich angewendet werden.

Wenn sich Anzeichen einer Krankheit herausstellen oder bestehen bleiben, konsultieren Sie einen Tierarzt.

9. WARTEZEIT

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden

10. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel, aus Reich- und Sichtweite und Anblick der Kinder aufbewahren.

Mittel im verschlossenen Originalgebinde aufrecht stehend lagern.

Vor Frost schützen. Wenn das Mittel eingefroren ist, in einen warmen Raum verbringen, langsam auftauen lassen und vor der Anwendung sorgfältig schütteln.

Vor Licht schützen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 6 Monate.

Nach Ablauf dieser Frist sind im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels zu verwerfen.

Wenn das Behältnis zum ersten Mal angebrochen (geöffnet) wird, ist die

Verwendungshaltbarkeit zu beachten, die auf der Packungsbeilage angegeben ist, d.h. das

Datum, an dem das im Behältnis verbleibende Produkt zu entsorgen bzw. unwirksam ist. Dieses Entsorgungsdatum muss auf dem Etikett an dem dazu vorgesehenen Ort eingetragen werden.

11. BESONDERE WARNHINWEISE

Kann während der Trächtigkeit und Laktation verwendet werden.

Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Dieses Arzneimittel wird äußerlich angewendet und kaum resorbiert.

Kenostart sollte nicht gleichzeitig mit anderen Euterdesinfektions- oder Pflegemitteln angewendet werden sowie nicht mit anderen Produkten vermischt werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

- Nur zur äußerlichen Anwendung.

- Die Anwendung bei verletzten Zitzen kann den Wundheilungsprozess verzögern. Es wird empfohlen, die Behandlung bis zur Abheilung der Zitzen auszusetzen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender des Tierarzneimittels bei Tieren

- Den Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Spritzern in die Augen sofort mit viel klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

- Bei oraler Aufnahme viel Wasser trinken und so schnell wie möglich medizinischen Rat einholen.

- Fernhalten von Lebensmitteln und Tierfutter.

- Nach Gebrauch Hände waschen.
- Iod hat ein allergenes Potential. Personen mit bekannter Iodüberempfindlichkeit dürfen nicht mit dem Arzneimittel umgehen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichennationalen Vorschriften zu entsorgen.

KENOSTART darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

13. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

April 2011

15. WEITERE ANGABEN

Zitzentauchmittel,
zähflüssige, dunkelbraune Lösung

Zitzenbehandlung

1l, 5l, 10l, 20l, 60l, 200l. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht

Verwendbar bis: __/__/__

Rezeptfrei

BE-V296922