

ЛИСТОВКА:

ВИТАМИН В₁₂ разтвор за инжекции 500 γ
за преживни животни, прасета, свине, кучета и кокошки

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД,
ул. „Отец Паисий” №26,
2400 гр. Радомир,
България

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ВИТАМИН В₁₂ разтвор за инжекции 500 γ
VITAMIN B₁₂ solution for pro injection 500 γ

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция:
Cyanocobalamin 0.0005 g / 5 ml

Ексципиенти:
Sodium chloride
Water for injections

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При хиперхромни, макроцитерни и хипопластични анемии; при вторични анемии, вследствие на бременност, хелминтози, хемоспориоза; при интоксикации с тежки метали, бензолни продукти и хлорорганични инсектициди; за терапия и профилактика на дегенерация на черния дроб, при неврити, миелити, невралгии; при лъчева болест; при фуражни отравяния; за подобряване на храносмилането; като стимулиращо растежа средство при подрастващите животни; при закържавели животни.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите!

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не са известни.
Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинският продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Преживни животни, прасета, свине, кучета и кокошки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

Доза:

Средна доза 2 γ/kg:

за говеда и биволи - по 500 γ-0.001 g /5-10 ml от 0.01 % разтвор/;

за телета и малачета - по 150-200 γ /1.5-2 ml от 0.01 % разтвор/;

за овце, кози и свине - по 100-300 γ /1-3 ml от 0.01 % разтвор/;

за прасета - по 10-50 γ /0.5-2.5 ml от 0.002 % разтвор/;

за кучета - по 15-30 γ /0.75-1.5 ml от 0.002 % разтвор/;

за кокошки - по 2-5 γ /0.1-0.25 ml от 0.002 % разтвор/.

При тежки възпалителни заболявания на едрите животни може да се инжектират до 0.1-0.2 g, понякога 0.3-0.5 g, а на свинете до 500 γ с оглед за антиалергично и антифлогистично действие.

Начин на приложение

Интрамускулно и подкожно приложение.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ВИТАМИН В₁₂ разтвор за инжекции 500 γ точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Продуктът се прилага само от ветеринарни специалисти.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Не е приложимо.

Бременност и лактация:

Няма данни за неблагоприятни реакции.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма данни.

Основни несъвместимости:

Не са известни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

04/2023 г.

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР