

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rapidexon 2 mg/ml Injektionslösung  
[Darreichungsform-Piktogramm]

**2. WIRKSTOFF(E)**


Jeder ml enthält:  
Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

25 ml  
50 ml  
100 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferde, Rinder, Schweine, Hunde und Katzen.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pferde: Intravenöse, intramuskuläre, intraartikuläre, intrabursale oder lokale Anwendung.  
Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: Intramuskuläre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rind            Essbare Gewebe: 8 Tage  
                  Milch: 72 Stunden

Schwein      Essbare Gewebe: 2 Tage

Pferd         Essbare Gewebe: 8 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJ}

Haltbarkeit nach dem Anbrechen des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis...

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

[Firmenlogo]

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V315533

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Durchstechflasche 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rapidexon 2 mg/ml Injektionslösung

[Darreichungsform-Piktogramm]


**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg

**3. ZIELTIERART(EN)**

Pferde, Rinder, Schweine, Hunde und Katzen.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pferde: Intravenöse, intramuskuläre, intraartikuläre, intrabursale oder lokale Anwendung.

Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: Intramuskuläre Anwendung.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rind Essbare Gewebe: 8 Tage

Milch: 72 Stunden

Schwein Essbare Gewebe: 2 Tage

Pferd Essbare Gewebe: 8 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Verwendbar bis ...

Nach Anbrechen verwendbar bis...

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

[Firmenlogo]

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**


Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

25 / 50 ml Durchstechflasche

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rapidexon

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

2,0 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis...

[Firmenlogo]