

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Euthanimal 40%, 400 mg/ml solution for injection
Еутанимал 40%, 400 mg/ml инжекционен разтвор

2. Състав

Всеки ml съдържа

Активно вещество:

Sodium pentobarbital 400 mg (еквивалентно на 365 mg pentobarbital)

Помощни вещества:

Бензилов алкохол (E 1519)	20,0 mg
Етанол	80,0 mg
Понсо 4R (E 124)	0,02 mg

Червен бистър разтвор.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Говеда, коне, свине, кози, овце, кучета, котки, зайци, морски свинчета, мишки, плъхове, хамстери, кокошки, гълъби, патици, малки декоративни птици, змии, костенурки, гущери и жаби.

4. Показания за употреба

За евтаназия.

5. Противопоказания

Да не се използва за анестезия.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Интравенозното инжектиране на пентобарбитал има способността да предизвика индуциране на възбуда при някои животински видове и е необходимо да се приложи адекватна седация, ако се прецени за необходимо от ветеринарния лекар. Трябва да бъдат взети мерки за избягване на периваскуларно приложение (например, чрез интравенозен катетър).

Смъртта може да се забави, ако инжекцията се постави периваскуларно, интраперитонеално/интрацеломно или в органи/тъкани с нисък потенциал за резорбция. Барбитуратите могат да бъдат дразнещи при периваскуларно или други начини, различни от интравенозното приложение.

Проверявайте редовно, до 10 минути след приложението, за възстановяване на признаци на живот (дишане, сърдечна дейност, корнеален рефлекс). При клиничните изпитвания е установено, че това може да се наблюдава. Ако се проявят такива признаци на живот, се препоръчва да се повтори приложението, като се използва между 0,5 и 1 път предписаната доза.

За да се намали рискът от индуциране на възбуда, евтаназията трябва да се извършва в тиха зона. Установено е, че при прасета съществува пряка връзка между ограничаването на движенията и нивото на възбуда и безпокойство. Следователно, инжектирането на свине трябва да се извършва с възможно най-малко ограничаване на движенията.

Особено при коне и говеда, ветеринарният лекар трябва да обмисли премедикация с подходящ седатив, за да се предизвика дълбока седация преди евтаназията и се препоръчва да има готовност за алтернативен метод за евтаназия, ако стане необходимо.

Ако при птиците се използва интрацеломен път, инжектирането във въздушните торбички трябва да се избягва.

Интрацеломният път не се препоръчва при хелонии, тъй като времето до настъпване на смъртта може да се удължи.

При влечуги и земноводни трябва да се вземат подходящи мерки (напр. отстраняване на сърцевината), за да се гарантира пълната евтаназия, в противен случай мозъците им могат да преживеят продължителна аноксия и може да настъпи възстановяване след метаболизма на пентобарбитал.

Когато се извършва евтаназия на пойкилотермни животни, животното трябва да се поддържа при предпочитаната от него оптимална температура, в противен случай ефикасността на инжектирането ще бъде ненадеждно.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Трупове и продукти от животни, инжектирани с този ветеринарен лекарствен продукт не трябва никога да се включват в хранителната верига (виж т. “Карентни срокове”) и трябва да бъдат унищожени в съответствие с националното законодателство. Трупове или части от трупове на животни, евтанзирани с този ветеринарен лекарствен продукт, не трябва да служат за храна на други животни, поради риск от вторична интоксикация (виж т. “Карентни срокове”).

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Пентобарбиталът е силен хипнотик и седатив и по този начин е потенциално токсичен при хора. Пентобарбиталът причинява седация, индукция на сън и респираторна депресия. Може да бъде резорбиран системно през кожата и при поглъщане.

Този ветеринарен лекарствен продукт също така може да причини дразнене на окото и може да предизвика дразнене на кожата.

Избягвайте пряк контакт с кожата и очите, включително контакт на ръцете с очите и на ръцете с устата.

Трябва да се обърне особено внимание за да се избегне случайно самоинжектиране или инжектиране на лицето, което Ви асистира. Този ветеринарен лекарствен продукт трябва да се носи само в спринцовка с предпазител, за да се избегне случайно самоинжектиране. Носете предпазни ръкавици.

При случайно разливане върху кожата или в очите, те трябва незабавно да бъдат измити с обилно количество вода. При случайно поглъщане незабавно измийте устата. Ако има сериозен контакт с кожата или очите или при случайно поглъщане, или самоинжектиране, незабавно потърсете медицинска помощ, посочете отравяне с барбитурати и покажете листовката или етикета на продукта на лекаря. НЕ ШОФИРАЙТЕ, тъй като може да настъпи седация.

Не могат да се изключат ембриотоксични ефекти. Работете с ветеринарния лекарствен продукт изключително внимателно, особено жени в детеродна възраст.

Този ветеринарен лекарствен продукт може да предизвика реакции на свръхчувствителност поради наличието на пентобарбитал или бензилов алкохол. Хора с установена

свръхчувствителност към пентобарбитал трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Този ветеринарен лекарствен продукт е запалим, да се пази от източници на запалване. Да не се пуши.

Този ветеринарен лекарствен продукт трябва да се прилага само от ветеринарни лекари и само в присъствие на друг специалист, който може да оказва помощ при случайна експозиция. Инструктирайте специалиста, ако няма медицинско образование за рисковете на ветеринарния лекарствен продукт.

Колапсът настъпва 10 секунди след въвеждане на ветеринарния лекарствен продукт Поради това, ако в момента на прилагане на продукта животното стои изправено, операторът и стоящите в близост лица не трябва да стоят непосредствено до животното, а да спазват известно разстояние от него за да се избегне нараняване.

Информация за осъществяващия процедурата специалист в случай на експозиция:

Спешните мерки трябва да бъдат насочени към поддържане на дихателната и сърдечната дейности. При сериозни интоксикации трябва да се вземат мерки за ускорено елиминиране на барбитуратите. Не оставяйте пациента без надзор.

Концентрацията на пентобарбитал в този ветеринарен лекарствен продукт е такава, че случайното самоинжектиране или поглъщане на количества по-малки от 1 ml при възрастни хора, могат да имат сериозни ефекти върху ЦНС. Доза от натриев пентобарбитал от 1 g (еквивалентна на 2,5 ml от ветеринарния лекарствен продукт) се съобщава като фатална при хора. Лечението трябва да бъде поддържащо с подходяща интензивна терапия за поддържане на дишането.

Бременност:

Няма налични специфични данни.

Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Депресантите на ЦНС (наркотици, фенотиазини, антихистамини и т.н.) могат да увеличат ефекта на пентобарбитал.

Предозиране:

При случайно приложение на животно, което не е предназначено за евтаназия, са уместни мерки като изкуствено дишане, подаване на кислород и приложение на аналептици.

С оглед на активността на този ветеринарен лекарствен продукт, двойна доза не се препоръчва, тъй като няма да доведе до по-бърза или по-добра евтаназия.

Основни несъвместимости:

При липса на данни за съвместимост този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

7. Неблагоприятни реакции

При всички видове животни:

Чести (1 до 10 на 100 третирани животни):	Издаване на звуци Потрепвания
Редки (1 до 10 на 10 000 третирани животни):	Възбуда Неволни движения (на краката) Неволна дефекация;

	Неволно уриниране;
Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):	Конвулсии Хълцане Повръщане Агонално дишане (пръхтене) ¹
Неопределена честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)	Болка в мястото на инжектиране ²

¹ Едно или няколко дихателни движения след спирането на сърцето.

² Барбитурати могат да причинят дразнене, когато се прилагат по други пътища, освен чрез интравенозна инжекция.

Говеда:

Редки (1 до 10 на 10 000 третирани животни):	Агонално дишане (пръхтене) ¹
---	---

¹основно поради по-ниска доза.

Птици:

Много чести (повече от 1 на 10 третирани животни):	Тоничен мускулен спазъм Изправяне на перушината
---	--

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия или местния представител на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване:

<https://kvmp.bfsa.bg/index.php/bg/registers/veterinarnomedicinski-producty>

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Интравенозно приложение.

Интраперитонеално приложение.

Интракардиално приложение.

За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

За предпочитане този ветеринарен лекарствен продукт да се прилага чрез еднократна интравенозна инжекция.

При по-големи животни, се препоръчва употребата на предварително поставен интравенозен катетър.

При прилагане на ветеринарният лекарствен продукт по начин, различен от интравенозния, животните трябва да бъдат силно седатирани или в безсъзнание и да не показват никаква реакция на болкови стимули, с изключение на интраперитонеалното прилагане при плъхове и мишки. Интракардиалната инжекция е допустима само след предварителна дълбока седация или анестезия.

Използването на пентобарбитал интраперитонеално при неседирани плъхове и мишки е приемливо само когато са взети мерки за избягване на неправилно инжектиране, включително използването на подходящи размери на иглите (например 26G за мишки). За интраперитонеалните или интрацеломните пътища на приложение, се препоръчват по-високи дози, когато е възможно.

Ако до 2 минути не се стигне до сърдечен арест, трябва да се приложи втора доза, за предпочитане чрез бърза интравенозна инжекция или ако това не е възможно, чрез интракардиална инжекция.

Тъй като флаконът не може да бъде прободан повече от 20 пъти, потребителят трябва да избере най-подходящия размер на флакона.

Таблица, съдържаща информация за дозировката при всеки вид животни.

Видове животни	Начин на приложение	Дозировка
Говеда, коне, свине, кози, овце, кучета, котки	Интравенозно	Препоръчителната доза е 100 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.25 ml/kg).
Мишки	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиално	Минималната доза е 250 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.625 ml/kg), може да се използва до 1600 mg/kg т.м.
Плъхове	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиално	Минималната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg), може да се използва до 800 mg/kg т.м.
Зайци, хамстери, морски свинчета	Интравенозно Интраперитонеално Интракардиално	Препоръчителната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg).
Кокошки, гълъби, патици	Интравенозно Интрацеломно Интракардиално	Препоръчителната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg).
Малки декоративни птици	Интрацеломно	Препоръчителната доза е 1300 mg/kg (съответстваща на 3.25 ml/kg)
Змии	(Интравенозно) Интрацеломно Интракардиално	Препоръчителната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg). Интрацеломното или интракардиалното приложение трябва да бъдат първи избор.
Костенурки	Интравенозно Интрацеломно Интракардиално	Минималната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg), за интрацеломното приложение може да се използва до 1100 mg/kg т.м.
Гущери	Интравенозно Интрацеломно Интракардиално	Минималната доза е 400 mg/kg т.м. (съответстваща на 1 ml/kg), може да се използва до 800 mg/kg т.м.
Жаби	(Интравенозно) Интрацеломно Интракардиално	Минималната доза е 200 mg/kg т.м. (съответстваща на 0.5 ml/kg), може да се използва до 1100 mg/kg т.м. Интрацеломното или интракардиалното приложение трябва да бъдат първи избор.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

10. Карентни срокове

Не е приложимо.

Необходимо е да се вземат необходимите мерки за да се гарантира, че труповете и продукти от животни, инжектирани с този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъдат включвани в хранителната верига и не се използват за консумация от хора. Други животни не могат да ядат (части от) трупа, тъй като могат да бъдат изложени на смъртоносни дози пентобарбитал.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарен лекарствен продукт не изисква никакви специални условия за съхранение. Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета след срока на годност. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 28 дни.
Когато флаконът бъде пробит за първи път, датата, до която оставащият във флакона ветеринарен лекарствен продукт трябва да бъде изхвърлен, трябва да бъде попълнена на мястото оставено на етикета.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Този ветеринарен лекарствен продукт е опасен за хората и животните.
Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2352

1 флакон от 100 ml или 1 флакон от 250 ml, тип II стъклен флакон за инжекции със запушалка от бромобутилова гума и алуминиева капачка в картонена кутия.

12 флакона от 100 ml или 6 флакона от 250 ml, тип II стъклен флакон за инжекции със запушалка от бромобутилова гума и алуминиева капачка в полистиролова кутия.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

06/2025

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Нидерландия

Местни представители и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

"ВЕТ ПРО КОМЕРС" ООД
4004 Пловдив, България
ул. "Васил Левски" №258
тел.: +359 897 84 39 18
info@verco.bg

За всякаква информация относно този ветеринарен лекарствен продукт, моля, свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за търговия.

17. Допълнителна информация



Expired certificate

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV