

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се комбинира и/или разрежда Limoxin-100 с разтвори, съдържащи калциеви соли – това може да доведе до преципитация на кристалите.

Предозиране:

Предозирането може да доведе до бъбречна интоксикация.

Специални ограничения за употреба и специални условия за употреба

За приложение само от ветеринарен лекар.

Основни несъвместимости:

Комбинирането и/или разреждането на Limoxin-100 с разтвори, съдържащи калциеви соли, може да доведе до преципитация на кристалите.

7. Неблагоприятни реакции

Говеда, овце, кози и свине

Неустановена честота (не може да бъде определена от наличните данни)	Локални реакции в мястото на инжектиране ¹ Алергични реакции ²
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

¹ След интрамускулно приложение, изчезват за няколко дни.

² При животни с установени алергични реакции към тетрациклини

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар.

Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции / събития на притежателя на разрешението за търговия или неговия местен представител като използвате данните за контакт в края на тази листовка, или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За интрамускулно приложение.

Средна доза за всички видове животни, за които е предназначен продуктът:

5 – 10 мг/кг (2.5 – 5.0 мл на 50 кг телесна маса) дневно за 3 - 5 дни.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

За гарантиране на правилна дозировка телесната маса трябва да се определи възможно най-точно.

Препоръчително е използването на подходящо калибрирано измервателно оборудване.

10. Карентни срокове

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 18 дни.

Мляко: 96 часа (от 9-то издождане при крави, които се доят два пъти дневно).

Свине, кози и овце:

Месо и вътрешни органи: 15 дни.

Не се разрешава за употреба при лактиращи овце и кози, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 25 °С. Да се пази от светлина.
Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8 °С.
Да не се замразява.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.
Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 седмици.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар или фармацевт как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-2564

Стъклени флакони от 50, 100 и 250 ml.

Картонени кутии с 24 флакона от 50 ml.
Картонени кутии с 12 флакона от 100 ml.
Картонени кутии с 24 флакона от 250 ml.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

02/2025

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия :

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

Metaalweg 8

5804 CG, Venray,

The Netherlands

Tel: +31 885252211

E-mail: sales@interchemie.com

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

Interchemie werken “De Adelaar” Eesti, AS
14 Vanapere Tee, Püüsi, Viimsi ValdHarju county 74013,
Estonia
Tel: +372 6 005005
E-mail: coo@interchemie.com

Местни представители и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Република България
„Синхроген Фарма” ООД,
бул. „Христофор Колумб” 43
1592 София
Телефонен номер: +359 2 4949230
E-mail: info@synchrogen.eu

За всякаква информация относно този ветеринарен лекарствен продукт, моля, свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за търговия.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП