

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Malaseb, šampūnas šunims ir katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvieno ml sudėtis

veikliųjų medžiagų:

chlorheksidino digliukonatas 20 mg (atitinka 11,26 mg chlorheksidino);
mikonazolo nitratas 20 mg (atitinka 17,37 mg mikonazolo).

Pagalbinių medžiagų:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis	Kiekybinė sudėtis, jei ta informacija būtina siekiant tinkamai naudoti veterinarinį vaistą
Metilchloroizotiazolinonas	0,0075 mg
Metilizotiazolinonas	0,0025 mg
Natrio benzoatas	1,25 mg
Makrogolio laurilo eteris	
Kokamidopropilo betainas	
Dinatrio kokoamfodiacetatas	
Cetrimonio chloridas	
PEG-120 metilo gliukozės dioleatas	
Citrinų rūgšties monohidratas	
Vandenilio chlorido rūgštis	
Išgrynintas vanduo	

Skaidrus ar šiek tiek drumstas šviesiai geltonos ar šviesiai rudos spalvos skystis.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys ir katės.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šunims: esant seborėjiniam dermatitui, susijusiam su *Malassezia pachydermatis* ir *Staphylococcus intermedius*, gydyti.

Katėms: naudojant kartu su grizeofulvinu, kaip pagalbinę priemonę gydyti nuo dermatofitozės, sukeltos *Microsporum canis*.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

3.4. Specialieji įspėjimai

Šunims ir katėms

Norint išvengti infekcijos pasikartojimo, gyvūnų aplinkoje reikia taikyti atitinkamus kontrolės metodus (pvz., valyti ir dezinfekuoti šunides, guolius).

Katėms

Gydant nuo dermatofitozės, veterinarinį vaistą reikia naudoti tik kartu su grizeofulvinu.

Naudojant šampūną katėms *M. canis* iš pradžių gali padaugėti, kas nustatoma dermatofitų kultūras tiriant šukavimo metodais.

Klinikiniai ir eksperimentiniai tyrimai parodė, kad pilnai išvalyti užterštą *M. canis* aplinką arba sumažinti užterštumą galima veterinarinį vaistą naudojant du kartus per savaitę. Atliekant minėtus tyrimus visą gydymo laikotarpį nepertraukiamai buvo naudojamas ir grizeofulvinas ir, lyginant su atvejais, kai naudojamas tik grizeofulvinas, stebėtas ryškesnis klinikinis pagerėjimas ir aplinkos užterštumo sumažėjimas.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Veterinarinį vaistą reikia naudoti, atsižvelgiant į oficialius šalies ar regiono antimikrobinių medžiagų naudojimo nurodymus.

Skirta tik išoriniam naudojimui.

Atsitiktinai vaisto patekus į akis, būtina gerai išplauti jas vandeniu.

Negalima leisti gyvūnui laižyti savęs, kol jis prausiamas naudojant šampūną ir skalaujamas arba kol jo kailis neišdžiovinamas. Būtina pasirūpinti, kad prausiamas gyvūnas neįkvėptų veterinarinio vaisto arba kad jo nepatektų į nosį ar į burną.

Negalima leisti šuniukų ir kačiukų prie žندانčių patelių, kurioms naudotas vaistas, kol jų kailis neišdžiūvęs.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas chlorheksidinui, mikonazolui ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Šis veterinarinis vaistas gali dirginti akis. Būtina vengti sąlyčio su akimis. Atsitiktinai patekus į akis, reikia gerai išplauti jas vandeniu. Jei sudirginimas nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją.

Būtina vengti perdėto gyvūnų, kuriems naudotas vaistas, lietim ir glostymo iš karto po gydymo.

Kačių dermatofitoze gali užsikrėsti ir žmonės, todėl, apkerpant ir šampūnu prausiant užsikrėtusias kates, patartina mūvėti pirštines ir vilkėti darbužį ilgomis rankovėmis.

Siekiant išvengti ilgalaikio sąlyčio su šampūnu, naudojant šampūną katėms reikia švelniai nuplauti ir nusišluostyti rankas. Netrinti.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Šunys, katės

Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Naudojimo vietos eritema ^a , naudojimo vietos niežėjimas ^a Odos reakcija (niežėjimas, paraudimas)
---	--

^a Išskirtiniais atvejais šunims, kuriems nustatyta atopija, arba katėms, kurioms nustatyta alerginė odos liga.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba jo vietiniam atstovui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto kartu su grizeofulvinu nereikėtų naudoti katingoms katėms, nes vaikingumo laikotarpiu grizeofulvinas kontraindikuotinas.

Žr. 3.5. punktą.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudoti ant odos.

Šunys: paprastai prausti šampūnu reikia du kartus per savaitę, kol simptomai susilpnėja, po to – kas savaitę arba kiek būtina, kad padėtis išliktų valdoma.

Katės: prausti šampūnu reikia du kartus per savaitę, mažiausią veterinarinio gydytojo rekomenduotą laikotarpį ar kol šukuojant kailį nebus aptinkamos *M. canis* kultūros. Maksimali gydymo trukmė neturėtų viršyti 16 savaičių. Priklausomai nuo kailiuko tipo ir ilgio, prieš gydymą katės kailiuką gali tekti pakirpti.

Gyvūną reikia gerai sušlapinti švariu vandeniu, keliose vietose užpilti veterinarinio vaisto ir įtrinti į kailį. Šampūno kiekis turi būti toks, kad ant kailio ir odos pasirodytų putos. Būtina užtikrinti, kad šampūno patektų aplink snukį, po uodega ir tarp pirštų. Reikia leisti gyvūnui 10 minučių pastovėti, tada nuplauti švariu vandeniu ir palikti nudžiūti šiltoje aplinkoje, kurioje nėra skersvėjo.

Pavyzdžiui, 250 ml buteliuko užtenka panaudoti maždaug 8–16 kartų 15 kg svorio šuniui, 5–10 kartų 25 kg svorio šuniui arba 25 kartams katei, priklausomai nuo kailio tankumo.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Netaikytina.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytina.

3.12. Išlauka

Netaikytina.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QD01AC52.

4.2. Farmakodinamika

Chlorheksidino digliukonatas

Chlorheksidino digliukonatas (ATCvet klasifikacija – QD08AC02) yra bisbiguanidų klasės antimikrobinė medžiaga, veikianti prieš gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas. Jos tiek baktericidinis, tiek bakteriostatinis poveikis priklauso nuo naudojamos koncentracijos. Augimo slopinimas pasiekiamas tiesiogiai veikiant ATP-azę, taip sutrikdant energijos perdavimo mechanizmus. Baktericidinis chlorheksidino pasireiškia įvykus bakterijų ląstelių turinio koaguliacijai.

Chlorheksidino digliukonatas yra veterinariniame vaiste dėl savo aktyvumo prieš *Staphylococcus intermedius*. Tipinės MSK, nustatytos klinikiniuose *Staphylococcus intermedius* izoliatuose, yra 2 mg/l (2005). Apie *Staphylococcus intermedius* atsparumą chlorheksidinui nepranešta.

Mikonazolo nitratas

Mikonazolo nitratas (ATCvet klasifikacija – QD01AC02) yra priešgrybinis imidazolo darinys, pasižymintis poveikiu ir mielėms, pvz., *Malassezia pachydermatis*.

Jo tiek fungicidinis, tiek fungistatinis poveikis priklauso nuo naudojamos koncentracijos.

Mikonazolas slopina ergosterolio įjungimą į ląstelių membranas, taip padidindamas citotoksinio vandenilio peroksido koncentracijas grybo ląstelės sienelėje.

Mikonazolo nitratas yra veterinariniame vaiste dėl savo aktyvumo prieš *Malassezia pachydermatis*. Tipinės MSK, nustatytos klinikiniuose *Malassezia pachydermatis* izoliatuose, yra 0,5–4 mg/l (2003/5). Apie *Malassezia pachydermatis* atsparumą mikonazolui nepranešta.

Chlorheksidino ir mikonazolo derinys

In vitro tyrimai parodė sinergetinį chlorheksidino ir mikonazolo veikimą prieš *Microsporum canis*.

4.3. Farmakokinetika

Chlorheksidino digliukonatas

Didelės chlorheksidino digliukonato koncentracijos ant kailio ir odos pasiekiamos per 10 minučių nuo šampūno panaudojimo. Šios koncentracijos gerokai viršija MSK *Staphylococcus intermedius*. Prarijus chlorheksidino digliukonatas iš virškinimo trakto absorbuojamas menkai. Absorbcija per odą yra nedidelė arba medžiaga visai neabsorbuojama. Tiriant žmones nustatyta, kad praėjus 29 valandoms nuo naudojimo ant odos išlieka 26% medžiagos.

Mikonazolo nitratas

Didelės mikonazolo nitrato koncentracijos ant kailio ir odos pasiekiamos per 10 minučių nuo šampūno panaudojimo. Šios koncentracijos gerokai viršija MSK *Malassezia pachydermatis*.

Mikonazolo nitratas menkai absorbuojamas per odą ir iš virškinimo trakto.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 3 mėn.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Negalima šaldyti ar sušaldyti.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Polietileniniai buteliukai su užsukamais polipropileniniais dangteliais po 250 ml.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Dechra Veterinary Products A/S

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1912/001

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2009-12-25

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-05-29

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
ETIKETĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MALASEB šampūnas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekvieno ml sudėtis:
chlorheksidino digliukconatas 20mg (atitinka 11,26 mg chlorheksidino),
mikonazolo nitratas 20mg (atitinka 17,37 mg mikonazolo).

3. PAKUOTĖS DYDIS

250 ml

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunims ir katėms.

5. INDIKACIJA (-OS)

6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Naudoti ant odos.
Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

7. IŠLAUKA

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}
Atidarius sunaudoti per 3 mėn.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Negalima šaldyti ar sušaldyti.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“
--

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Dechra Veterinary Products A/S

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1912/001

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Malaseb, šampūnas šunims ir katėms

2. Sudėtis

Kiekvieno ml sudėtis:

veikliųjų medžiagų:

chlorheksidino digliukonato 20 mg (atitinka 11,26 mg chlorheksidino);
mikonazolo nitratas 20 mg (atitinka 17,37 mg mikonazolo).

Pagalbinių medžiagų:

metilchloroizotiazolinono 0,0075 mg,
metilizotiazolinono 0,0025 mg,
natrio benzoatas 1,25 mg.

Skaidrus ar šiek tiek drumstas šviesiai geltonos ar šviesiai rudos spalvos skystis.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys ir katės.

4. Naudojimo indikacijos

Šunims, esant seborėjiniam dermatitui, susijusiam su *Malassezia pachydermatis* ir *Staphylococcus intermedius*, gydyti.

Katėms, naudojant kartu su grizeofulvinu, kaip pagalbinę priemonę gydyti nuo dermatofitozės, sukeltos *Microsporum canis*.

5. Kontraindikacijos

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Katėms: gydant nuo dermatofitozės, veterinarinį vaistą reikia naudoti tik kartu su grizeofulvinu. Naudojant šampūną katėms *M. canis* iš pradžių gali padaugėti, kas nustatoma dermatofitų kultūras tiriant šukavimo metodais.

Klinikiniai ir eksperimentiniai tyrimai parodė, kad pilnai išvalyti užterštą *M. canis* aplinką arba sumažinti užterštumą galima veterinarinį vaistą naudojant du kartus per savaitę. Atliekant minėtus tyrimus visą gydymo laikotarpį nepertraukiamai buvo naudojamas ir grizeofulvinas ir lyginant su atvejais, kai naudojamas tik grizeofulvinas, stebėtas ryškesnis klinikinis pagerėjimas ir aplinkos užterštumo sumažėjimas.

Šunims ir katėms: norint išvengti infekcijos pasikartojimo, gyvūnų aplinkoje reikia taikyti atitinkamus kontrolės metodus (pvz., valyti ir dezinfekuoti šunides, guolius).

Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams
Veterinarinį vaistą reikia naudoti, atsižvelgiant į oficialius šalies ar regiono antimikrobinių medžiagų naudojimo nurodymus.

Skirta tik išoriniam naudojimui.

Atsitiktinai vaisto patekus į akis, būtina gerai išplauti jas vandeniu.

Negalima leisti gyvūnui laižyti savęs, kol jis prausiamas naudojant šampūną ir skalaujamas arba kol jo kailis neišdžiovinamas. Būtina pasirūpinti, kad prausiamas gyvūnas neįkvėptų veterinarinio vaisto arba kad jo nepatektų į nosį ar į burną.

Negalima leisti šuniukų ir kačiukų prie žندانčių patelių, kurioms naudotas vaistas, kol jų kailis neišdžiūvęs.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojančiams vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas chlorheksidinui, mikonazolui ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Šis veterinarinis vaistas gali dirginti akis. Būtina vengti sąlyčio su akimis. Atsitiktinai patekus į akis, reikia gerai išplauti jas vandeniu. Jei sudirginimas nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją.

Būtina vengti perdėto gyvūnų, kuriems naudotas vaistas, lietim ir glostymo iš karto po gydymo.

Kačių dermatofitoze gali užsikrėsti ir žmonės, todėl, apkerpant ir šampūnu prausiant užsikrėtusias kates, patartina mūvėti pirštines ir vilkėti darbužį ilgomis rankovėmis.

Siekiant išvengti ilgalaikio sąlyčio su šampūnu, naudojant šampūną katėms reikia švelniai nuplauti ir nusišluostyti rankas. Netrinti.

Vaikingumas ir laktacija

Veterinarinio vaisto kartu su grizeofulvinu nereikėtų naudoti katingoms katėms, nes vaikingumo laikotarpiu grizeofulvinas kontraindikuotinas.

Dar žr. skyrių „Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams“.

7. Nepageidaujamos reakcijos

Šunys, katės

Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Naudojimo vietos eritema ^a , naudojimo vietos niežėjimas ^a Odos reakcija (niežėjimas, paraudimas)
---	--

^a Išskirtiniais atvejais šunims, kuriems nustatyta atopija, arba katėms, kurioms nustatyta alerginė odos liga.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą.

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarinės gydytoją. Apie bet kokią nepageidaujamą reakciją taip pat galite pranešti registruotojui <arba registruotojo vietiniam atstovui> naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą: <https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>.

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Naudoti ant odos.

Šunys: paprastai prausti šampūnu reikia du kartus per savaitę, kol simptomai susilpnėja, po to – kas savaitę arba kiek būtina, kad padėtis išliktų valdoma.

Katės: prausti šampūnu reikia du kartus per savaitę, mažiausią veterinarinio gydytojo rekomenduotą laikotarpį ar kol šukuojant kailį nebus aptinkamos *M. canis* kultūros. Maksimali gydymo trukmė neturėtų viršyti 16 savaičių. Priklausomai nuo kailiuko tipo ir ilgio, prieš gydymą katės kailiuką gali tekti pakirpti.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Gyvūną reikia gerai sušlapinti švariu vandeniu, keliose vietose užpilti šampūno ir įtrinkti į kailį, ypač aplink snukį, po uodega ir tarp pirštų. **Šampūno kiekis turi būti toks, kad putotų. Reikia leisti gyvūnui 10 minučių pastovėti, tada nuplauti švariu vandeniu ir palikti nudžiūti šiltoje aplinkoje, kurioje nėra skersvėjo.** 250 ml buteliuko užtenka maždaug 8–16 kartų 15 kg svorio šuniui, 5–10 kartų 25 kg svorio šuniui arba 25 kartams katei, priklausomai nuo kailio tankumo.

10. Išlauka

Netaikytina.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Negalima šaldyti ar sušaldyti.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po „Exp.“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 3 mėn.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/09/1912/001

Pakuotės dydis: 250 ml

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2025-05-29

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas:

Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Danija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Genera d.d.
Svetonedeljska cesta 2
Kalinovica
10436 Rakov Potok
Kroatija

Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją:

UAB Dimedium Lietuva
Islandijos pl. 217-13
49165 Kaunas
Lietuva
+370 615 64241

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

17. Kita informacija

Malaseb šampūnas yra gaminamas pagal licenciją, išduotą „Dermcare Vet“ (Australija), prekinio pavadinimo „Malaseb“ savininko