

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lidor 20 mg/ml Injektionslösung

Lidocain

2. WIRKSTOFF(E)

Lidocain 20 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

5 x 50 ml

5 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Hund, Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur subkutanen, intraartikulären, (intra-)okulären, perineuralen und epiduralen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferd

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 3 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“
--

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

VetViva Richter (logo)

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Zul.-Nr.: 838227

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

100 ml, 250 ml Klarglasflasche Typ-II (Ph.Eur.) mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumbördelkappe.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lidor 20 mg/ml Injektionslösung

Lidocain

2. WIRKSTOFF(E)

Lidocain 20 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Hund, Katze

4. ARTEN DER ANWENDUNG

s.c., intraartikulär, (intra-)okulär, perineural, epidural

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferd

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 3 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach erstmaligem Öffnen/Anbruch der Primärverpackung nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VetViva Richter (logo)

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

100 ml

250 ml

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

50 ml Klarglasflasche Typ-II (Ph.Eur.) mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumbördelkappe.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lidor



Pferd, Hund, Katze

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Lidocain 20 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

50 ml

VetViva Richter (logo)