

B. PACKUNGSBEILAGE

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Registrierungsinhaber: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.
Hersteller: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Tricho Plus®

3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Pro Beutel: Ronidazole 200 mg-Monokaliumhydrogeniumfosfaat - Lactose q.s. ad 4 g.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Behandlung von Trichomonosis und Spiro-nucleus-Infektionen (Hexamitiasis) bei Tauben, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Behandlung von Trichomonosis, Cochlosomosis und Giardiosis bei Ziervögeln die nicht der Gewinnung von lebensmitteln dienen.

5. GEGENANZEIGEN

Das Produkt nicht zu verwenden bei Tauben und Ziervögeln die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine.

TRICHO PLUS ist nicht toxisch für junge Tauben oder Ziervögel.

TRICHO PLUS kann gefahrlos während der Zucht verabreicht werden.

7. ZIELTIERART(EN)

Tauben und Ziervögel, die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

10 mg/kg, orale Verabreichung.

Tauben

1 Beutel TRICHO PLUS auflösen in 2 Litern Trinkwasser.

Diese Auflösung ist ausreichend für die Behandlung von ungefähr 40 Tauben.

Die Aufnahme von Trinkwasser ohne TRICHO PLUS sollte während der Behandlung vermieden werden.

Das Trinkwasser mit TRICHO PLUS sollte täglich erneuert werden.

Die durchschnittliche Behandlungsdauer von Trichomonosis beträgt 5 Tage, von Spiro-nucleus-Infektionen 7 bis 10 Tage.

Bei schwererer Erkrankung ist es ratsam, die Behandlungsdauer um 5 Tage zu verlängern.

Während der Flugsaison verabreicht man 2 Tage lang 1 Beutel TRICHO PLUS in 2 Litern Trinkwasser und wiederholt man diese Behandlung nach 2 Wochen.

Es ist ratsam, vor und nach der Flugsaison und während des Brütens im Winter 1 Beutel TRICHO PLUS in 2 Litern Trinkwasser 5 Tage lang zu verabreichen.

Ziervögel

1 Beutel TRICHO PLUS auflösen in 4 Litern Trinkwasser. Diese Auflösung ist ausreichend für die Behandlung von ungefähr 80 Ziervögel. Das Trinkwasser mit TRICHO PLUS sollte täglich erneuert werden. Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt 5 tage. Bei Cochlosomosis ist eine zweite Behandlungsperiode zwei Tagen nach die erste Behandlungsperiode anzubefehlen. Bei schwererer Erkrankung ist es ratsam die behandlungsdauer mit 5 Tage zu verlängern.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Oral via Trinkwasser. 1 Beutel TRICHO PLUS auflösen in 2 Litern Trinkwasser.

10. WARTEZEIT

Nur zu verwenden bei Tauben und Ziervögel die nicht der Gewinnung von Lebensmitteln dienen und Ziervögeln.

Der Verzehr von Tauben und Ziervögel behandelt mit TRICHO PLUS kann Probleme für die Gesundheit des Konsumenten verursachen.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bei Zimmertemperatur lagern (15 - 25°C).

12. BESONDERE WARNHINWEISE**i) Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei den für eine Behandlung geeigneten Tieren**

Bei Infektion alle Tauben und Ziervögel gleichzeitig behandeln.

Die Trinkgefäße gut säubern um Reinfektion zu vermeiden.

Der Verzehr von Tauben behandelt mit TRICHO PLUS kann Probleme für die Gesundheit des Konsumenten verursachen.

ii) Spezielle Vorsorgemaßnahmen, die von demjenigen zu ergreifen sind, der das Heilmittel den Tieren verabreicht

Keine.

iii) Sonstige Vorsorgemaßnahmen

Keine.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Man soll die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen nehmen, so dass nicht-angewendete-Produkten nicht in die Umwelt hinkommen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

02/2012

15. WEITERE ANGABEN

Tierärztliche Verwendung

Rezeptpflichtig

BE-V149974