

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**  
(Unter Druck stehende 200-ml Spraydose aus Aluminium)

Engemycin Spray, 25 mg/ml, Hautspray, Suspension für Rinder, Schafe und Schweine

**1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, die Niederlande  
vertreten durch MSD Animal Health GmbH, Lynx Binnenhof 5, 1200 Brüssel

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Intervet Productions S.r.l., Via Nettunense, Km 20,300, 04011 Aprilia (LT), Italien

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Engemycin Spray, 25 mg/ml

Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension für Rinder, Schafe und Schweine

Oxytetracyclinhydrochlorid

**3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Jede ml enthält:

Wirkstoff:

Oxytetracyclinhydrochlorid	25,00 mg
(entsprechend Oxytetracyclin	23,15 mg)

Sonstige Bestandteile:

Patentblau V (E131) als Farbstoff	1,25 mg
-----------------------------------	---------

**4. DARREICHUNGSFORM**

Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension.

Grün bis grünblaue Suspension.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

Zur Behandlung folgender Infektionen, die bei Rindern, Schafen und Schweinen mit Oxytetracyclin-empfindlichen Erregern in Verbindung stehen oder durch diese verursacht werden:

- Behandlung von Klaueninfektionen verursacht insbesondere durch: *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum* und andere *Fusobacterium* spp. sowie *Bacteroides* spp.
- Unterstützende Behandlung von oberflächlichen Wundinfektionen nach Operationen oder Verletzungen wie Schwanzverbiss beim Schwein, Schrammen und Abschürfungen.

## 6. GEGENANZEIGEN

Nicht zur Behandlung von Zitzen verwenden, um zu vermeiden, dass das Tierarzneimittel in die Milch gelangt.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Oxytetracyclin oder einem der sonstigen Bestandteile.

## 7. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen insbesondere solche, die nicht auf der Spraydose aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

## 8. ZIELTIERARTEN

Rinder, Schafe und Schweine.

## 9. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Nur für topische Anwendung.

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spraydose kann aufrecht oder umgedreht verwendet werden. Vor Anwendung die zu behandelnde Partie gründlich reinigen. Das Tierarzneimittel 1-2 Sekunden aus einem Abstand von 15-20 cm versprühen bis die behandelte Stelle eine einheitliche Farbe aufweist. Die Behandlung alle 12 Stunden abhängig vom Heilungsprozess über 1 bis 3 Tage wiederholen.

## 10. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Um bei Klauenerkrankungen optimale Ergebnisse zu erzielen, werden folgende Massnahmen empfohlen:

- die Fußgegend vollständig reinigen und Fremdmaterial, Exsudat und nekrotisches Gewebe entfernen
- nach jeder Behandlung die Tiere 12 Stunden auf trockenem Untergrund halten.

## 11. WARTEZEITE

### **Rinder, Schafe:**

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

### **Schwein:**

Essbare Gewebe: Null Tage.

Farbige Areale der Haut von Schweinen müssen vor Verwendung des übrigen Tierkörpers für den menschlichen Verzehr entfernt werden.

## 12. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Außer Sicht- Reichweite von Kindern aufbewahren.

Druckbehälter: vor Sonnenlicht schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Von

Zündquellen fern halten. Nicht rauchen. Nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

### **13. BESONDERE WARNHINWEISE**

Nur für topische Anwendung.

Tiere sollten in gut belüfteter Umgebung behandelt werden.

Nicht in das nähere Umfeld der Augen oder in die Augen der Tiere sprühen.

Der Einsatz des Produktes sollte auf einer Empfindlichkeitsprüfung an aus dem Tier isolierten Bakterien basiert werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollte die Therapie basiert werden auf die lokale (regionale, auf betriebsebene) epidemiologischen Informationen bezüglich die Empfindlichkeit der Zielbakterie.

Aus der Anwendung dieses Tierarzneimittels während der Trächtigkeit und Laktation sind keine nachteiligen Effekte bekannt.

Wegen der Gefahr der Sensibilisierung und Kontaktdermatitis sollte der Benutzer Hautkontakt vermeiden.

Tragen Sie geeignete, undurchlässige Handschuhe bei der Handhabung des Produktes.

Wegen der Gefahr der Augenreizung ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

Schützen Sie die Augen und das Gesicht.

Nicht in eine offene Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen.

Das Behältnis auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen.

Wenden Sie das Produkt im Freien oder in einem gut belüfteten Raum an.

Waschen Sie nach dem Gebrauch die Hände.

Während der Anwendung des Produktes nicht Essen oder Rauchen.

Bei unbeabsichtigter oraler Aufnahme oder Kontakt mit den Augen umgehend medizinische Beratung aufsuchen und dem Arzt das Etikett zeigen.

### **14. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den lokalen Vorschriften zu entsorgen.

### **15. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

September 2014

### **16. WEITERE ANGABEN**

Die Packungsgröße ist ein Behältnis mit 200 ml.

### **17. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nur für Tiere – verschreibungspflichtig.

**18. ZULASSUNGSNUMMER**

BE-V356307

**19. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot:

**20. VERFALLDATUM**

EXP.: