

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****HDPE Flaschen mit 150 g oder 1,5 kg (DEM BEHÄLTNIS)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Lincocin 40%**, 400 mg/g Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser**2. WIRKSTOFF(E)**

1 g Pulver enthält 400 mg Lincomycin (als Lincomycinhydrochlorid)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)150 g
1,5 kg**4. ZIELTIERART(EN)**

Schweine und Hühner

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung im Trinkwasser.

7. WARTEZEITEN**Wartezeit:**Schweine: Essbare Gewebe: 1 Tag.Hühner: Essbare Gewebe: 5 Tage.

Zu keinem Zeitpunkt bei Tieren anwenden, deren Eier für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind.>

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

Nach Verdünnen oder Rekonstituierengemäß den Anweisungen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V151331

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}