

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

ДОГ ЕКЗЕМА

DOG ECZEMA

Емулсия за кожа при кучета и котки

2. Състав

В 100 ml се съдържат:

Активни вещества:

Neomycin sulfate	500 000 IU
Prednisolone	100 mg
Precipitated sulfur	500 mg
Zinc oxide	3.0 g

Помощни вещества:

Methyl parahydroxybenzoate	300 mg
Polysorbate 20	
Sorbitan monolaurate	
Propylene glycol	

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Кучета и котки.

4. Показания за употреба

Ветеринарният лекарствен продукт е предназначен за лечение на кожни заболявания – алергични дерматити, рани през I-ва фаза, изгаряния, пиотравматичен дерматит, импетиго при кучето, акне и при повърхностни пиодермии на кожните гънки (лицева, устна, скротална и вулварна).

5. Противопоказания

Да не се използва при кожни язви.

6. Специални предупреждения

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да не се яде, пие и пуши по време на работа.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

7. Неблагоприятни реакции

Кучета и котки:

Неопределена честота (не може да се определи от наличните данни):	Кожна атрофия ¹
---	----------------------------

¹ При продължително приложение (месеци) продуктът може да предизвика кожна атрофия. Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и

такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Приложение върху кожата.

Кожата на заболялия участък предварително се почиства и застригва, ако е необходимо се извършва предварителна хирургическа обработка, след което с помощта на тампон внимателно се втрива два пъти дневно за период от 5 до 14 дни.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Разклати добре преди употреба!

10. Карентни срокове

Не е приложимо.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

№ 0022-2609

Пластмасови флакони от 50 ml и 100 ml, затварящи се с винтови пластмасови капачки.

Пластмасови флакони от 50 ml и 100 ml с дозираща помпа, поставени в единична картонена кутия.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

03/2024

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул.”Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР