

BIPACKSEDEL

Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tabletter för stora hundar

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea
Co. Galway
Irland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tabletter för stora hundar

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 tablett med fläsksmak innehåller 175 mg prazikvantel, 504 mg pyrantelmonat (motsvarande 175 mg pyrantel) och 525 mg febantel.

En gul avlång tablett med brytskåra på båda sidorna.
Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Strantel vet är ett avmaskningsmedel som skall användas då hunden samtidigt är angripen av rundmask och bandmask. Dessutom som förebyggande avmaskning av hundar mot rävens dvärgbandmask (*Echinococcus multilocularis*) där samtidig infektion med rundmask antas. (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, men har även konstaterats i Danmark och Sverige).

Vuxna hundar: Behandling av blandinfektioner orsakade av rundmaskar (nematoder) och bandmaskar (cestoder) av följande arter:

Nematoder:

Askarider: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (vuxna och sena omogna stadier).

Hakmaskar: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (vuxna).

Piskmaskar: *Trichuris vulpis* (vuxna).

Cestoder:

Bandmaskar: *Echinococcus* spp. (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia* sp. (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*), *Dipylidium caninum* (vuxna och omogna stadier).

5. KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas samtidigt med piperazinföreningar, då detta kan motverka effekten mot mask av pyrantel och piperazin.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot något hjälpämne.

6. BIVERKNINGAR

I mycket sällsynta fall har störningar i mag-tarmkanalen (diarré, kräkningar) observerats. Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

7. DJURSLAG

Hund

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Endast för användning via munnen.

De rekommenderade doserna är: 15 mg/kg kroppsvikt febantel, 5 mg/kg pyrantel (motsvarande 14,4 mg/kg pyranterlembonat) och 5 mg/kg prazikvantel som en engångsdos.

Detta motsvarar 1 tablett Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar per 35 kg kroppsvikt.

Hundar som väger mer än 35 kg ges 1 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar samt en tillräcklig mängd Strantel vet tabletter motsvarande 1 tablett per 10 kg kroppsvikt.

För hundar cirka 17,5 kg ges en halv Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar.

Veterinärens dosering skall alltid följas om sådan finns

Tabletterna kan ges direkt till hunden eller gömmas i maten. Avhållsamhet från föda behövs varken före eller efter behandlingen.

Doseringstabell:

Kroppsvikt (kg)	Tabletter
Cirka 17,5	½ Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar
31-35	1 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar
36-40	1 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar och ½ Strantel vet tablett
41-45	1 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar och 1 Strantel vet tablett
46-50	1 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar och 1½ Strantel vet tablett
51-55	1 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar och 2 Strantel vet tabletter
56-60	1 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett för stora hundar och 2½ Strantel vet tabletter
61-65	1 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tablett

	för stora hundar och 3 Strantel vet tabletter
66-70	2 Strantel vet 525 mg/504 mg/175 mg tabletter för stora hundar

Vid risk för att maskangreppet återkommer bör en veterinär rådfrågas gällande behovet av ny behandling och hur ofta behandling bör ges.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Djurets kroppsvikt bör fastställas så exakt som möjligt för att garantera att rätt dos ges.

Hållbarhet för delade tabletter: 14 dagar.

10. KARENSTID

Ej relevant

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet för delade tabletter: 14 dagar.

Varje gång en oanvänd tablethalva sparas ska den läggas tillbaka i det öppna blisterutrymmet och blistret ska läggas tillbaka i ytterkartongen.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Får inte användas samtidigt med piperazinföreningar, då detta kan motverka effekten mot mask av pyrantel och piperazin.

Samtidig användning av andra läkemedel med antikolinerg effekt, till exempel läkemedel innehållande foxim ska undvikas eftersom det kan leda till förgiftning. Foxim används mot utvärtes parasiter. Om du är osäker, rådgör med veterinär eller apotekspersonal om din hund använder andra läkemedel.

Bandmaskangrepp återkommer med säkerhet om inte mellanvärdarna, t.ex. loppor, möss, hålls under kontroll.

Bandmaskangrepp är osannolikt hos valpar yngre än 6 veckor.

Fosterskadande effekter som satts i samband med höga doser av febantel har rapporterats i får och råttor. Inga studier har utförts på hund under tidig dräktighet. Användningen av läkemedlet under dräktighet bör följa den ansvariga veterinärens bedömning av risk och nytta. Användningen av läkemedlet för behandling av hundar under de fyra första veckorna av dräktigheten rekommenderas inte. Den rekommenderade dosen får inte överskridas vid behandling av dräktiga tikar.

Försiktighet bör iaktas för att undvika följande användning eftersom den ökar risken för resistensutveckling och i slutänden kan leda till ineffektiv behandling:

- Alltför frekvent och återkommande användning av avmaskningsmedel från samma klass (sort) under lång tid.
- Underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikt eller felaktig administrering av läkemedlet.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etikett.

Av hygienskal bör personer som ger tabletterna direkt till hunden eller som tillsätter dem i hundens mat tvätta sina händer efter detta.
För djur.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2017-07-20

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Receptfria: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Receptbelagda: 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 eller 1000 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.