

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Clavobay Schmackhafte Tabletten 500 mg für Hunde****2. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Clavobay 500 mg Schmackhafte Tabletten für Hunde, zur orale Verabreichung an Hunde: jede Tablette enthält 400 mg Amoxicillin (als Amoxicillin-Trihydrat), 100 mg Clavulansäure (als Kaliumclavulanat), und 2,45 mg Azorubine Lack (E122).

3. DARREICHUNGSFORM

Tabletten

Die Tablette kann in gleiche Hälften geteilt werden.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10/20/25/100 Tabletten

5. ZIELTIERART(EN)

Hunde

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Für die Behandlung der folgenden Infektionen, verursacht durch beta-Lactamase-produzierende Stämme von Bakterien empfindlich für Amoxicillin in Kombination mit Clavulansäure:

- Hautinfektionen (einschließlich oberflächliche und tiefe Pyodermien) verursacht durch empfindliche *Staphylokokken*.
- Harnwegsinfektionen verursacht durch empfindliche *Staphylokokken* oder *Escherichia coli*.
- Infektionen der Atemwege verursacht durch empfindliche *Staphylokokken*.
- Enteritis verursacht durch empfindliche *Escherichia coli*.

Es wird empfohlen, verwendbare Tests für Empfindlichkeit durchzuführen wenn man die Behandlung einleitet. Die Behandlung sollte nur fortgesetzt werden, wenn die Empfindlichkeit der Kombination bewiesen ist.

7. ART DER ANWENDUNG

Um eine korrekte Dosierung sicherzustellen, sollte das Körpergewicht so genau wie möglich bestimmt werden, um eine Unterdosierung zu vermeiden.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Arzneimittel zur oralen Verabreichung. Die Dosierung beträgt 12,5 mg kombinierte Wirkstoffe / kg Körpergewicht zweimal täglich.

Die Tabletten können zerkleinert werden und hinzugefügt zu ein wenig Nahrung.

Die folgende Tabelle ist als Leitfaden für die Abgabe Clavobay Schmackhafte Tabletten mit der Standard-Dosis von 12,5 mg / kg zweimal täglich bestimmt.

Körpergewicht (kg)	Anzahl Tabletten (500 mg) pro Dosis zweimal täglich
20 kg	½
40 kg	1
60 kg	1½
80 kg	2

Dauer der Therapie:

Routinefälle aller Indikationen: die Mehrheit der Fälle reagieren auf zwischen 5 und 7 Tage Therapie.

Chronische oder refraktäre Fälle: in solchen Fällen, in denen beträchtliche Gewebeschaden vorliegen, kann eine längere Therapie erforderlich sein, um genügend Zeit zur Heilung geschädigten Gewebes zu gewähren.

8. WARTEZEIT

Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Nicht anwenden bei Tieren mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Penicillin oder anderen Substanzen der beta-Lactam-Gruppe.

Nicht anwenden bei Kaninchen, Meerschweinchen, Hamstern oder Wüstenrennmäusen.

Nicht anwenden bei Tieren mit schweren Funktionsstörungen der Niere, die von Anuria oder von Oligurie begleitet werden.

Nicht anwenden bei bekannten Resistenzen gegen die Wirkstoffkombination.

Nicht anwenden bei Pferden und Wiederkäuern.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender

Penicilline und Cephalosporine können Überempfindlichkeiten (Allergien) nach Injektion, Inhalation, Einnahme oder Hautkontakt verursachen. Überempfindlichkeit gegenüber Penicillinen kann zu einer Kreuzreaktion gegenüber Cephalosporinen und umgekehrt führen. Allergische Reaktionen gegenüber diesen Stoffen können gelegentlich schwerwiegend sein.

Verwenden Sie dieses Produkt nur mit größter Sorgfalt um Kontakt zu vermeiden, und unter Beachtung aller empfohlenen Sicherheitshinweise.

Sollten nach Kontakt mit dem Präparat Symptome wie Hautausschlag auftreten, sollten Sie einen Arzt zu Rate ziehen und dem Arzt diesen Warnhinweis vorlegen. Symptome wie Anschwellen des Gesichts, der Lippen oder Augenlider oder Atemnot sind ernst zu nehmen und bedürfen einer sofortigen ärztlichen Versorgung.

Nach der Anwendung Hände waschen.

10. VERFALLDATUM

EXP:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Trocken lagern. Halbierte Tabletten sollten in den Blister zurückgesteckt werden.

Die Blisterpackung in der Umverpackung aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "NUR FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere - Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irland

16. ZULASSUNGSNUMMER

BE-V361943

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot:

WEITERE INFORMATIONEN

Amoxicillin ist ein Breitspektrum-Antibiotikum wirksam gegen ein breites Spektrum von Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien. Jedoch produzieren viele klinisch wichtigen Bakterien beta-Lactamase-Enzyme, die diese Antibiotika zerstören. Clavulansäure inaktiviert diese Enzyme, und macht die Organismen empfindlich für Amoxicillin. Clavobay Schmackhafte Tabletten sind sicher bei Gebrauch während Trächtigkeit und Laktation. Studien an Labortieren haben keinen Nachweis für teratogene Wirkungen erbracht. Eine Anwendung sollte nur nach einer Nutzen-Risiko-Abwägung durch den verantwortlichen Tierarzt erfolgen.

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**Blister****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Clavobay Schmackhafte Tabletten 500 mg Für Hunde

2. ZULASSUNGSINHABER

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

3. VERFALLDATUM

EXP:

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot:

5. VERMERK "NUR FÜR TIERE"

Für Tiere.
Nicht über 25°C lagern.