

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MASTICEN SECADO, intramaminė suspensija

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienkartiniame 8 g švirkšte yra:

veikliosios medžiagos:

kloksacilino (benzantino) 1 000 mg;

pagalbinių medžiagų:

aliuminio monostearato 120 mg,
žemės riešutų aliejaus iki 8 g.

3. VAISTO FORMA

Intramaminė suspensija.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Karvės, avys ir ožkos.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Karvėms, avims ir ožkoms, užtrūkimo metu sergančioms mastitu, kurio sukėlėjai jautrūs kloksacilinui, gydyti ir profilaktiškai.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti gyvuliams, padidėjus jautrumui penicilinams.

Gyvuliams, padidėjus jautrumui cefalosporinams, vaistą reikia naudoti apdairiai.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Prieš naudojimą tešmens ketvirtį reikia nuplauti antiseptiniu tirpalu. Sušvirkštus vaistą, tešmenį reikia pamasažuoti, kad vaistas geriau pasiskirstytų.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nėra.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Negalima naudoti patelėms laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti kartu su bakteriostatiniais antibiotikais.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Karvėms į pažeistą tešmens ketvirtį reikia sušvirkšti vieno švirkšto turinį, avims ir ožkoms reikia švirkšti 0,5 švirkšto turinio.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavimas sunkiai įmanomas.

4.11. Išlauka

Jei vaistas švirkštas patelėms likus ne mažiau kaip 28 d. iki vaikavimosi, pienui ir skerdienai – 0 parų. Jei užtrūkimo periodas truko trumpiau kaip 4 sav., pieną reikia ištirti dėl antibiotikų likučių.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: intramaminio naudojimo antibakterinės medžiagos, pusiau sintetiniai penicilinai. ATCvet kodas: QJ51CF02.

Kloksacilinas yra β-laktaminis antibiotikas, pusiau sintetinė penicilino druska. Jis veikia baktericidiškai, o veikimo spektras panašus į meticilino. Slopindamas transpeptidazes ir karboksipeptidazes, kloksacilinas sutrikdo bakterijų sienelės sintezę.

Kloksacilinas veikia: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *S. uberis*, *S. dysgalactiae*, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium perfringens*, *C. pseudotuberculosis*, *Bacillus anthracis*.

Vaistas yra intramaminė suspensija, kuri baktericidiškai veikia gramteigiamas bakterijas. Veiklioji medžiaga, kloksacilino benzatino druska, yra mažai tirpi pusiau sintetinio penicilino (kloksacilino) druska, 6-aminopenicilano rūgšties darinys. Jis chemiškai panašus į penicilinus, tačiau jo antibakterinės savybės šiek tiek skiriasi.

Sušvirkšto į tešmenį užtrūkimo metu vaisto baktericidinė koncentracija išlieka ilgą laiką, nes veiklioji medžiaga menkai tirpi ir lėtai išsiskiria iš preparato. Taip užtikrinamas ilgesnis antibiotiko veikimas.

Fermentas penicilinazė kloksacilino neveikia, todėl veiklioji medžiaga veikia penicilinui atsparių padermių *Staphylococcus aureus* ir penicilinazės negaminančius *Staphylococcus aureus* bei *Streptococcus agalactiae*.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Aluminio monostearatas, žemės riešutų aliejus.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

3 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Švirkštai po 8 g, dėžutėse po 4 ir induose po 125 vnt. Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

UAB Vetmarket
Nemuno g. 4
Virbališkių k., LT-53458, Kauno r.,
Lietuva

8. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/02/1410/001-002

9. PERREGISTRACIJOS DATA

2007-06-11

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2022-10-03

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MASTICEN SECADO, intramaminė suspensija

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienkartiniame 8 g švirkšte yra:

veikliosios medžiagos: kloksacilino
(benzatino) 1 000 mg;

pagalbinių medžiagų: aliuminio
monostearato 120 mg,
žemės riešutų aliejaus iki 8 g.

3. VAISTO FORMA

Intramaminė suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 vnt.

125 vnt.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Karvės, avys, ožkos.

6. INDIKACIJOS

Karvėms, avims ir ožkoms, užtrūkimo metu sergančioms mastitu, kurio sukėlėjai jautrūs kloksacilinui, gydyti ir profilaktiškai.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Karvėms į pažeistą tešmens ketvirtį reikia sušvirkšti vieno švirkšto turinį, avims ir ožkoms reikia švirkšti 0,5 švirkšto turinio.

8. IŠLAUKA

Išlauka: jei vaistas švirkštas patelėms likus ne mažiau kaip 28 d. iki vaikavimosi, pienui ir skerdienai – 0 parų. Jei užtrūkimo periodas truko trumpiau kaip 4 sav., pieną reikia ištirti dėl antibiotikų likučių.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB Vetmarket
Nemuno g. 4
Virbališkių k., LT-53458, Kauno r.,
Lietuva

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/0/02/1410/001
LT/2/02/1410/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

ŠVIRKŠTAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MASTICEN SECADO, intramaminė suspensija

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Kloksacilino (benzatino) 1 000 mg.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

8 g

4. NAUDOJIMO BŪDAI

Švirkšti į tešmenį.

5. IŠLAUKA

Išlauka: jei vaistas švirkštas patelėms likus ne mažiau kaip 28 d. iki vaikavimosi, pienui ir skerdenai – 0 parų. Jei užtrūkimo periodas truko trumpiau kaip 4 sav., pieną reikia ištirti dėl antibiotikų likučių.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
MASTICEN SECADO, intramaminė suspensija

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO
GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas

UAB Vetmarket

Nemuno g. 4

Virbališkių k., LT-53458, Kauno r.,

Lietuva

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Cenavisa S. L.,

Cami Pedra Estela s/n,

43205 Reus,

Ispanija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

MASTICEN SECADO, intramaminė suspensija

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienkartiniame 8 g švirkšte yra:

veikliosios medžiagos:

kloksacilino (benzatino)	1 000 mg;
--------------------------	-----------

pagalbinių medžiagų:

aliuminio monostearato	120 mg,
žemės riešutų aliejaus	iki 8 g.

4. INDIKACIJA

Karvėms, avims ir ožkoms, užtrūkimo metu sergančioms mastitu, kurio sukėlėjai jautrūs kloksacilinui, gydyti ir profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvuliams, padidėjus jautrumui penicilinams.

Gyvuliams, padidėjus jautrumui cefalosporinams, vaistą reikia naudoti apdairiai.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Karvės, avys ir ožkos.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Karvėms į pažeistą tešmens ketvirtį reikia sušvirkšti vieno švirkšto turinį, avims ir ožkoms reikia švirkšti 0,5 švirkšto turinio.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą tešmens ketvirtį reikia nuplauti antiseptiniu tirpalu. Sušvirkštus vaistą, tešmenį reikia pamasažuoti, kad vaistas geriau pasiskirstytų.

Negalima naudoti kartu su bakteriostatiniais antibiotikais.

Negalima naudoti patelėms laktacijos metu.

Perdozavimas sunkiai įmanomas.

10. IŠLAUKA

Jei vaistas švirkštas patelėms likus ne mažiau kaip 28 d. iki vaikavimosi, pienui ir skerdienai – 0 parų.

Jei užtrukimo periodas truko trumpiau kaip 4 sav., pieną reikia ištirti dėl antibiotikų likučių.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2022-10-03

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: intramaminio naudojimo antibakterinės medžiagos, pusiau sintetiniai penicilinai. ATCvet kodas: QJ51CF02.

Kloksacilinas yra β -laktaminis antibiotikas, pusiau sintetinė penicilino druska. Jis veikia baktericidiškai, o veikimo spektras panašus į meticilino. Slopindamas transpeptidazes ir karboksipeptidazes, kloksacilinas sutrikdo bakterijų sienelės sintezę. Kloksacilinas veikia: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *S. uberis*, *S. dysgalactiae*, *Corynebacterium pyogenes*, *Clostridium perfringens*, *C. pseudotuberculosis*, *Bacillus anthracis*. Vaistas yra intramaminė suspensija, kuri baktericidiškai veikia gramteigiamas bakterijas. Veiklioji medžiaga, kloksacilino benzatino druska, yra mažai tirpi pusiau sintetinio penicilino (kloksacilino) druska, 6aminopenicilano rūgšties darinys. Jis chemiškai panašus į penicilinus, tačiau jo antibakterinės savybės šiek tiek skiriasi. Sušvirkšto į tešmenį užtrūkimo metu vaisto baktericidinė koncentracija išlieka ilgą laiką, nes veiklioji medžiaga menkai tirpi ir lėtai išsiskiria iš preparato. Taip užtikrinamas ilgesnis antibiotiko veikimas. Fermentas penicilinazė kloksacilino neveikia, todėl veiklioji medžiaga veikia penicilinui atsparių padermių *Staphylococcus aureus* ir penicilinazės negaminančius *Staphylococcus aureus* bei *Streptococcus agalactiae*.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.